
Bu kitaba sığmayan daha neler var!

eba
www.eba.gov.tr

Karekodu okut, bu kitapla ilgili EBA içeriklerine ulaş!

Teknoloji Yolculuğumuz



BU DERS KİTABI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINCA ÜCRETSİZ OLARAK VERİLMİŞTİR.
PARA İLE SATILAMAZ.

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Beşinci Maddesinin İkinci Fıkrası Çerçevesinde Bandrol Taşıması Zorunlu Değildir.

ORTAÖĞRETİM

Matematik 9. Sınıf Ders Kitabı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI | ORTAÖĞRETİM | DERS KİTABI

Matematik



1. Kitap

ORTAÖĞRETİM

Matematik

9. Sınıf

Ders Kitabı

Yazarlar

Cem DEMİRCİ
Dilek TEKER
Esat AVCI
Gözde Aslı ÖZCAN
İsmail Hakkı ÜSTÜNEL
Kadır ÖZCAN
Özgür ŞEKER
Sercan EMEK
Sunullah KARABUDAK
Süleyman DOĞAN
Turgay KIZGIN
Yasemin YARDIM

DEVLET KİTAPLARI
....., 2024

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI ..... : 9617
DERS KİTAPLARI DİZİSİ ..... : 2038

Her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Kitabın metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz.

Editör
Prof. Dr. Abdulkadir ERDOĞAN
Prof. Dr. Hakan YAMAN
Prof. Dr. Soner DURMUŞ
Doç. Dr. Ayşe YOLCU
Doç. Dr. Nadide YILMAZ

Dil Uzmanları
Eflak MALGACA VARGEL
Hilal ASLAN
Neslihan ARICA

Görsel Tasarımcılar
Çiğdem ÖKCÜN
Hilal YAŞAR
Meltem KORKMAZ
Mustafa ÇAKIR
Nevrez AKIN
Özcan ATAK

Program Geliştirme Uzmanları
Doç. Dr. Recep KAHRAMANOĞLU
Doç. Dr. Serkan ASLAN
Demet YILMAZ
Nedim DENİZLİ
Nurgül KENDİRLİOĞLU GÜNHAN

Ölçme ve Değerlendirme Uzmanları
Dr. Öğr. Üyesi Halime YILDIRIM HOŞ
Dr. Öğr. Üyesi Sinem ŞENFERAH
Cuma GÜÇ
Dilay AK
Nuray SUNAR

Rehberlik Uzmanları
Berna Serap TÜRK
Hilal DEMİRBAĞ

Baskı
Baskı Matbaanın Adı ve
Ticaret Ünvanı
Tel.: (0000) 000 00 00

ISBN 978-975-11-8056-8

Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 17.07.2024 tarih ve 110460855 sayılı yazısı ile eğitim aracı olarak kabul edilmiştir.



İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;
Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif Ersoy


GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

İçindekiler

Kitabın dijital kopyalarında "İçindekiler" sayfasında başlıklar üzerine tıklayarak ilgili sayfalara, iç sayfalarda da Tema isimleri üzerine tıklayarak "İçindekiler" sayfasına ulaşabilirsiniz.

Kitabın Tanıtımı 8

1. Tema SAYILAR **10**

Ön Değerlendirme 12
1.1. GERÇEK SAYILARIN ÜSLÜ VE KÖKLÜ GÖSTERİMLERİ İLE YAPILAN İŞLEMLER 13
Alıştırmalar 36
1.2. GERÇEK SAYI ARALIKLARININ GÖSTERİMİNDE VE ARALIKLARLA İLGİLİ İŞLEMLERDE KÜME SEMBOL VE İŞLEMLERİ 37
Alıştırmalar 55
1.3. SAYI KÜMELERİNİN ÖZELLİKLERİ 57
Alıştırmalar 66
1.4. GERÇEK SAYILARIN İŞLEM ÖZELLİKLERİ 67
Alıştırmalar 80
Ölçme ve Değerlendirme 82

2. Tema NİCELİKLER VE DEĞİŞİMLER **88**

Ön Değerlendirme 90
2.1. GERÇEK SAYILARDA TANIMLI DOĞRUSAL FONKSİYONLAR VE NİTEL ÖZELLİKLERİ 91
Alıştırmalar 116
2.2. GERÇEK SAYILARDA TANIMLI MUTLAK DEĞER FONKSİYONLARI VE NİTEL ÖZELLİKLERİ 120
Alıştırmalar 135
2.3. DOĞRUSAL FONKSİYONLARLA İFADE EDİLEBİLEN DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER İÇEREN PROBLEMLER 136
Alıştırmalar 159
Ölçme ve Değerlendirme 161

3. Tema GEOMETRİK ŞEKİLLER **170**

Ön Değerlendirme 172
3.1. ÜÇGENDE AÇI VE KENARLARLA İLGİLİ ÖZELLİKLER 174
Alıştırmalar 192
Ölçme ve Değerlendirme 195

Sözlük 200
Kaynakça 202
Cevap Anahtarları Karekodu 202
Genel Ağ ve Görsel Kaynakçası Karekodu 202
Türkiye'nin Mülki İdare Bölümleri ile Kara ve Deniz Komşuları Haritası 203
Türk Dünyası Haritası 204

Kitabın Tanıtımı

Temanın adı

Temanın konu başlıkları


Tema sunumuna ve diğer e-içeriklere yönlendiren karekodlar

Temanın işleniş sırası

Temanın kapsamı hakkında bilgi veren anahtar kavramlar

Temada kullanılan sembol ve gösterimler

Temada öğrenme çıktıları bağlamında gerçekleştirilmesi beklenen beceriler




Temada öğrenciden beklenen görev ve sorumlulukların belirtildiği alan

Temaya giriş niteliğinde, temanın diğer disiplinlerle ve gerçek yaşamla ilişkisini yansıtan alan

Önceki yıllarda edinilen, temanın gerektirdiği bilgi ve becerileri içeren çalışmaların bulunduğu alan

Temaya ait öğrenme çıktısı

Merak uyandıran, önceki bilgi ve becerilerden temanın içerdiği bilgi ve becerilere geçişi sağlayan alan



Tanım, kural veya özelliklerin hatırlatıldığı alan

Tanım veya kuralların verildiği alan


Süreç bileşenlerinin bir görev veya problem bağlamında işletildiği alan

Tema ile ilgili çözümlü örneklerin sunulduğu alan


Konu içinde çözümü verilmeyen görevlerin yer aldığı alan

Soruya ait örnek çözümün yer aldığı alan


Ulaşılan bilgi, kural, önerme veya sonuçların özetlendiği alan




Tema ile ilgili araştırma ödevlerinin verildiği alan




Tema ile ilgili performans görevlerinin verildiği alan




Tema ile ilgili proje ödevlerinin verildiği alan




Öğrenme çıktısı ile ilgili görevlerin bulunduğu alan



Tema ile ilgili ölçme ve değerlendirme çalışmalarının yer aldığı alan



Temada öğrenilenlerin not edilmesi için ayrılan alan



Konu ile ilgili kişi, kurum ve olaylar hakkında önemli tarihsel bilgilerin yer aldığı alan



SEMBOLLER VE SEMBOLLERİN AÇIKLAMALARI

Başlarken

Konuya Başlarken

Kontrol Noktası

Farklı Kaydet

Çalışmanın Bittiği Yer

Uygulamanın Başladığı Yer

Uygulamanın Bittiği Yer

Bireysel Uygulama

Grup Uygulaması

Rehberli Uygulama

Ders Öncesi Hazırlık Gerektiren Çalışma

Hesap Makinesi Gerektiren Soru

Ön Değerlendirme

Sonraki Sayfada Devam Eden Çalışma

Önceki Sayfadan Devam Eden Çalışma

İçindekiler, Alıştırmalar, Ölçme ve Değerlendirme

1. TEMA

Sayılar

1.1. Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler

1.2. Gerçek Sayı Aralıklarının Gösteriminde ve Aralıklarla İlgili İşlemlerde Küme Sembol ve İşlemleri

1.3. Sayı Kümelerinin Özellikleri

1.4. Gerçek Sayıların İşlem Özellikleri

▶ **Anahtar Kavramlar**

- alt küme
- ancak ve ancak
- aralık
- bazı
- bilimsel gösterim
- birleşim işlemi
- boş küme
- eşitsizlik
- fark işlemi
- her
- ise
- ispat
- kesişim işlemi
- köklü gösterim
- küme
- kümenin elemanı
- mutlak değer
- önerme
- önermenin değili
- özdeşlik
- tümleme
- üslü gösterim
- ve
- veya
- ya da

▶ **Sembol ve Gösterimler**

- $\in, \notin, \varnothing, \cap, \cup, \setminus, \subseteq, s(A)$
- $\{x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n\}$
- $\{x | x \text{ in sahip olduğu tanımlayıcı özellikler}\}$
- $<, \leq, >, \geq, |a|, x^n, \sqrt[n]{x}$
- $\wedge, \vee, \veebar, \Rightarrow, \Leftrightarrow, \forall, \exists$
- $(a, b), [a, b]$
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{Q}', \mathbb{R}$

▶ **Bu temada sizden**

- gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilmeniz,
- gerçek sayı aralıklarının gösteriminde ve aralıklarla ilgili işlemlerde küme sembol ve işlemlerinden yararlanabilmeniz,
- farklı sayı kümelerinin özellikleri hakkında muhakeme yapabilmeniz,
- gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilmeniz

beklenmektedir.

Tema boyunca sizden çalışma kâğıtlarındaki soruları çözmeniz, performans görevlerini yerine getirmeniz, ölçme ve değerlendirme sorularını çözmeniz beklenmektedir.



Tema karekodu

Tema sunusuna ulaşmak için karekodu okutunuz.

Başlarken

Günlük hayatta çoğunlukla tam sayılar kullanılırken fizik, kimya, biyoloji, ekonomi, astronomi, mühendislik gibi alanlarda farklı sayılara ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin mikroskobik canlıların kütlesini hesaplarken çok küçük sayılara, gezegenler arası uzaklıkları ifade ederken çok büyük sayılara ihtiyaç duyulmaktadır. Eş kenar uzunlukları 3 metre olan ikizkenar dik üçgen şeklindeki bir havuzun en uzun kenarının uzunluğunu ifade etmek için köklü gösterimden yararlanılmaktadır. Bir bitkinin ideal koşullarda yetiştirilmesini sağlayan sıcaklık değerlerini ifade etmek için gerçek sayı aralıkları kullanılmaktadır. Örneklerde verilen durumları ifade ederken gerçek sayıların ondalık, üslü, köklü gösterimlerinden ve gerçek sayı aralıklarından yararlanılmaktadır.

Ön Değerlendirme

1. Aşağıdaki işlemleri yapınız.

a) $0,19 + 2,01$

b) $\dfrac{0,219 - 0,009}{2,1}$

c) $(-0,2) \cdot (0,1) \div 0,004$

2. Aşağıda tabanı rasyonel sayı, kuvveti tam sayı olan bir sayının kuvvetinin nasıl alındığına yönelik örnekler verilmiştir.

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^4 = \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{16}$$

$$\left(\frac{2}{5}\right)^3 = \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{8}{125}$$

Verilen örneklerden yararlanarak $\left(-\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^4$ **işleminin sonucunu bulunuz.**

3. Aşağıda verilen köklü gösterimleri kök dışına çıkartarak ulaştığınız sonuçların rasyonel sayı olup olmadıklarını belirleyiniz.

a) $\sqrt{49}$


b) $\sqrt{1,69}$

c) $-\sqrt{\dfrac{64}{81}}$


4. 14,076 **sayısının basamak değerlerini belirleyiniz.**

5. Aşağıda verilen aralıkları sayı doğrusu üzerinde gösteriniz.


a) $(-3, 3)$



b) $[4, 9)$




c) $[-8, -5]$




6. Aşağıda verilen gerçek sayıların sayı doğrusu üzerindeki yaklaşık yerini gösteriniz.

a) $\sqrt{8}$ **b)** $-\sqrt{11}$ **c)** $\sqrt{29}$



7. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen ve kare ile yarıçap uzunluğu verilen dairenin çevre uzunluklarına ve alanlarına karşılık gelen cebirsel ifadeleri yazınız. (π değerini 3 olarak alınız.).


a)



Çevre = ...

Alan = ...


b)



Çevre = ...

Alan = ...

c)



Çevre = ...

Alan = ...

1.1. GERÇEK SAYILARIN ÜSLÜ VE KÖKLÜ GÖSTERİMLERİ İLE YAPILAN İŞLEMLER

Konuya Başlarken

Aşağıda gerçek yaşam durumlarında karşılaşılan bazı sayı gösterimlerine yer verilmiştir.

- 1 gram alüminyumun sıcaklığının 1 °C artması için alüminyuma 0,21 kal ısı verilmelidir.
- İnsan beynindeki nöron sayısı, yaklaşık olarak $8{,}6 \cdot 10^{10}$ tanedir.
- Birbirlerine en yakın konumdayken Uranüs ile Dünya arasındaki uzaklık yaklaşık $2{,}57 \cdot 10^{9}$ km'dir.
- Nötron, atom çekirdeğinde bulunan ve kütlesi yaklaşık $1{,}675 \cdot 10^{-24}$ gram olan taneciktir.
- Yüzey alanı 21 m^2 olan kare şeklindeki bir halının bir kenarının uzunluğu $\sqrt{21}$ m'dir.
- Atletizm 100 m koşusunda dünya rekoru 9,58 sn. olup Usain Bolt (Yuseyn Bolt) tarafından kırılmıştır.

Buna göre aşağıdaki sorularla ilgili fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. Üslü veya köklü gösterimlerin yararları neler olabilir?

2. Çeşitli bilim dallarında kullanılan üslü ve köklü gösterimler neler olabilir? Örnekler veriniz.

3. 100 metrelik bir koşu yarışında sporcuların yarışı bitirme dereceleri belirlenirken neden ondalık gösterime ihtiyaç duyulmaktadır?

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleri, matematikte ve gerçek yaşamda birçok alanda kullanılmaktadır. Üslü ve köklü gösterimler fizik, kimya, biyoloji, astronomi, mühendislik, ekonomi, bilgisayar bilimleri gibi alanlarda kullanılarak karmaşık problemlerin çözümü daha etkin şekilde yapılmaktadır.

Gerçek Sayıların Üslü Gösterimi

Aşağıda gerçek yaşamda karşılaşılan çok büyük veya çok küçük sayı örnekleri verilmiştir.

- Işık hızının yaklaşık değeri, saatte 1 080 000 000 km'dir.
- İnsan vücudundaki atom sayısının yaklaşık değeri, 28 basamaklı 7000...0 sayısı ile ifade edilebilir.
- Arşimet, tüm evreni doldurmak için gereken kum tanesi sayısını ifade etmek için 64 basamaklı 800…0 sayısını kullanmıştır.
- Evrendeki yıldızların sayısının yaklaşık değeri, 23 basamaklı 10…0 sayısı ile ifade edilebilir.
- Bir hidrojen atomunun çekirdeğinin çapı 0,00000000000000175 metredir.

Verilen örneklerdeki sayıların yazılması ve okunması oldukça zordur. Üslü gösterim çok büyük veya çok küçük sayıların yazımında ve bu sayılarla yapılan işlemlerde kolaylık sağlamaktadır.

1. Uygulama

Gerçek Sayıların Üslü Gösterimleri

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Tabloda verilen üslü gösterimlerin sonuçlarını örneklerdeki gibi bularak tabloyu uygun şekilde doldurunuz.

Üslü Gösterim	Yapılması Gereken İşlem ve Sonucu
$\left(\frac{1}{2}\right)^4$	$\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$
$\left(\frac{2}{3}\right)^3$	
$(-2)^5$	
$(-1)^6$	
-3^4	
8^0	$8^0 = 1$
12^0	
$(-6)^0$	
0^5	
4^{-1}	$4^{-1} = \frac{1}{4}$
3^{-2}	
$(-5)^{-3}$	
$(-3)^{-4}$	
$\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$	
$\left(-\frac{3}{5}\right)^{-2}$	

2. Üslü gösterimlerle ilgili ulaştığınız sonuçları sözel olarak ifade ediniz.

a bir gerçek sayı, n pozitif tam sayı olmak üzere n tane a sayısının çarpımı a nın n. kuvveti olarak isimlendirilir. $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{n \text{ tane}}$ olur.

a^n ifadesinde a taban ve n üs olarak isimlendirilir.

a sıfırdan farklı gerçek sayı ve n pozitif tam sayı olmak üzere $a^{-1} = \frac{1}{a}$ ve $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ olur.

n negatif tam sayı ise $a^n = \frac{1}{\underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{|n| \text{ tane}}}$ olur. $a^0 = 1$'dir.

b sıfırdan farklı bir gerçek sayı olmak üzere $0^b = 0$'dır.


1. Sıra Sizde

$2^{-2} + \left(-\frac{1}{3}\right)^{-1} + 4^0 - (-2)^3$ **işleminin sonucunu bulunuz.**

Gerçek Sayıların Üslü Gösterimleriyle Yapılan Toplama ve Çıkarma İşlemleri

İnsan kanı, plazma adı verilen sıvıdan ve kan hücrelerinden oluşur (Görsel 1.1). Kan hücreleri; alyuvarlar, akyuvarlar ve trombositler olmak üzere üç çeşittir. Bir laboratuvarda incelenen kanın 1 litresinde $5 \cdot 10^9$ alyuvar, $6 \cdot 10^6$ akyuvar ve $0{,}2 \cdot 10^9$ trombosit hücresi bulunduğu tespit edilmiştir.

Kandaki alyuvar ve trombosit hücrelerinin toplam sayısını ya da alyuvar hücresi sayısının trombosit hücrelerinin sayısından kaç fazla olduğunu hesaplamak için hangi matematiksel işlemlere ihtiyaç duyulur?



Görsel 1.1: *Kan hücrelerinin görüntüsü*

2. Uygulama

Üslü Gösterimlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi

Verilen bilgileri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

n tam sayı; a, b, x birer gerçek sayı ve x sıfırdan farklı olsun.

1. Üslü gösterimlerle $a \cdot x^n + b \cdot x^n$ ve $a \cdot x^n - b \cdot x^n$ işlemlerinin sonuçları nasıl bulunabilir? Varsayımlarınızı oluşturunuz.

2. Tabloda verilen işlemlerin sonuçlarını örneklerdeki gibi bularak ilgili yere yazınız.

İşlem	Ortak Çarpan Parantezindeki İşlem	Sonuç
$3 \cdot 2^{10} + 2^{10}$	$\left(2^{10} + 2^{10} + 2^{10}\right) + 2^{10} = (3+1) \cdot 2^{10}$	$4 \cdot 2^{10}$
$5 \cdot 3^{12} - 2 \cdot 3^{12}$	$(5-2) \cdot 3^{12}$	$3 \cdot 3^{12}$
$-7 \cdot 11^5 + 4 \cdot 11^5$		
$0{,}4 \cdot 5^7 + 2{,}1 \cdot 5^7$		
$3 \cdot 10^5 - 10^5 + 2{,}5 \cdot 10^5$		
$a \cdot 5^4 + b \cdot 5^4$		
$a \cdot x^n + b \cdot x^n$		
$a \cdot x^n - b \cdot x^n$		

3. Tabloda elde ettiğiniz sonuçlardan yararlanarak üslü gösterimlerle toplama ve çıkarma işlemleriyle ilgili genellemeler oluşturunuz.

4. Varsayımlarınızla genellemelerinizi karşılaştırarak üslü gösterimlerle toplama ve çıkarma işlemlerine dair önermelerinizi oluşturunuz.

5. Oluşturduğunuz önermeler yardımıyla aşağıda verilen problemi çözünüz. Önermelerin problemin çözümünde ne tür kolaylıklar sağladığını ve başka hangi problem durumlarında kullanılabileceğini yazınız.

Aynı doğrultuda bulunduklarında Merkür ve Jüpiter'in merkezlerinin Güneş'e yaklaşık uzaklıkları sırasıyla $5{,}8 \cdot 10^7$ km ve $7{,}5 \cdot 10^8$ km'dir. Merkür'ün Güneş ve Jüpiter'in arasında olduğu bilindiğine göre Merkür ve Jüpiter'in merkezlerinin arasındaki uzaklık yaklaşık kaç km'dir?

6. Oluşturduğunuz önermeleri cebirsel olarak doğrulayınız. Doğrulama yöntemlerinizi sınıf arkadaşlarınızın kullandığı yöntemlerle karşılaştırarak kullanışlılık açısından değerlendiriniz.

Tabanları ve üsleri aynı olan üslü gösterimler toplanabilir ve çıkarılabilir. Toplama veya çıkarma işlemleri yapılırken üslü gösterimler ortak çarpan olduğundan ifadeler ortak çarpan parantezine alınabilir. Sonrasında üslü gösterimlerin katsayılarıyla toplama veya çıkarma işlemleri yapılabilir. Bu durum, aşağıda önerme biçiminde gösterilmiştir.

n tam sayı; a, b, x gerçek sayı ve x sıfırdan farklı olmak üzere $a \cdot x^n + b \cdot x^n - c \cdot x^n = (a + b - c) \cdot x^n$ eşitliği vardır.

Gerçek Sayıların Üslü Gösterimleriyle Yapılan Çarpma ve Bölme İşlemleri

Ankara'da barajlardaki su miktarı; 2001 yılı Ocak ayında yaklaşık $4 \cdot 10^6$ metreküp, 2024 yılı Ocak ayında yaklaşık $1{,}6 \cdot 10^8$ metreküp olarak ölçülmüştür (Görsel 1.2).

1 metreküp suyun 1000 litreye eşit olduğu bilinmektedir. 2001 yılı Ocak ayında Ankara'da barajlardaki su miktarının kaç litre olduğunu ya da 2024 yılı Ocak ayındaki su miktarının 2001 yılı Ocak ayındaki su miktarının kaç katı olduğunu bulmak için hangi matematiksel işlemlere ihtiyaç duyulur?



Görsel 1.2: *Ankara Sarıyar Barajı*

3. Uygulama

Tabanları Aynı Olan Üslü Gösterimlerle Çarpma ve Bölme İşlemi

Verilen bilgileri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.
x sıfırdan farklı bir gerçek sayı, a ve b birer tam sayı olsun.

1. Üslü gösterimlerle $x^a \cdot x^b$ ve $\frac{x^a}{x^b}$ işlemlerinin sonuçları nasıl hesaplanabilir? Varsayımlarınızı sınıf arkadaşlarınızla saygı çerçevesinde tartışarak oluşturunuz.

2. Tabloda verilen işlemlerin sonuçlarını örneklerdeki gibi bularak ilgili yere yazınız.

İşlem	İşlemin Açık Hâli	Sonucun Üslü Gösterimi
$2^3 \cdot 2^4$	$\underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2}_{3 \text{ tane}} \cdot \underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}_{4 \text{ tane}}$	2^7
$(-6)^2 \cdot (-6)^3 \cdot (-6)$		
$\left(\frac{1}{5}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^5$		
$3^6 \cdot 3^{-4}$	$3 \cdot 3 \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{3} \cdot \frac{1}{\cancel{3}} \cdot \frac{1}{\cancel{3}} \cdot \frac{1}{\cancel{3}} \cdot \frac{1}{\cancel{3}}$	3^2
$5^{-4} \cdot 5^7$		
$\left(\frac{2}{3}\right)^{-1} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^5$		
$x^a \cdot x^b$		
$\frac{2^5}{2^3}$	$\frac{2 \cdot 2 \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{2}}{\cancel{2} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{2}}$	2^2
$\frac{11^6}{11^2}$		
$\frac{(-3)^7}{(-3)^4}$		
$\frac{6^3}{6^{-2}}$		
$\frac{x^a}{x^b}$		

3. Tabloda elde ettiğiniz sonuçlardan yararlanarak tabanları aynı olan üslü gösterimlerle çarpma ve bölme işlemlerine dair genellemeler oluşturunuz.

4. Varsayımlarınızla genellemelerinizi karşılaştırarak üslü gösterimlerle çarpma ve bölme işlemlerine dair önermelerinizi oluşturunuz.

5. Oluşturduğunuz önermeler yardımıyla aşağıda verilen problemi çözünüz. Önermelerin problemin çözümünde ne tür kolaylıklar sağladığını ve başka hangi problem durumlarında kullanılabileceğini yazınız.

Yeryüzündeki kumsallarda yaklaşık $4 \cdot 10^{21}$ kum tanesi olduğu düşünülmektedir. Arşimet, yaptığı bir çalışmada bütün evreni doldurmak için gereken kum tanesi sayısını yaklaşık olarak hesaplamıştır. Arşimet'in bulduğu sayı, yeryüzündeki kumsallarda bulunan kum tanesi sayısının $2 \cdot 10^{42}$ katıdır.

Buna göre tüm evreni doldurmak için gereken kum tanesi sayısı nasıl hesaplanabilir?

6. a ve b nin pozitif tam sayı olduğu durumlar için oluşturduğunuz önermelerin doğrulama adımlarının bir kısmı aşağıda verilmiştir.

a) $x^a \cdot x^b = \underbrace{(x \cdot x \cdot \ldots \cdot x)}_{a \text{ tane}} \cdot \underbrace{(x \cdot x \cdot \ldots \cdot x)}_{b \text{ tane}} = \underbrace{x \cdot x \cdot \ldots \cdot x}_{(\ldots\ldots) \text{ tane}} = x^{a+b}$

b) $a > b$ için $\dfrac{x^a}{x^b} = \dfrac{\overbrace{(x \cdot x \cdot \ldots \cdot x)}^{\ldots\ldots \text{ tane}}}{\underbrace{(x \cdot x \cdot \ldots \cdot x)}_{\ldots\ldots \text{ tane}}} = \underbrace{x \cdot x \cdot \ldots \cdot x}_{(a-b) \text{ tane}} = \ldots\ldots^{a-b}$

$a < b$ için $\dfrac{x^a}{x^b} = \dfrac{\overbrace{(x \cdot x \cdot \ldots \cdot x)}^{\ldots\ldots \text{ tane}}}{\underbrace{(x \cdot x \cdot \ldots \cdot x)}_{\ldots\ldots \text{ tane}}} = \dfrac{1}{\underbrace{(x \cdot x \cdot \ldots \cdot x)}_{(b-a) \text{ tane}}} = \dfrac{1}{\ldots\ldots^{b-a}} = \ldots\ldots^{a-b}$

Boşlukları uygun şekilde doldurup önermenizi matematiksel olarak doğrulayınız.

a ve b nin negatif tam sayı olduğu durumlar için oluşturduğunuz önermeleri matematiksel olarak doğrulayınız.

Doğrulama yöntemlerinizi sınıf arkadaşlarınızın kullandığı yöntemlerle karşılaştırarak kullanışlılık açısından değerlendiriniz.

1. ÖRNEK

Üslü gösterimlerle çarpma ve bölme işlemlerine dair elde ettiğiniz önermelerden yararlanarak $\dfrac{0{,}5 \cdot 2^7}{\left(-\frac{1}{2}\right)^{-3}}$ ifadesinin eşitini bulunuz.

Çözüm

$0{,}5 = \dfrac{5}{10} = \dfrac{1}{2} = 2^{-1}$ ve $\left(-\dfrac{1}{2}\right)^{-3} = (-2)^3 = -2^3$ olur.

Üslü gösterimlerde çarpma ve bölme işlemlerine dair elde edilen önermelerden yararlanılarak

$\dfrac{0{,}5 \cdot 2^7}{\left(-\frac{1}{2}\right)^{-3}} = \dfrac{2^{-1} \cdot 2^7}{-2^3} = -\dfrac{2^{-1+7}}{2^3} = -\dfrac{2^6}{2^3} = -2^{6-3} = -2^3$ bulunur.

4. Uygulama

Üsleri Aynı Olan Üslü Gösterimlerle Çarpma ve Bölme İşlemleri

Verilen bilgileri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a tam sayı, x, y birer gerçek sayı ve y sıfırdan farklı olsun.

1. Üslü gösterimlerle $x^a \cdot y^a$ ve $\frac{x^a}{y^a}$ işlemlerinin sonuçları nasıl hesaplanabilir? Varsayımlarınızı sınıf arkadaşlarınızla saygı çerçevesinde tartışarak oluşturunuz.

2. Tabloda verilen işlemlerin sonuçlarını örneklerdeki gibi bularak ilgili yere yazınız.

İşlem	İşlemin Açık Hâli	Sonucun Üslü Gösterimi
$2^3 \cdot 5^3$	$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = (2 \cdot 5) \cdot (2 \cdot 5) \cdot (2 \cdot 5) = (2 \cdot 5)^3$	10^3
$3^4 \cdot 4^4$		
$\left(\frac{1}{2}\right)^5 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^5$		
$(-2)^5 \cdot (-7)^5$		
$\left(-\frac{1}{3}\right)^7 \cdot (6)^7$		
$x^a \cdot y^a$		
$\frac{6^4}{5^4}$	$\frac{6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6}{5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5} = \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{5}$	$\left(\frac{6}{5}\right)^4$
$\frac{2^7}{3^7}$		
$\frac{6^5}{2^5}$		
$\frac{10^3}{(-2)^3}$		
$\frac{x^a}{y^a}$		

3. Tabloda elde ettiğiniz sonuçlardan yararlanarak üsleri aynı olan üslü gösterimlerle çarpma ve bölme işlemlerine dair genellemelerinizi sınıf arkadaşlarınızla tartışarak oluşturunuz.

4. Varsayımlarınızla genellemelerinizi karşılaştırarak üsleri aynı olan üslü gösterimlerle çarpma ve bölme işlemlerine dair önermelerinizi oluşturunuz.

5. Oluşturduğunuz önermeler yardımıyla aşağıda verilen problemi çözünüz. Önermelerin problemin çözümünde ne tür kolaylıklar sağladığını ve başka hangi problem durumlarında kullanılabileceğini yazınız.

$A = 3 \cdot 2^{11}$ ve $B = 7 \cdot 5^{11}$ sayıları veriliyor. $A \cdot B$ işleminin sonucunda elde edilen sayının kaç basamaklı olduğunu bulunuz.

6. Oluşturduğunuz önermelerin doğrulama adımlarının bir kısmı aşağıda verilmiştir. Boşlukları uygun şekilde doldurarak önermenizi matematiksel olarak doğrulayınız ve doğrulama yöntemlerinizi kullanışlılık açısından değerlendiriniz.

$$x^a \cdot y^a = \underbrace{x \cdot x \cdot \ldots \cdot x}_{|a| \text{ tane}} \cdot \underbrace{y \cdot y \cdot \ldots \cdot y}_{\ldots. \text{ tane}} = \underbrace{(x \cdot y) \cdot (x \cdot y) \cdot \ldots \cdot (x \cdot y)}_{\ldots. \text{ tane}} = (x \cdot y)^a$$

$$\frac{x^a}{y^a} = \frac{\overbrace{x \cdot x \cdot \ldots \cdot x}^{\ldots. \text{ tane}}}{\underbrace{y \cdot y \cdot \ldots \cdot y}_{\ldots. \text{ tane}}} = \underbrace{\left(\frac{x}{y}\right) \cdot \left(\frac{x}{y}\right) \cdot \ldots \cdot \left(\frac{x}{y}\right)}_{\ldots. \text{ tane}} = \ldots\ldots$$

Üslü Gösterimleri Verilen Sayıların Üssünü Alma İşlemi

Günümüzde veri depolama birimi olarak kullanılan bayt (B), megabayt (MB) ve cigabayt (GB) arasında aşağıdaki ilişki mevcuttur.

$1\ GB = 2^{10}\ MB = (2^{10})^3\ B$

1 cigabaytın kaç bayt olduğunu 2'nin kuvveti olarak yazabilmek için hangi matematiksel işlemlere ihtiyaç duyulur?

5. Uygulama

Üslü Gösterimin Üssünü Alma

Verilen bilgileri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

x bir gerçek sayı, a ve b pozitif tam sayı olsun.

1. $(x^a)^b$ işleminin sonucu nasıl hesaplanabilir? Varsayımlarınızı sınıf arkadaşlarınızla saygı çerçevesinde tartışarak oluşturunuz.

2. Tabloda verilen işlemlerin sonuçlarını örnekteki gibi bularak ilgili yere yazınız.

İşlem	İşlemin Açık Hâli	Sonucun Üslü Gösterimi
$(3^2)^3$	$3^2 \cdot 3^2 \cdot 3^2 = 3^{2+2+2}$	3^6
$(5^4)^6$		
$(-2^5)^2$		
$\left[\left(\frac{2}{3}\right)^5\right]^3$		
$(x^a)^b$		

3. Tabloda elde ettiğiniz sonuçlardan yararlanarak üslü gösterimlerin üssünü alma işlemiyle ilgili genellemelerinizi oluşturunuz.

4. Varsayımlarınızla genellemelerinizi karşılaştırarak üslü gösterimlerin üssünü alma işlemine dair önermeler oluşturunuz.

5. Oluşturduğunuz önermeler yardımıyla aşağıda verilen problemi çözünüz. Önermelerin problemin çözümünde ne tür kolaylıklar sağladığını ve başka hangi problem durumlarında kullanılabileceğini yazınız.

Tanımlanan bir işleme göre çokgenlerin kenar sayısı, içine yazılan sayının kaçıncı kuvvetinin alınacağını göstermektedir.

Örneğin $\boxed{3} = 3^4$, △5 $= 5^3$ olmaktadır. Buna göre ⬡7 ifadesinin sonucunu bulunuz.

6. Oluşturduğunuz önermelerin doğrulama adımlarının bir kısmı aşağıda verilmiştir. Boşlukları uygun şekilde doldurarak önermenizi matematiksel olarak doğrulayınız ve doğrulama yöntemlerinizi kullanışlılık açısından değerlendiriniz.

$$(x^a)^b = \underbrace{(x^a)\cdot(x^a)\cdot\ldots\cdot(x^a)}_{\text{.... tane}} = x^{\overbrace{a+a+\ldots+a}^{\text{.... tane}}} = \ldots\ldots\ldots$$

2. ÖRNEK

$$\frac{(-2^4)^3\cdot(-2^3)^2}{(2^4\cdot 2^{-2})^{-3}}$$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

$(-2^4)^3 = -2^{12}$

$(-2^3)^2 = 2^6$

$(2^4\cdot 2^{-2})^{-3} = (2^2)^{-3} = 2^{-6}$ olur. Bulunan ifadeler yerine yazıldığında

$$\frac{(-2^4)^3\cdot(-2^3)^2}{(2^4\cdot 2^{-2})^{-3}} = \frac{-2^{12}\cdot 2^6}{2^{-6}} = -\frac{2^{18}}{2^{-6}} = -2^{18-(-6)} = -2^{18+6} = -2^{24}$$ olur.

3. ÖRNEK

$A = 3\cdot(2^3)^6\cdot 5^{14}$ şeklindeki A sayısı veriliyor. A sayısının değeri bulunmadan kaç basamaklı olduğu nasıl bulunabilir? A nın basamak sayısını bulunuz ve yönteminizi açıklayınız.

Çözüm

10'un kuvveti cinsinden yazılarak A sayısının sondan kaç basamağının sıfır olduğu hesaplanabilir.

$A = 3\cdot(2^3)^6\cdot 5^{14} = 3\cdot 2^{18}\cdot 5^{14} = 3\cdot 2^4\cdot 2^{14}\cdot 5^{14} = 3\cdot 16\cdot(2\cdot 5)^{14} = 48\cdot 10^{14}$ olur.


Buradan 48'in sağında 14 tane 0 olduğu anlaşılır. A sayısının 14 + 2 = 16 basamaklı olduğu bulunur.

2. Sıra Sizde

1. $\left(\frac{18^6}{3^{12}} + \frac{7^{-6}}{14^{-6}}\right) \cdot 6^5 \cdot 3^{-5}$ **işleminin sonucunu bulunuz.**

2. $2^x = 3$ **olduğuna göre** 4^{2x+1} **ifadesinin eşitini bulunuz.**

3.



Şekil 1 *Şekil 2*

a bir pozitif tam sayı olmak üzere Şekil 1'de bir kenarının uzunluğu 3^a birim olan kare verilmiştir. Şekil 2, bir kenarının uzunluğu 27^a birim olan karenin bir köşesinden bir kenarının uzunluğu 3 birim olan kare çıkartılarak elde edilmiştir.

Buna göre Şekil 1'deki karenin alanı x birimkare olmak üzere Şekil 2'nin alanını x cinsinden bulunuz.

4. ÖRNEK

Aşağıdaki tabloda Adana, Kahramanmaraş ve Tokat il merkezleri ile Çanakkale il merkezi arasındaki karayolu mesafeleri metre cinsinden ve yaklaşık olarak verilmiştir.

Adana-Çanakkale	$1,09 \cdot 10^6$ m
Kahramanmaraş-Çanakkale	$123 \cdot 10^4$ m
Tokat-Çanakkale	$10,54 \cdot 10^5$ m

Buna göre Adana, Kahramanmaraş ve Tokat il merkezleri ile Çanakkale il merkezi arasındaki karayolu mesafelerini küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

Adana, Kahramanmaraş ve Tokat il merkezleri ile Çanakkale il merkezi arasındaki karayolu mesafeleri sırasıyla A, B ve C olsun. A, B ve C değerlerinin büyüklüklerinin karşılaştırılması için üslü gösterimlerin eşitlenmesi gerekmektedir.

$A = 1,09 \cdot 10^6$ m

$B = 123 \cdot 10^4$ m $= 1,23 \cdot 10^6$ m

$C = 10,54 \cdot 10^5$ m $= 1,054 \cdot 10^6$ m olur.

Üslü gösterimler eşit olduğundan $1,054 < 1,09 < 1,23$ katsayılarının sıralaması A, B ve C değerleri arasındaki sıralamayı belirler.

Buradan $C < A < B$ bulunur.

Araştırma Ödevi

Çok büyük ya da çok küçük sayıların yazımını kolaylaştırmak için bilimsel gösterimden yararlanılır. Aşağıda bilimsel gösterimin kullanıldığı bazı durumlara yer verilmiştir. Verilen adımları gerçekleştirerek araştırma ödevini zamanında ve eksiksiz olarak tamamlayınız.

- 1 ışık yılının kaç km olduğunu ışık hızından yararlanarak hesaplayınız.
- Güneş sisteminde bulunan üç gezegen belirleyip bu gezegenlerin birbirlerine olan uzaklıklarının kaç km olduğunu araştırınız.
- Hidrojen atom çekirdeğinin çapının kaç m olduğunu araştırınız.
- Atmosferdeki karbondioksit miktarının kaç ppm olduğunu araştırınız.
- Araştırmalarınızdan elde ettiğiniz üslü gösterimlerin başındaki gerçek sayıların kullanımında ne gibi benzerlikler bulunduğunu belirleyiniz.
- Bulduğunuz değerleri rapor hâline getirerek sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

Ödeviniz, derecelendirme ölçeği ile öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir.

Derecelendirme ölçeğine ulaşmak için karekodu okutunuz.

n tam sayı, a sıfırdan farklı gerçek sayı ve $1 \leq |a| < 10$ olmak üzere $a \cdot 10^n$ ifadesine **bilimsel gösterim** denir.

5. ÖRNEK

Evrendeki canlı ve cansız varlıkların atomlardan oluştuğu bilinmektedir. İnsan vücudundaki atom sayısı, insanın kütlesi (kg) ile 10^{26} sayısı çarpılarak yaklaşık olarak hesaplanabilir. $6,02 \cdot 10^{23}$ tane atom, 1 mol kabul edilmektedir.

Buna göre kütlesi 66,22 kg olan bir kişinin vücudunda yaklaşık kaç mol atom olduğunu bilimsel gösterim kullanarak ifade ediniz.

Çözüm

Kütlesi 66,22 kg olan kişinin vücudunda yaklaşık $66,22 \cdot 10^{26} = 6,622 \cdot 10^{27}$ tane atom bulunur. 1 mol $6,02 \cdot 10^{23}$ tane atomdan oluştuğundan $6,622 \cdot 10^{27}$ tane atom

$$\frac{6,622 \cdot 10^{27}}{6,02 \cdot 10^{23}} = \frac{6622 \cdot 10^{27}}{6020 \cdot 10^{23}}$$
$$= \frac{6622 \cdot 10^{27}}{602 \cdot 10 \cdot 10^{23}}$$
$$= \frac{6622 \cdot 10^{27}}{602 \cdot 10^{24}}$$
$$= 11 \cdot 10^{27-24}$$
$$= 11 \cdot 10^{3}$$
$$= 1,1 \cdot 10^{4} \text{ mol olur.}$$

3. Sıra Sizde

Newton'ın (Nivtın) evrensel kütle çekim teorisine göre yer çekimi sabiti $G = 6,673 \cdot 10^{-11}\ m^3/(kg \cdot sn.^2)$ olarak hesaplanmıştır. Gezegenlerin yer çekimi ivmesi $(m/sn.^2)$, yer çekimi sabiti yardımıyla aşağıdaki gibi hesaplanır.

$$g = G \cdot \frac{M}{R^2}$$

g: yer çekimi ivmesi (m/sn^2), M: gezegenin kütlesi (kg), R: gezegenin yarıçap uzunluğu (m)

Aşağıdaki tabloda Dünya ve Mars'ın kütle, yarıçap uzunluğu ve yer çekimi ivmesi büyüklüklerinden bazıları yaklaşık olarak verilmiştir.

Gezegen	Kütle (kg)	Yarıçap Uzunluğu (m)	Yer Çekimi İvmesi $(m/sn.^2)$
Dünya	$5,97 \cdot 10^{24}$	$6,371 \cdot 10^{6}$	
Mars		$3,389 \cdot 10^{6}$	3,711

Buna göre aşağıdaki soruları hesap makinesi kullanarak cevaplayınız (Cevaplarınızı onda birler basamağına yuvarlayarak ve bilimsel gösterim kullanarak yazınız.).

a) Mars'ın kütlesinin kaç kg olduğunu bularak Dünya'nın kütlesinin Mars'ın kütlesinin kaç katı olduğunu yaklaşık olarak hesaplayınız.

b) Dünya'nın yer çekimi ivmesinin yaklaşık kaç $m/sn.^2$ olduğunu bularak Mars'ın yer çekimi ivmesi ile karşılaştırınız.

Kontrol Noktası


a, b, c birer gerçek sayı; x, y sıfırdan farklı gerçek sayı; m, n birer tam sayı olsun. Üslü gösterimler ile aşağıdaki işlemler yapılabilir.

- $a \cdot x^m + b \cdot x^m - c \cdot x^m = (a + b - c) \cdot x^m$
- $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$
- $\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$
- $x^m \cdot y^m = (x \cdot y)^m$
- $\frac{x^m}{y^m} = \left(\frac{x}{y}\right)^m$
- $(x^m)^n = x^{m \cdot n}$

Gerçek Sayıların Köklü Gösterimi

x metre yükseklikten bırakılan cismin yere düşme süresi, t saniye ve yer çekimi ivmesi (g) $m/sn.^2$ olmak üzere $t = \sqrt{\frac{2x}{g}}$ eşitliği ile hesaplanır.

11,5 metre yükseklikten bırakılan cismin yere düşme süresi t saniye olsun (Görsel 1.3). Dünya'da yer çekimi ivmesi (g) yaklaşık 9,8 $m/sn.^2$ olmak üzere cismin yere düşme süresi $t = \sqrt{\frac{2 \cdot 11,5}{9,8}}$ sn. olur.



Görsel 1.3: *Belirli bir yükseklikten bırakılan cisim*

6. Uygulama

Üslü ve Köklü Gösterimlerin Birbiri Cinsinden İfade Edilmesi

Verilen bilgileri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Kuvveti rasyonel sayı olan üslü gösterimler, köklü gösterim olarak ifade edilebilir. Benzer şekilde köklü gösterimler de üslü gösterim olarak ifade edilebilir.

1. Tablo 1'de verilen üslü gösterimleri örneklerdeki gibi köklü gösterim olarak yazınız.

Tablo 1

Üslü Gösterim	Köklü Gösterim
$2^{\frac{3}{2}}$	$2^{\frac{3}{2}} = \sqrt[2]{2^3} = \sqrt{8}$
$2^{\frac{5}{2}}$	
$3^{\frac{1}{2}}$	$3^{\frac{1}{2}} = \sqrt[2]{3^1} = \sqrt{3}$
$6^{\frac{1}{2}}$	
$5^{\frac{2}{3}}$	$5^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{5^2} = \sqrt[3]{25}$
$7^{\frac{2}{5}}$	
$(-2)^{\frac{3}{5}}$	$(-2)^{\frac{3}{5}} = \sqrt[5]{(-2)^3} = \sqrt[5]{-8}$
$(-2)^{\frac{5}{3}}$	

2. Tablo 2'de verilen köklü gösterimleri örnekteki gibi üslü gösterim olarak yazıp tabloyu uygun şekilde doldurunuz.

Tablo 2

Köklü Gösterim	Üslü Gösterim
$\sqrt{6}$	$\sqrt{6} = 6^{\frac{1}{2}}$
$\sqrt[3]{7}$	
$\sqrt[5]{16}$	
$\sqrt[7]{5^3}$	

m, n pozitif tam sayı; $n \geq 2$ ve x bir pozitif gerçek sayı olmak üzere $x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m}$ şeklinde ifade edilebilir.
$\sqrt[n]{x^m}$ ifadesine **köklü gösterim** denir. Bu gösterimde n değerine **kökün derecesi** denir.
$\sqrt[n]{x^m}$ ifadesi, "n. dereceden kök x üzeri m" şeklinde okunur.

Özel olarak $n = 2$ olduğunda $\sqrt{x^m}$ şeklinde yazılır. Bu ifade, "karekök x üzeri m" şeklinde okunur.
k pozitif tam sayı, a bir gerçek sayı olmak üzere $\sqrt[2k+1]{a}$ ifadesi, tüm a değerleri için gerçek sayıdır.
$\sqrt[2k]{a}$ ifadesi, $a \geq 0$ için gerçek sayıdır.

a gerçek sayı, n pozitif tam sayı ve $n \geq 2$ olmak üzere

$$\sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} a, & n \text{ tek ise} \\ |a|, & n \text{ çift ise} \end{cases} \text{ olur.}$$

Gerçek Sayıların Köklü Gösterimleriyle Yapılan Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemleri

Yapılan bir deneyde a metre yükseklikten bırakılan bir cismin yere düşme süresi $\sqrt{48}$ sn. olarak hesaplanmıştır. Ardından b metre yükseklikten farklı bir cisim bırakılmış ve cismin yere düşme süresi $\sqrt{108}$ sn. olarak hesaplanmıştır. İki cismin yere düşme süreleri arasındaki farkı bulmak için hangi matematiksel işlemlere ihtiyaç duyulur?

7. Uygulama

Köklü Gösterimlerle Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme ve Kökün Kökünü Alma İşlemleri

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Üslü gösterimlerle yapılan toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve üssün üssünü alma işlemlerinden yararlanarak bu işlemlerin köklü gösterimlerle nasıl yapılabileceğine dair varsayımlarınızı sınıf arkadaşlarınızla saygı çerçevesinde tartışarak oluşturunuz.

2. Tablo 1'de üslü gösterimle toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve üssün üssünü alma işlemlerine yer verilmiştir. İşlemlerin sonuçlarını önce örnekteki gibi üslü gösterim kullanarak bulunuz. Köklü gösterimle işlemin nasıl yapılabileceğini bularak Tablo 1'de örnekteki gibi ilgili yere yazınız.

Tablo 1

İşlemin Üslü Gösterimi	Üslü Sonuç	İşlemin Köklü Gösterimi	Köklü Sonuç
$4 \cdot 5^{\frac{1}{3}} + 2 \cdot 5^{\frac{1}{3}}$	$(4+2) \cdot 5^{\frac{1}{3}} = 6 \cdot 5^{\frac{1}{3}}$	$4\sqrt[3]{5} + 2\sqrt[3]{5}$	$(4+2)\sqrt[3]{5} = 6\sqrt[3]{5}$
$4 \cdot 6^{\frac{1}{5}} - 2 \cdot 6^{\frac{1}{5}}$			
$3^{\frac{2}{3}} + 8 \cdot 3^{\frac{2}{3}} - 2 \cdot 3^{\frac{2}{3}}$			
$2^{\frac{1}{2}} \cdot 3^{\frac{1}{2}}$			

$\dfrac{10^{\frac{1}{3}}}{5^{\frac{1}{3}}}$			
$\left(6^{\frac{1}{4}}\right)^{\frac{1}{5}}$			

3. Tablo 1'de elde ettiğiniz sonuçlardan yararlanarak köklü gösterimlerle toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerine dair genellemelerinizi oluşturunuz.

4. m, n pozitif tam sayı, $n \geq 2$, x, y pozitif gerçek sayı ve a, b, c gerçek sayı olmak üzere Tablo 2'de köklü gösterimlerle işlemler verilmiştir. Varsayımlarınızla genellemelerinizi karşılaştırarak önermelerinizi Tablo 2'ye örnekteki gibi yazınız.

Tablo 2

İşlem	Önerme
$a\sqrt[n]{x^m} + b\sqrt[n]{x^m}$	$a\sqrt[n]{x^m} + b\sqrt[n]{x^m} = (a+b)\cdot\sqrt[n]{x^m}$ olur.
$a\sqrt[n]{x^m} - b\sqrt[n]{x^m}$	
$a\sqrt[n]{x^m} + b\sqrt[n]{x^m} - c\sqrt[n]{x^m}$	
$\sqrt[n]{x^m}\cdot\sqrt[n]{y^m}$	
$\dfrac{\sqrt[n]{x^m}}{\sqrt[n]{y^m}}$	
$\sqrt[m]{\sqrt[n]{x}}$	

5. Oluşturduğunuz önermeler yardımıyla aşağıda verilen problemi çözünüz. Önermelerin problemin çözümünde ne tür kolaylıklar sağladığını ve başka hangi problem durumlarında kullanılabileceğini yazınız.



Yandaki şekilde Bahar Hanım'ın yaptırmakta olduğu evin bir bölümüne ait plan verilmiştir. Planda yer verilen mutfak, kiler ve salon kare şeklindedir. Kiler ve mutfağın birer kenar uzunluklarının toplamı salonun bir kenar uzunluğuna eşittir. Mutfak ve kilerin taban alanları sırasıyla 20 m^2 ve 5 m^2 dir. Bahar Hanım; mutfak, kiler ve salon zeminlerini metrekaresi 975 Türk lirası olan ahşap parke ile kaplatmak istemektedir.

Bahar Hanım'ın alması gereken ahşap parkenin fiyatını bulunuz.

6. Oluşturduğunuz önermeleri matematiksel olarak doğrulayınız. Doğrulama yöntemlerinizi sınıf arkadaşlarınızın kullandığı yöntemlerle karşılaştırarak kullanışlılık açısından değerlendiriniz.

6. ÖRNEK

$\sqrt{25} + \sqrt[4]{16} - \sqrt{0} + 2\sqrt[3]{-27}$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

$\sqrt{25} = \sqrt{5^2} = 5^{\frac{2}{2}} = 5$, $\sqrt[4]{16} = \sqrt[4]{2^4} = 2^{\frac{4}{4}} = 2$, $\sqrt{0} = 0$

$\sqrt[3]{-27} = \sqrt[3]{(-3)^3} = (-3)^{\frac{3}{3}} = -3$ ifadeleri işlemde yerine yazıldığında

$\sqrt{25} + \sqrt[4]{16} - \sqrt{0} + 2\sqrt[3]{-27} = 5 + 2 - 0 + 2 \cdot (-3) = 7 - 6 = 1$ bulunur.

4. Sıra Sizde

$\sqrt{75} - 2\sqrt{12} + 5\sqrt{27}$ **işleminin sonucunu bulunuz.**

7. ÖRNEK

$\dfrac{\sqrt[5]{24} \cdot \sqrt[5]{4}}{\sqrt[5]{3}}$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

Köklü gösterimlerin dereceleri eşit olduğundan çarpma ve bölme işlemleri aynı kök içinde yapılabilir.

$\dfrac{\sqrt[5]{24} \cdot \sqrt[5]{4}}{\sqrt[5]{3}} = \sqrt[5]{\dfrac{24 \cdot 4}{3}} = \sqrt[5]{8 \cdot 4} = \sqrt[5]{32} = \sqrt[5]{2^5} = 2$ bulunur.

8. ÖRNEK

$\dfrac{\sqrt[3]{50 + \sqrt{16}}}{\sqrt[3]{5 - \sqrt[4]{81}}}$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

$\sqrt[3]{50 + \sqrt{16}} = \sqrt[3]{50 + \sqrt{4^2}} = \sqrt[3]{50 + 4} = \sqrt[3]{54}$

$\sqrt[3]{5 - \sqrt[4]{81}} = \sqrt[3]{5 - \sqrt[4]{3^4}} = \sqrt[3]{5 - 3} = \sqrt[3]{2}$ ifadeleri işlemde yerine yazıldığında

$\dfrac{\sqrt[3]{50 + \sqrt{16}}}{\sqrt[3]{5 - \sqrt[4]{81}}} = \dfrac{\sqrt[3]{54}}{\sqrt[3]{2}} = \sqrt[3]{\dfrac{54}{2}} = \sqrt[3]{27} = \sqrt[3]{3^3} = 3$ bulunur.

5. Sıra Sizde

Ay yüzeyinde yapılan bir deneyde belirli bir yükseklikten bırakılan cismin yere her çarptığında düştüğü ve yüksekliğin karekökü kadar yükseldiği görülmüştür.

Bu deneye göre verilen tabloyu doldurarak a metre yükseklikten bırakılan cismin yere 3. çarpmasından sonra kaç metre yükseleceğini gösteren bir kural oluşturunuz.

Yere Çarpma Sayısı	Cismin Yüksekliği (m)
1. çarpmadan sonra	
2. çarpmadan sonra	
3. çarpmadan sonra	

9. ÖRNEK

$\frac{\sqrt[3]{\sqrt{12}}}{\sqrt[6]{3}}$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

$\sqrt[3]{\sqrt{12}} = \sqrt[3\cdot 2]{12} = \sqrt[6]{12}$ ifadesi işlemde yerine yazıldığında

$\frac{\sqrt[3]{\sqrt{12}}}{\sqrt[6]{3}} = \frac{\sqrt[6]{12}}{\sqrt[6]{3}} = \sqrt[6]{\frac{12}{3}} = \sqrt[6]{4}$ bulunur.

6. Sıra Sizde

Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

a) $\frac{\sqrt{0,04} + \sqrt{0,36}}{\sqrt{0,09} - \sqrt{1,21}}$

b) $\frac{5\sqrt[3]{48} - \sqrt[3]{6}}{\sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[3]{2}}$

8. Uygulama

Kök Dereceleri Farklı Olan Köklü Gösterimlerle Çarpma ve Bölme İşlemleri Yapma

Verilen bilgileri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a, b pozitif gerçek sayı; m, n pozitif tam sayı ve $m \geq 2$, $n \geq 2$, $m \neq n$ olsun.

1. $\sqrt[m]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$ ve $\dfrac{\sqrt[m]{a}}{\sqrt[n]{b}}$ işlemleri nasıl yapılabilir? Varsayımlarınızı sınıf arkadaşlarınızla saygı çerçevesinde tartışarak oluşturunuz.

2. Tablo 1'de köklü gösterimlerin derecelerinin genişletilmesi ve sadeleştirilmesi işlemleri üslü gösterimler yardımıyla bulunmuştur. Verilmeyen işlemlerin sonuçlarını örneklerdeki gibi bularak ilgili yere yazınız.

Tablo 1

Üslü Gösterim	Üsse Yapılan İşlem	Köklü Gösterim	Elde Edilen Eşitlik
$3^{\frac{1}{2}}$	3 ile genişletme: $3^{\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 3}} = 3^{\frac{3}{6}}$	$\sqrt[6]{3^3}$	$\sqrt{3} = \sqrt[6]{3^3}$
$2^{\frac{1}{3}}$	2 ile genişletme:		
$5^{\frac{6}{4}}$	2 ile sadeleştirme: $5^{\frac{6 \,:\, 2}{4 \,:\, 2}} = 5^{\frac{3}{2}}$	$\sqrt{5^3}$	$\sqrt[4]{5^6} = \sqrt{5^3}$
$3^{\frac{12}{16}}$	4 ile sadeleştirme:		

3. 2. maddede yaptığınız işlemlerden yararlanarak Tablo 2'de verilen işlemleri örnekteki gibi yapınız.

Tablo 2


İstenen İşlem	Yapılan İşlem
$\sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{2}$	$\sqrt[2 \cdot 3]{3^{1 \cdot 3}} \cdot \sqrt[3 \cdot 2]{2^{1 \cdot 2}} = \sqrt[6]{27} \cdot \sqrt[6]{4} = \sqrt[6]{108}$
$\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{3}$	
$\sqrt[3]{6} : \sqrt{2}$	$\sqrt[3 \cdot 2]{6^{1 \cdot 2}} : \sqrt[2 \cdot 3]{2^{1 \cdot 3}} = \sqrt[6]{36} : \sqrt[6]{8} = \sqrt[6]{\dfrac{9}{2}}$
$\sqrt{10} : \sqrt[4]{5}$	

Tablo 2'de elde ettiğiniz sonuçlardan yararlanarak kök dereceleri farklı olan köklü gösterimlerle çarpma ve bölme işlemlerine dair genellemelerinizi oluşturunuz.

4. Varsayımlarınızla genellemelerinizi karşılaştırarak kök dereceleri farklı olan köklü gösterimlerle çarpma ve bölme işlemine dair önermelerinizi oluşturunuz.

5. Oluşturduğunuz önermeler yardımıyla verilen problemi çözünüz. Önermelerin problemin çözümünde ne tür kolaylıklar sağladığını ve başka hangi problem durumlarında kullanılabileceğini belirleyerek sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.


a, n pozitif tam sayı ve $n \geq 2$ olmak üzere




işlemi, a sayısının n. dereceden kökünü ifade etmektedir.

Şekilleri bağlayan okların anlamları aşağıda verilmiştir.

 : Sağındaki sayı ile solundaki sayı çarpılır.

 : Solundaki sayı, sağındaki sayıya bölünür.


Örneğin



$= \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt{3}$ şeklinde ifade edilir. Buradan işlemin sonucu

$\sqrt[4]{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[2 \cdot 2]{3^{1 \cdot 2}} = \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[4]{9} = \sqrt[4]{2 \cdot 9} = \sqrt[4]{18}$ bulunur.

Buna göre aşağıda verilen işlemin sonucunu bulunuz.



6. Oluşturduğunuz önermeleri matematiksel olarak doğrulayınız ve doğrulama yöntemlerinizi kullanışlılık açısından değerlendiriniz.

10. ÖRNEK

$\sqrt[6]{2} \cdot \sqrt[3]{5}$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

Köklü gösterimlerle çarpma ve bölme işlemlerinin yapılabilmesi için köklerin dereceleri eşit olmalıdır. Bu sebeple köklerin dereceleri eşitlenerek çarpma işlemi yapılır.

$\sqrt[6]{2} \cdot \sqrt[3]{5} = 2^{\frac{1}{6}} \cdot 5^{\frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 2}} = 2^{\frac{1}{6}} \cdot 5^{\frac{2}{6}} = \sqrt[6]{2} \cdot \sqrt[6]{5^2} = \sqrt[6]{2 \cdot 5^2} = \sqrt[6]{50}$ bulunur.

11. ÖRNEK

$a = \sqrt[6]{3}, b = \sqrt[3]{2}$ ve $c = \sqrt[9]{7}$ veriliyor. Buna göre a, b ve c sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

Köklerin dereceleri eşit olduğunda kök içinde olan sayılar arasındaki sıralama; a, b ve c arasındaki sıralamayı verir.

a, b ve c sayılarının köklerinin dereceleri 18'de eşitlenebilir.

$a = \sqrt[6]{3} = \sqrt[6 \cdot 3]{3^{1 \cdot 3}} = \sqrt[18]{27}$

$b = \sqrt[3]{2} = \sqrt[3 \cdot 6]{2^{1 \cdot 6}} = \sqrt[18]{64}$

$c = \sqrt[9]{7} = \sqrt[9 \cdot 2]{7^{1 \cdot 2}} = \sqrt[18]{49}$

Buradan $a < c < b$ olur.

7. Sıra Sizde

1. $\dfrac{\sqrt[4]{3} \cdot \sqrt[5]{2}}{\sqrt[10]{6}}$ **işleminin sonucunu bulunuz.**

2. $x = -\sqrt[4]{4}, y = -\sqrt[3]{3}$ ve $z = -\sqrt[6]{8}$ veriliyor.

Buna göre x, y ve z sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

9. Uygulama

Köklü Gösterimlerin Eşleniğini Bulma

Verilenlere göre soruları cevaplayınız.

a ve b pozitif gerçek sayı olsun.

1. Paydası köklü gösterim olan rasyonel ifadelerde toplama veya çıkarma işlemleri nasıl yapılabilir? $\dfrac{1}{\sqrt{a}}$ ve $\dfrac{1}{\sqrt{a} \pm \sqrt{b}}$ rasyonel ifadelerinin paydası rasyonel sayıya nasıl dönüştürülebilir? Varsayımınızı oluşturunuz.

2. a, b birbirinden farklı birer pozitif gerçek sayı olmak üzere tablodaki çarpma işlemlerini yaparak ulaştığınız sonuçları tabloda ilgili yere örneklerdeki gibi yazınız.

İşlem	Sonuç
$\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}$	$\sqrt{3 \cdot 3} = \sqrt{3^2} = 3$
$\sqrt{11} \cdot \sqrt{11}$	
$2\sqrt{5} \cdot \sqrt{5}$	
$\sqrt{a} \cdot \sqrt{a}$	
$\dfrac{1}{\sqrt{3}} \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$	
$\dfrac{1}{\sqrt{7}} \cdot \dfrac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}}$	
$\dfrac{3}{2\sqrt{6}} \cdot \dfrac{\sqrt{6}}{\sqrt{6}}$	
$\dfrac{1}{\sqrt{a}} \cdot \dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}}$	

$(\sqrt{5}-\sqrt{2})\cdot(\sqrt{5}+\sqrt{2})$	$\sqrt{5}\cdot\sqrt{5}+\sqrt{5}\cdot\sqrt{2}-\sqrt{2}\cdot\sqrt{5}-\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}=\sqrt{5^2}+\sqrt{10}-\sqrt{10}-\sqrt{2^2}$ $=5-2$ $=3$
$(\sqrt{7}-\sqrt{3})\cdot(\sqrt{7}+\sqrt{3})$	
$(2\sqrt{2}+1)\cdot(2\sqrt{2}-1)$	
$(3\sqrt{5}-2\sqrt{3})\cdot(3\sqrt{5}+2\sqrt{3})$	
$\frac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}\cdot\frac{\sqrt{5}+\sqrt{2}}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$	
$\frac{2}{\sqrt{2}+1}\cdot\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}-1}$	
$\frac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}\cdot\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$	
$\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\cdot\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}$	

3. Tabloda elde ettiğiniz sonuçlardan yararlanarak paydası köklü gösterimlerden oluşan sayıların paydasını rasyonel sayı yapma işlemiyle ilgili genellemelerinizi oluşturunuz.

4. Varsayımlarınızla genellemelerinizi karşılaştırarak paydası köklü gösterimlerden oluşan sayıların paydasını rasyonel sayı yapma işlemine dair önermelerinizi oluşturunuz.

5. Oluşturduğunuz önermeler yardımıyla aşağıda verilen problemi çözünüz. Önermelerin problemin çözümünde ne tür kolaylıklar sağladığını ve başka hangi problem durumlarında kullanılabileceğini sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.

g yer çekimi ivmesi (m/sn.^{2}) olmak üzere h yüksekliğinden (m) aşağı bırakılan cismin yere düşme süresi t sn. olsun. Cismin yere düşme süresini bulmak için $t=\sqrt{\frac{2h}{g}}$ sn. eşitliği kullanılır.

Bir cisim 0,5 m yükseklikten bırakılmıştır. Cisim yere çarptığı an ikinci bir cisim, 2 m yükseklikten bırakılmıştır. İlk cismin bırakıldığı andan ikinci cismin yere düştüğü ana kadar kaç saniye geçmiştir?
(g yer çekimi ivmesini 9,8 m/sn.^{2} alınız.)

6. Oluşturduğunuz önermeleri matematiksel olarak doğrulayınız. Doğrulama yöntemlerinizi sınıf arkadaşlarınızın kullandığı yöntemlerle karşılaştırarak kullanışlılık açısından değerlendiriniz.

12. ÖRNEK

$\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{2\sqrt{3}}$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

$\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{2\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{6}=\frac{3\sqrt{2}}{6}+\frac{\sqrt{3}}{6}=\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{3}}{6}$ olur.

$(\sqrt{2})$ $(\sqrt{3})$ (3)

13. ÖRNEK

$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1}-\frac{1}{\sqrt{3}+1}$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1}-\frac{1}{\sqrt{3}+1}=\frac{\sqrt{3}(\sqrt{3}+1)}{3-1}-\frac{\sqrt{3}-1}{3-1}=\frac{3+\sqrt{3}}{2}-\frac{\sqrt{3}-1}{2}=\frac{3+\sqrt{3}-\sqrt{3}+1}{2}=\frac{4}{2}=2$ bulunur.

$(\sqrt{3}+1)$ $(\sqrt{3}-1)$

8. Sıra Sizde

$\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{3}-1}+\frac{1}{\sqrt{2}}$ **işleminin sonucunu bulunuz.**

14. ÖRNEK

Ahmet Bey, 1200 m^2 lik kare şeklindeki arazisinin çevresini çitle çevirmek istemektedir. Ahmet Bey'in kullanacağı çit 5 metrelik paneller hâlinde satılmakta olup panelin tanesi 1700 Türk lirasıdır.

Buna göre Ahmet Bey'in bu işi en az maliyetle yaklaşık kaç Türk lirası harcayarak tamamlayabileceğini bulunuz.

Çözüm

Kare şeklindeki 1200 m^2 lik arazinin bir kenarının uzunluğu $\sqrt{1200}$ m'dir. Ahmet Bey'in kaç metre çite ihtiyacı olduğunu bulmak için bir kenar uzunluğunun yaklaşık değeri hesaplanmalıdır.

$\sqrt{1200}=\sqrt{20^2\cdot 3}=20\sqrt{3}$ olur.

$1^2<(\sqrt{3})^2<2^2$ olduğundan $\sqrt{3}$ sayısı, 1 ve 2 sayıları arasındadır.

$1 < 3 < 4$ olduğundan 3 sayısı 4'e daha yakındır. Buradan $\sqrt{3}$ sayısı 2'ye daha yakın olduğundan 1,5 ile 2 arasındadır.

$(1,5)^2 < (\sqrt{3})^2 < 2^2$ ise $2,25 < 3 < 4$ eşitsizliğinde 3 sayısı 2,25 sayısına daha yakın olduğundan $\sqrt{3}$ sayısı 1,5 ile $\frac{1,5+2}{2} = \frac{3,5}{2} = 1,75$ arasındadır.

$(1,5)^2 < (\sqrt{3})^2 < (1,75)^2$ ise $2,25 < 3 < 3,0625$ eşitsizliğinde 3 sayısı 3, 0625'e daha yakın olduğundan $\sqrt{3}$ sayısının yaklaşık değeri 1,75'tir.

Buradan $\sqrt{3} \approx 1,75$ olur.

Arazinin bir kenarının uzunluğu, $20\sqrt{3} \approx 20 \cdot 1,75 = 35\,m$ bulunur. Buradan arazinin çevre uzunluğu yaklaşık olarak $4 \cdot 35 = 140\,m$ bulunur.

Ahmet Bey'in $140 \div 5 = 28$ adet panel alması gerekmektedir.

Ahmet Bey, bu işi yaklaşık olarak en az $28 \cdot 1700 = 47\,600$ Türk lirası harcayarak tamamlayabilir.

Araştırma Ödevi

Aşağıda verilen adımları gerçekleştirerek araştırma ödevini zamanında ve eksiksiz tamamlayınız.

- Fizik, kimya ve biyoloji derslerinde üslü ve köklü gösterimlerin kullanıldığı durumları araştırınız.
- Astronomide, mühendislikte üslü ve köklü gösterimlerin kullanıldığı durumları araştırınız.
- Elde ettiğiniz bilgileri rapor hâline getirerek sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

Ödeviniz, derecelendirme ölçeği ile öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir.

Derecelendirme ölçeğine ulaşmak için karekodu okutunuz.

Kontrol Noktası

m, n, k pozitif tam sayı; $m \geq 2$, $n \geq 2$; x, y pozitif gerçek sayı ve a, b, c gerçek sayı olmak üzere

- $a\sqrt[n]{x} + b\sqrt[n]{x} - c\sqrt[n]{x} = (a+b-c)\sqrt[n]{x}$
- $\sqrt[n]{x} \cdot \sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{x \cdot y}$
- $\frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}} = \sqrt[n]{\frac{x}{y}}$
- $\sqrt[m]{\sqrt[n]{x}} = \sqrt[m \cdot n]{x}$
- $\sqrt[n]{x^m} = \sqrt[n \cdot k]{x^{m \cdot k}} = \sqrt[\frac{n}{k}]{x^{\frac{m}{k}}}$ (m ve n, k nin tam katıdır.)
- $\sqrt{x} \cdot \sqrt{x} = x$
- $\left(\sqrt{x} - \sqrt{y}\right) \cdot \left(\sqrt{x} + \sqrt{y}\right) = x - y$ eşitlikleri vardır.

Alıştırmalar

1 ve 2. soruları aşağıda verilen bilgilere göre cevaplayınız.

Aşağıdaki tabloda bazı şehirlerin yaklaşık yüz ölçümleri ve 2023 yılındaki nüfusları yaklaşık olarak verilmiştir.

Şehir	Yaklaşık Yüz Ölçümü (km^2)	Yaklaşık Nüfus
Tokyo	$2,2 \cdot 10^2$	$3,74 \cdot 10^7$
Delhi	$1,5 \cdot 10^2$	$3,14 \cdot 10^7$
Pekin	$1,6 \cdot 10^3$	$2,15 \cdot 10^7$

1. Pekin'in yüz ölçümünün Tokyo'nun yüz ölçümünden yaklaşık kaç m^2 fazla olduğunu bulunuz.

2. Bir bölgenin nüfus yoğunluğu kilometrekareye düşen insan sayısı ile belirlenir.

Buna göre

a) Tabloda verilen şehirlerin yaklaşık nüfus yoğunluklarını nasıl belirleyebileceğinize dair önermenizi oluşturunuz.

b) Oluşturduğunuz önerme yardımıyla Tokyo, Delhi ve Pekin'in yaklaşık nüfus yoğunluklarını hesaplayınız.

c) Tokyo, Delhi ve Pekin'in yaklaşık nüfus yoğunlukları sırasıyla a, b ve c olmak üzere a, b ve c değerlerini küçükten büyüğe sıralayınız.

3. $\dfrac{2^{2a} + 2^{2a-1}}{4^{a+1} - 2^{2a+3}}$ **ifadesinin eşitini bulunuz.**

4. $\left(16^{\frac{1}{4}} + 625^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{3}}$ **işleminin sonucunu bulunuz.**

5. $\dfrac{\sqrt{96} - 3\sqrt{54} + 5\sqrt{24}}{\sqrt{8} + 3\sqrt{50}}$ **işleminin sonucunu bulunuz.**

6. $\sqrt{20 + \sqrt{7} + \dfrac{18}{5 + \sqrt{7}}}$ **işleminin sonucunu bulunuz.**

Konu ile ilgili daha fazla soru çözmek için karekodu okutunuz.

Konu ile ilgili etkileşimli içeriğe ulaşmak için karekodu okutunuz.

1.2. GERÇEK SAYI ARALIKLARININ GÖSTERİMİNDE VE ARALIKLARLA İLGİLİ İŞLEMLERDE KÜME SEMBOL VE İŞLEMLERİ

Konuya Başlarken



İŞ İLANI

Çalışma arkadaşları arıyoruz!
25-35 yaş arasında
En az lise mezunu
Sektörde en az 3 yıl deneyimli
İşe alım sınavından en az 70 puan alan
Çalışma saatleri: Hafta içi 08.30-17.30
Ayda 25 000-30 000 TL arası kazanç imkânı

Yanda verilen iş ilanını inceleyiniz.

İşe alınacak kişilerde aranan şartlardan bazılarının belirttiği sayı değerleri matematiksel olarak nasıl ifade edilebilir?

Görüşlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

Sayı Kümeleri

Sayı doğrusu üzerinde iki farklı nokta arasında yer alan gerçek sayılar bir aralık belirtir. Gerçek sayılar, sayı doğrusu üzerinde veya aralık gösteriminden farklı olarak başka biçimlerde ifade edilebilir mi? 1 ile 6 arasındaki doğal sayılar, $\frac{1}{2}$ ile $\frac{16}{3}$ arasındaki rasyonel sayılar aralık şeklinde gösterilebilir mi? Aralık şeklinde ifade edilen veya edilemeyen sayı topluluklarına örnekler veriniz.

10. Uygulama

Sayı Kümeleri

Verilenleri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Bazı firmalara ait otobüslerin otogardan kalkış peronları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

- A firmasına ait otobüsler; karesi 100'den küçük, pozitif tam sayı olan numaralı peronlardan kalkış yapmaktadır.
- B firmasına ait otobüsler, numarası tek rakam olan peronlardan kalkış yapmaktadır.
- C firmasına ait otobüsler; numarası 25'ten küçük, çift, pozitif doğal sayı olan peronlardan kalkış yapmaktadır.
- D firmasına ait otobüsler, numarası iki basamaklı doğal sayı olan peronlardan kalkış yapmaktadır.

Peron numaralarının 1 ve 100 dâhil olmak üzere 1 ile 100 arasındaki tam sayılardan oluştuğu bilinmektedir.

1. Örneğin A firmasına ait otobüsler, 2 numaralı perondan kalkış yapmaktadır. Bu ifade, semboller yardımıyla "$2 \in A$" biçiminde de gösterilebilir. A firmasına ait otobüsler, 11 numaralı perondan kalkış yapmamaktadır. Bu ifade, semboller yardımıyla "$11 \notin A$" biçiminde de gösterilebilir. B, C ve D firmalarına ait otobüslerin kalktıkları peron numaralarından yararlanarak bu gösterimlere benzer örneklerin nasıl yazılacağına dair düşüncelerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. Sonuçlarınızı karşılaştırınız.

2. A firmasına ait otobüsler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. peronlardan kalkış yapmaktadır. Bu ifade, semboller kullanılarak $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ şeklinde yazılabilir. Bu gösterimde " { } " sembolü kullanılır ve sayıların arasına virgül konur.

A firmasına ait otobüslerin kalkış yaptığı peron numaraları $A = \{x \mid x^2 < 100, x \in \mathbb{Z}^+\}$ şeklinde de gösterilebilir. Bu gösterimde gösterilecek sayıların ortak özellikleri dikkate alınır. x değişkeni sayıları temsil eder. Genel olarak $A = \{x \mid x \text{ in sahip olduğu tanımlayıcı özellikler}\}$ şeklinde gösterilir. "|" sembolü "öyle ki" anlamına gelmektedir.

Buna göre B, C ve D firmalarına ait otobüslerin kalktıkları peron numaralarını belirleyerek iki farklı gösterimle yazınız.

B =

C =

D =

B =

C =

D =

3. A firmasına ait bilgideki pozitif tam sayı, pozitif rasyonel sayı olarak ifade edilseydi yine iki farklı gösterimle yazılabilir miydi? Gerekçelerinizle açıklayınız.

4. A firmasına ait otobüslerin kalkış yapacağı toplam 9 peron vardır. Bu ifade matematiksel olarak $s(A) = 9$ olarak yazılır ve A nın 9 tane sayıdan oluştuğunu ifade eder. B, C ve D firmalarına ait otobüslerin kalktıkları peron numaralarının kaçar tane olduklarını bularak matematiksel sembollerle yazınız.

5. A firmasına ait otobüslerin kalkış yapıp C firmasına ait otobüslerin kalkış yapmadığı peron numaraları, matematiksel olarak $A \setminus C$ şeklinde ifade edilir. Bu ifadeye karşılık gelen peron numaralarını belirleyiniz; 2. sorudaki gibi iki farklı gösterimle yazınız.

$A \setminus C =$

$A \setminus C =$

6. A veya B firmalarına ait otobüslerin kalkış yaptığı peron numaraları, matematiksel olarak $A \cup B$ şeklinde ifade edilir. Bu ifadeye karşılık gelen peron numaralarını belirleyiniz, 2. sorudaki gibi iki farklı gösterimle yazınız.

$A \cup B =$

$A \cup B =$

7. Hem C hem de D firmalarına ait otobüslerin kalkış yaptığı peron numaraları matematiksel olarak $C \cap D$ şeklinde ifade edilir. Bu ifadeye karşılık gelen peron numaralarını belirleyiniz, 2. sorudaki gibi iki farklı gösterimle yazınız.

$C \cap D =$

$C \cap D =$

8. A firmasına ait otobüslerin kalkış yapmadığı peron numaraları matematiksel olarak A' şeklinde ifade edilir. Bu ifadeye karşılık gelen peron numaralarını belirleyerek 2. sorudaki gibi iki farklı gösterimle yazınız.

$A' =$

$A' =$

9. B firmasına ait otobüslerin kalkış yaptığı tüm peronlardan A firmasına ait otobüsler de kalkış yapmaktadır. Bu durum matematiksel olarak $B \subseteq A$ biçiminde ifade edilir. A ve B firmasının kalkış yaptığı peronları belirleyerek listeleme yöntemiyle yazınız.

Kontrol Noktası

- Doğal sayılar, tam sayılar, çift tam sayılar, 3'ün katı olan doğal sayılar, rasyonel sayılar gibi sayı kümeleri **ortak özellik** veya **listeleme yöntemi** ile gösterilebilir.
- Sayı kümelerini oluşturan her bir sayıya o kümenin **elemanı** denir.
- Kümeler A, B, C gibi büyük harflerle ifade edilir. Listeleme yönteminde kümenin elemanları küme parantezi içinde ve aralarına virgül konarak verilir. A kümesinin elemanları $A = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ biçiminde gösterilir.
- Ortak özellik yönteminde kümenin elemanlarının taşıdığı şartlar veya ortak özellikler belirtilerek küme gösterilir. A kümesinin elemanları, $A = \{x \mid x \text{ in sahip olduğu tanımlayıcı özellikler}\}$ biçiminde gösterilir. "**A kümesi, x elemanlarından oluşmaktadır öyle ki x in sahip olduğu tanımlayıcı özellikler**" biçiminde okunur.
- Küme kavramına ilişkin semboller, işlemler ve anlamları tablodaki gibidir.

Sembol	Anlamı
$\cup$	birleşim
$\cap$	kesişim
$\setminus$	fark
A'	A kümesinin tümleyeni
$\varnothing$	boş küme

Sembol	Anlamı
$\in$	elemanıdır
$\notin$	elemanı değildir
$\subseteq$	alt küme
$s(A)$	A kümesinin eleman sayısı
$A = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$	A kümesinin elemanlarının listeleme yöntemiyle gösterimi

11. Uygulama

Sayı Kümelerinin Gösterimi

Tablodaki bilgileri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdaki tabloda bazı sayı kümeleri ortak özellik ve listeleme yöntemi ile gösterilmiştir. Tabloda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.

Sayı Kümeleri	Listeleme Yöntemi	Ortak Özellik Yöntemi
Doğal Sayılar Kümesi		$\mathbb{N} = \{x \mid x \geq 0, x \in \mathbb{Z}\}$
Tam Sayılar Kümesi	$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$	
3'ün Katı Olan Doğal Sayılar Kümesi		$K = \{x \mid x = 3k, k \in \mathbb{N}\}$
Tek Rakamlar Kümesi		$T = \{x \mid x = 2k + 1, 0 \leq k \leq 4, k \in \mathbb{Z}\}$
10'dan Küçük Asal Sayılar Kümesi	$A = \{2, 3, 5, 7\}$	
Çift Tam Sayılar Kümesi		$Ç = \{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$

2. 3 sayısının tabloda verilen sayı kümelerinden hangisi ya da hangilerinde bulunduğunu belirleyiniz. Cevabınızı matematiksel sembol kullanarak yazınız.

3. T ve A kümelerinde kaç tane eleman olduğunu bulunuz. T ve A kümelerinin eleman sayılarını matematiksel sembol kullanarak yazınız.

4. Doğal sayılar kümesindeki tüm elemanların aynı zamanda tablodaki başka hangi sayı kümesinin ya da kümelerinin elemanı olduğunu belirleyiniz. Cevabınızı matematiksel sembol kullanarak yazınız.

5. Her iki kümede de bulunan elemanları bir kez yazmak koşuluyla T ve A kümelerinin tüm elemanlarından oluşan kümeyi listeleme yöntemiyle yazınız. Elde ettiğiniz kümeyi sembol kullanarak yazınız.

6. Hem A hem de T kümesinde bulunan elemanların oluşturduğu kümeyi ortak özellik veya listeleme yöntemiyle yazarak sonuçlarınızı sınıf arkadaşlarınızın sonuçları ile karşılaştırınız. Elde ettiğiniz kümeyi sembol kullanarak yazınız. Sınıfça fikirlerinizi paylaşınız.

7. Tam sayılar kümesinde olup doğal sayılar kümesinde olmayan sayıları belirleyerek bu sayıların oluşturduğu kümeyi ortak özellik veya listeleme yöntemiyle yazınız. Sonuçlarınızı sınıf arkadaşlarınızın sonuçları ile karşılaştırınız. Elde ettiğiniz sayı kümesini sembol kullanarak yazınız.

8. Doğal sayıları ($\mathbb{N}$), tam sayıları ($\mathbb{Z}$), rasyonel sayıları ($\mathbb{Q}$) ve irrasyonel sayıları ($\mathbb{Q}'$) kapsayan bir küme var mıdır? Fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

9. Sıra Sizde

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Tabloda verilen sayı kümelerini listeleme veya ortak özellik yöntemi ile ifade ederek tabloyu doldurunuz.

Kümenin Adı	Kümenin Sözel İfadesi	Listeleme Yöntemi	Ortak Özellik Yöntemi
T	tek tam sayılar kümesi		
D	$\frac{5}{2}$ ile $10\sqrt{2}$ arasında olan doğal sayılar kümesi		
Ç	$-3 \cdot 10^{-2}$ ile 4^2 arasındaki çift tam sayılar kümesi		
G	$\frac{1}{2}$ ile 9 arasındaki gerçek sayılar kümesi		
B	–5'ten büyük rasyonel sayılar kümesi		

2. Tablodaki kümelerden yararlanarak aşağıdaki ifadeleri listeleme veya ortak özellik yöntemiyle gösteriniz.

a) T ∩ D

b) Ç \ D

c) G ∩ B

ç) G′

Konu ile ilgili etkileşimli içeriğe ulaşmak için karekodu okutunuz.

Kontrol Noktası

- a, A kümesinin elemanı ise $a \in A$; elemanı değilse $a \notin A$ biçiminde gösterilir. Kümelerde her eleman bir kez yazılır.
- Herhangi bir A kümesinin eleman sayısı, $s(A)$ ile gösterilir.
- Herhangi iki küme A ve B olmak üzere bu kümelerin elemanlarının tamamının oluşturduğu kümeye **A ve B kümelerinin birleşim kümesi** denir, $A \cup B$ biçiminde gösterilir. $A \cup B$ ifadesi, "**A birleşim B**" biçiminde okunur. Burada kullanılan "$\cup$" sembolü, "**birleşim**" anlamına gelir.
- Herhangi iki küme A ve B olmak üzere bu kümelerin ortak elemanlarından oluşan kümeye **A ve B kümelerinin kesişim kümesi** denir, $A \cap B$ biçiminde gösterilir. $A \cap B$ ifadesi, "**A kesişim B**" biçiminde okunur. Burada kullanılan "$\cap$" sembolü, "**kesişim**" anlamına gelir.
- A kümesinde olup B kümesinde olmayan elemanların oluşturduğu kümeye **A fark B kümesi** denir, $A \setminus B$ biçiminde gösterilir. $A \setminus B$ ifadesi, "**A fark B**" biçiminde okunur. Burada kullanılan "$\setminus$" sembolü, "**fark**" anlamına gelir.
- Bir A kümesinin elemanı olmayıp evrensel kümeye ait olan elemanların oluşturduğu küme, A' ile ifade edilir; "**A kümesinin tümleyeni**" biçiminde okunur. Burada kullanılan "$'$" sembolü, "**tümleme**" anlamına gelir.
- Herhangi bir A kümesindeki elemanların tümü bir B kümesinin de elemanı ise bu durum **A kümesinin B kümesine eşit** veya **A kümesinin B kümesinin alt kümesi** olduğu anlamına gelir. $A \subseteq B$ biçiminde gösterilir ve "**A alt kümesidir B nin**" biçiminde okunur. Burada kullanılan "$\subseteq$" sembolü, "**alt küme**" anlamına gelir.
- Gerçek sayılar kümesi $(\mathbb{R})$; doğal sayılar $(\mathbb{N})$, tam sayılar $(\mathbb{Z})$, rasyonel sayılar $(\mathbb{Q})$ ve irrasyonel sayılar $(\mathbb{Q}')$ kümelerini kapsayan en geniş kümedir. Üzerinde işlem yapılan kümelere ait tüm elemanları kapsayan kümeye **evrensel küme** denir. Verilen sayı kümeleri için gerçek sayılar kümesi, evrensel küme olarak ifade edilebilir.

Gerçek Sayı Aralıkları

Boks müsabakalarında sporcular kilolarına göre kategorilere ayrılmaktadır. Sporcuların yarışacağı kategoriler hafif sıklet, orta sıklet, ağır sıklet gibi terimlerle ifade edilmektedir. Örneğin genç erkek kategorisinde yer alan boksörlerden kütlesi 69-75 kg arası olanlar orta sıklet, 81-91 kg arası olanlar ağır sıklet olarak isimlendirilir. Orta sıklet veya ağır sıklette bulunan erkek boksörlerin kütlelerinin alacağı tüm sayı değerleri küme gösterimiyle nasıl ifade edilebilir? Küme gösterimi dışında farklı matematiksel gösterimler kullanılabilir mi? Buna benzer farklı gerçek yaşam durumlarına örnekler veriniz.

12. Uygulama

Aralıkların Gösterimi

Leyla'nın boyu 165 cm ve Ersin'in boyu 178 cm'dir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.



Leyla
165 cm

Ersin
178 cm

1. a) Ahmet'in boyu Leyla'nın boyundan uzun, Ersin'in boyundan kısa ise Ahmet'in boyunun (cm) alabileceği gerçek sayı değerleri küme gösterimi olarak nasıl ifade edilebilir?

b) Küme gösterimi olarak ortak özellik yöntemi mi, listeleme yöntemi mi tercih edilmelidir? Gerekçeleriyle birlikte açıklayınız.

2. $x \in \mathbb{R}$ olmak üzere Nehir'in boyu x cm olsun. Leyla ve Ersin'in boyuna göre x in alabileceği gerçek sayı değerlerinin bulunduğu aralık değerleri aşağıdaki tabloda dört farklı gösterimle verilmiştir. Tabloyu örnekteki gibi doldurunuz.

Sözel İfade	**Aralık Gösterimi ve Aralık Adı**	**Sayı Doğrusu Gösterimi**
Nehir'in boyu Leyla'nın boyundan uzun, Ersin'in boyundan kısadır.	$(165,178)$ açık aralık	
	Cebirsel Temsil $(x \in \mathbb{R})$	**Küme Gösterimi**
	$165 < x < 178, x \in \mathbb{R}$	$A = \{x \mid 165 < x < 178, x \in \mathbb{R}\}$
Sözel İfade	**Aralık Gösterimi ve Aralık Adı**	**Sayı Doğrusu Gösterimi**
Nehir'in boyu Leyla'nın boyuna eşit veya Leyla'nın boyundan uzun, Ersin'in boyundan kısadır.		
	Cebirsel Temsil $(x \in \mathbb{R})$	**Küme Gösterimi**

Sözel İfade	Aralık Gösterimi ve Aralık Adı	Sayı Doğrusu Gösterimi
Nehir'in boyu Leyla'nın boyundan uzun, Ersin'in boyuna eşit veya Ersin'in boyundan kısadır.	**Cebirsel Temsil** $(x \in \mathbb{R})$	**Küme Gösterimi**

Sözel İfade	Aralık Gösterimi ve Aralık Adı	Sayı Doğrusu Gösterimi
Nehir'in boyu Leyla'nın boyuna eşit veya Leyla'nın boyundan uzun, Ersin'in boyuna eşit veya Ersin' in boyundan kısadır.	**Cebirsel Temsil** $(x \in \mathbb{R})$	**Küme Gösterimi**

a) Tabloda sözel olarak verilen ifadelerin cebirsel temsil, sayı doğrusu, aralık ve küme gösterimleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları yazınız.

b) Farklı durumlar için cebirsel temsil, sayı doğrusu, aralık ve küme gösterimi yöntemlerinden hangisinin daha kullanışlı olduğunu belirleyerek gerekçelerinizi yazınız.

15. ÖRNEK

Aşağıda verilen gerçek yaşam durumlarını ifade eden gerçek sayı aralıklarını cebirsel temsil, sayı doğrusu, aralık ve küme gösterimi yöntemiyle gösteriniz.

a) Su 0 °C'ta donup 100 °C'ta buharlaştığına göre suyun sıvı ve katı hâlde olduğu sıcaklık değerlerinin aralığı.

b) Lunaparktaki çarpışan arabalara binmek isteyen bir kişinin boyunun en az 90 cm, en fazla 130 cm olması gerektiğine göre çarpışan arabalara binmek için gerekli boy aralığı.

Çözüm


a) Su, 0 °C'tan büyük ve 100 °C'tan küçük sıcaklık değerlerinde sıvı hâlde bulunur. Bu değerler, cebirsel olarak $x \in \mathbb{R}$ olmak üzere $0 < x < 100$ biçiminde ifade edilir. 0 ve 100 arasındaki gerçek sayılar, sayı doğrusu üzerinde aşağıdaki gibi gösterilir. 0 ve 100 aralığa dâhil olmadığı için bu sayılar sayı doğrusunda işaretlenmez.



Aralık gösterimi $(0, 100)$, küme gösterimi $A = \{x \mid 0 < x < 100, x \in \mathbb{R}\}$ biçimindedir.


Su, 0 °C ve 0 °C'tan daha düşük sıcaklık değerlerinde katı hâlde bulunur. Bu aralık, cebirsel olarak

$x \in \mathbb{R}$ olmak üzere $x \leq 0$ biçiminde ifade edilir. Sayı doğrusu üzerinde aşağıdaki gibi gösterilir. 0 aralığa dâhil olduğu için bu nokta, sayı doğrusunda işaretlenir.



Aralık gösterimi $(-\infty, 0]$, küme gösterimi $B = \{x \mid x \leq 0, x \in \mathbb{R}\}$ biçimindedir.

b) 90 ve 130 cm arasındaki uzunluk değerleri, cebirsel olarak $x \in \mathbb{R}$ olmak üzere $90 \leq x \leq 130$ biçiminde ifade edilir. Bu aralık, sayı doğrusu üzerinde aşağıdaki gibi gösterilir. 90 ve 130 aralığa dâhil olduğu için bu noktalar da sayı doğrusunda işaretlenir.



Aralık gösterimi $[90, 130]$, küme gösterimi $C = \{x \mid 90 \leq x \leq 130, x \in \mathbb{R}\}$ biçimindedir.

10. Sıra Sizde

1. Aşağıda verilen gerçek yaşam durumlarını ifade eden gerçek sayı aralıklarını cebirsel temsil, sayı doğrusu, aralık ve küme gösterimi yöntemiyle gösteriniz.


a) Bir filmin başlangıç saati 15.00, bitiş saati 17.00 olduğuna göre filmin gösterildiği zaman aralığı.

b) 1 saatlik yürüyüşte en az 250, en çok 300 kalori harcandığına göre bir saatlik yürüyüşte harcanan kalori miktarı aralığı.

c) Gümüş elementinin erime noktası yaklaşık olarak 962 °C olduğuna göre gümüş elementinin katı hâlde bulunmadığı sıcaklık değerlerinin aralığı.

2. Aşağıdaki tabloda gerçek sayı aralıklarının farklı gösterimleri verilmiştir.

$x \in \mathbb{R}$ olmak üzere tabloda eksik olan bölümleri uygun şekilde doldurunuz.

Cebirsel Temsil $(x \in \mathbb{R})$	Aralık Gösterimi ve Aralık Adı	Sayı Doğrusu Gösterimi	Küme Gösterimi
			
$-5 \leq x < 3,5$			
	$(6, 4\sqrt{5}]$ yarı açık aralık		
			$D = \{x \mid -3,9 \leq x \leq 4, x \in \mathbb{R}\}$
$x > \frac{7}{8}$			

13. Uygulama

Gerçek Sayı Aralıkları ve Sayı Aralıklarında İşlemler

Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.


Bir eğlence parkında macera odasına giriş, nefeskesen ve dönen şato oyuncaklarına biniş olmak üzere 3 farklı bilet satılmaktadır. Biletlerin kullanım kuralları aşağıdaki gibidir.



- Boyu 140 cm ve 180 cm arasındaki (140 ve 180 dâhil) misafirler için uygundur.
- 13 yaş ve üstü için uygundur.
- 13 ve 14 yaş arasındaki (13 ve 14 dâhil) misafirler, yanlarında refakatçi olmadan giremez.



- Boyu 150 cm ve 196 cm arasındaki (150 ve 196 dâhil) misafirler için uygundur.
- 12 yaş ve üstü için uygundur.
- 12 ve 15 yaş arasındaki (12 ve 15 dâhil) misafirler, yanlarında refakatçi olmadan binemez.



- Boyu 130 cm ve 190 cm arasındaki (130 ve 190 dâhil) misafirler için uygundur.
- 10 yaş ve üstü için uygundur.
- 10 ve 12 yaş arasındaki (10 ve 12 dâhil) misafirler, yanlarında refakatçi olmadan binemez.

1. Lunaparka gelen bir kişinin macera odası bileti alabildiği fakat nefeskesen bileti alamadığı bilindiğine göre bu kişinin boyu hangi aralıkta olabilir? Bulduğunuz aralığı cebirsel temsil, küme ve aralık olarak gösteriniz.

2. Macera odası, nefeskesen ve dönen şato biletlerini alabilmeniz için boyunuzun hangi aralıkta olması gerekir? Bulduğunuz sonucu aralık olarak gösteriniz.

3. Yanında refakatçisi olan ve 13 yaşından büyük birinin üç bileti de alabilmesi için boyu hangi aralıkta olmalıdır?

4. Aşağıda boy, yaş ve refakatçi bilgileri verilen dört arkadaşın hangi biletleri alıp alamayacaklarını belirleyerek tabloyu örnekteki gibi doldurunuz. Verilen soruları cevaplayınız.

Kişiler	Boy (cm)	Yaş	Refakatçi	Macera Odası Bileti	Nefeskesen Bileti	Dönen Şato Bileti
Deniz	141	13	Yok.	Alamaz.	Alamaz.	Alabilir.
Tekin	160	14	Yok.			
Sevgi	134	11	Var.			
Pınar	152	13	Var.			

a) Tablodaki kişilerden hangileri, sadece dönen şato bileti alabilir?

b) Tablodaki kişilerden hangileri, hem nefeskesen hem de macera odası bileti alabilir?

c) Tablodaki kişilerden hangileri macera odası bileti alamaz?

ç) Tablodaki kişilerden hangileri, macera odası bileti alıp nefeskesen bileti alamaz?

11. Sıra Sizde

1. Bir elektronik mağazası, fiyatı 1500 Türk lirasından fazla olan kablosuz kulaklıklara indirim uygulamaktadır.

Bu mağazada satılan en pahalı kablosuz kulaklık 8200 Türk lirası olduğuna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) İndirime dâhil olan kablosuz kulaklık fiyatlarının cebirsel temsilini yazınız.

b) İndirime dâhil olan kablosuz kulaklık fiyatlarını aralık ve küme gösterimi ile yazınız.

2. Trafik Kanunu'na göre bir otomobilin yerleşim yeri içinde hızı saatte 50 km'yi, yerleşim yeri dışında çift yönlü yollarda saatte 90 km'yi aşamaz. Bu kurala uymayan sürücülere trafik cezası uygulanır.

Bir otomobilin yerleşim yeri içindeki ve dışındaki çift yönlü bir yolu kullanarak yolculuk yaptığı bilindiğine göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Otomobilin yerleşim yeri içindeki hızının alabileceği değerlerin cebirsel temsilini yazarak bu değerleri aralık biçiminde gösteriniz.

b) Otomobilin yerleşim yeri dışındaki hızının alabileceği değerlerin cebirsel temsilini yazarak bu değerleri aralık biçiminde gösteriniz.

c) Sürücünün tüm yolculuk boyunca hızının sabit olduğu ve hız değerinin trafik kurallarına uygun olduğu biliniyor.

Buna göre kümelerde işlemler özellikleri yardımıyla hızının alacağı değerlerin aralığını bulunuz.

14. Uygulama

Gerçek Sayı Aralıkları ile Yapılan İşlemler

Dilan Hanım cumartesi günü Kerem'i resim, Sıla'yı aynı binada bulunan bale kursuna götürecektir. Dilan Hanım evden çocuklarıyla birlikte çıkacak, kurslar bitene kadar onları bekleyecek, çocuklarıyla birlikte eve dönecektir. Resim kursu saat 10.00'da başlayıp 14.00'te bitmektedir. Bale kursu saat 11.00'de başlayıp 13.00'te bitmektedir.

Buna göre aşağıda belirtilen zaman aralıklarının sayı doğrusu üzerinde, aralıkla ve cebirsel temsillerle gösterimini içeren tablodaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.




a) Kursların devam ettiği zaman aralığı.

b) Hem resim hem de bale kursunun aynı anda olduğu zaman aralığı.

c) Çocuklarını resim ve bale kursuna götüren Dilan Hanım'ın çocuklarını beklediği zaman aralığı.


ç) Dilan Hanım'ın Sıla ile birlikte Kerem'i beklediği zaman aralığı.

d) Cumartesi günü Kerem'in resim kursunda olmadığı zaman aralığı.

Zaman Aralığının Küme Gösterimi	Sayı Doğrusu Gösterimi	Aralık Gösterimi	Cebirsel Temsil $(x \in \mathbb{R})$
a) A kümesi (Resim Kursu) B kümesi (Bale Kursu)		$[10,14)$	$10 \leq x < 14$
b) $A \cap B$			
c) $A \cup B$			
ç) $A \setminus B$			
d) A'		$[0,10) \cup [14,24)$	

16. ÖRNEK

Ali Bey, evindeki buzdolabı ve çamaşır makinesini yenilemek istediği için bir fiyat araştırması yapmıştır. Yaptığı araştırma sonucunda Ali Bey'in buzdolabı ve çamaşır makinesinin fiyat aralıklarına ilişkin ulaştığı veriler, aşağıdaki görselde ifade edilmiştir.



Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.


a) Çamaşır makinesi ve buzdolabı fiyat aralıklarını sayı doğrusu üzerinde, aralık şeklinde ve cebirsel olarak gösteriniz.

b) Çamaşır makinesi fiyat aralığındaki gerçek sayılar kümesi A, buzdolabı fiyat aralığındaki gerçek sayılar kümesi B olmak üzere $A \cap B$, $A \cup B$, $B \setminus A$ ve A' kümelerini cebirsel olarak gösteriniz.

c) Ali Bey, seçtiği çamaşır makinesini peşin ödeyerek satın almaya karar vermiştir. Bankamatikten çektiği paralar sadece 200 Türk liralık banknotlardan oluştuğuna göre Ali Bey'in bankamatikten çektiği banknot sayısının en az ve en fazla kaç adet olabileceğini bulunuz.

Çözüm

a) Görsel incelendiğinde çamaşır makinesi fiyatlarının $[7300, 53\,000]$nda ve buzdolabı fiyatlarının $[7500, 110\,000]$nda değiştiği görülmektedir. Bu fiyat aralıkları, sayı doğrusunda aşağıdaki gibi gösterilir.



$x \in \mathbb{R}$ olmak üzere $[7300, 53\,000]$ nın cebirsel temsili $7300 \leq x \leq 53\,000$ ve $[7500, 110\,000]$nın cebirsel temsili $7500 \leq x \leq 110\,000$ biçimindedir.

b) $x \in \mathbb{R}$ olmak üzere

$A \cap B$ kümesinin cebirsel temsili $7500 \leq x \leq 53\,000$,

$A \cup B$ kümesinin cebirsel temsili $7300 \leq x \leq 110\,000$,

$B \setminus A$ kümesinin cebirsel temsili $53\,000 < x \leq 110\,000$,

A' kümesinin cebirsel temsili $x < 7300$ ve $x > 53\,000$ biçimindedir.

c) Ali Bey en ucuz çamaşır makinesinden almak isterse satıcıya 7400 Türk lirası ödemeli ve 100 Türk lirası para üstü almalıdır. 7400 Türk lirası ödemesi için Ali Bey'in bankamatikten en az $\frac{7400}{200} = 37$ adet 200 Türk liralık banknot çekmesi gerekir. Benzer şekilde en pahalı çamaşır makinesinden almak isterse satıcıya 53 000 Türk lirası ödemesi gerekir. 53 000 Türk lirası ödemesi için bankamatikten en fazla $\frac{53\,000}{200} = 265$ adet 200 Türk liralık banknot çekmesi gerekir.

12. Sıra Sizde

Tabloda 1 aylık kız ve erkek bebeklerin baş çevrelerinin olması gereken en az ve en çok uzunluk değerleri verilmiştir.

	Baş Çevresi Uzunluğu (cm)	
	En Az	**En Çok**
Kız Bebek	34,8	39,5
Erkek Bebek	35,3	40,5

1 aylık kız bebeklerin ideal baş çevresi uzunluğunun değer aralığı A kümesiyle, 1 aylık erkek bebeklerin ideal baş çevresi uzunluğunun değer aralığı B kümesiyle gösterilsin.

Buna göre aşağıdaki kümeleri sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. Küme gösterimi ve cebirsel temsille ifade ediniz.

a) $A \cap B$

b) $A \cup B$

c) $A \setminus B$

ç) $B \setminus A$

Aralıkların Mutlak Değer Gösterimi



1915 Çanakkale Köprüsü toplam 4608 metre uzunluğunda olup dünyanın en uzun asma köprüsüdür (Görsel 1.4). Sıcaklık değişimi nedeniyle asma köprüler, bir miktar esneme ve daralma payına sahiptir. Asma köprülerin esneme veya daralma payı, en fazla 2 metredir. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün metre cinsinden uzunluğunun esneme veya daralma sonucu alabileceği sayı değerleri hangi matematiksel kavramlarla ifade edilebilir?


Görsel 1.4: *1915 Çanakkale Köprüsü*

15. Uygulama

Aralıkların Mutlak Değer Gösterimi

Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Uzunluğu 3 birim olan ipin bir ucu, sayı doğrusu üzerindeki 1 noktasına sabitleniyor. İpin diğer ucu gergin bir şekilde 1 noktasının soluna ve sağına doğru şekildeki gibi uzatılarak sayı doğrusunun üzerine çakıştırılıyor.



1. İpin ucunun sayı doğrusu üzerinde ulaşabileceği en büyük ve en küçük değerler hangileridir?

2. İpin sayı doğrusu üzerinde temas edebildiği gerçek sayılar kümesini ifade ediniz. Bu aralığı sayı doğrusu üzerinde, cebirsel olarak ve kümeyle gösteriniz.

3. İpin sayı doğrusu üzerinde ulaşabildiği gerçek sayılar kümesini ifade eden aralık, mutlak değerli eşitsizlik olarak nasıl ifade edilebilir? Bu gösterimin ne anlama geldiğini nasıl ifade edebilirsiniz? Fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.

4. İpin sayı doğrusu üzerinde ulaşamadığı gerçek sayılar kümesi aralık, mutlak değerli eşitsizlik olarak nasıl ifade edilebilir? Bu gösterimin ne anlama geldiğini nasıl ifade edebilirsiniz? Fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.

17. ÖRNEK

Aşağıdaki tabloda A ve B bitkilerinin dayanabildikleri en düşük ve en yüksek ortalama sıcaklık (°C) değerleri verilmiştir.

	Bitkinin Dayanabildiği En Düşük Ortalama Sıcaklık Değeri (°C)	Bitkinin Dayanabildiği En Yüksek Ortalama Sıcaklık Değeri (°C)
A	−11	41
B	−20	10

Tablodaki bilgilerden yararlanarak A ve B bitkilerinin sıcağa dayanıklılık aralıklarını mutlak değerli eşitsizlik olarak ifade ediniz.

Çözüm

- A bitkisinin dayanabildiği en düşük ve en yüksek sıcaklıkların ortalaması $\frac{-11+41}{2} = 15$ °C'tur. 15'in −11 ve 41'e olan uzaklığı, $|-11-15| = |41-15| = 26$ olarak bulunur. Buna göre bitkinin dayanabildiği en düşük ve en yüksek sıcaklık değeri, bu değerlerin ortalamasından 26 °C sapmaktadır. Buradan A bitkisinin sıcağa dayanıklılık aralığı $[-11, 41]$ olup mutlak değerli eşitsizlik olarak $x \in \mathbb{R}$ olmak üzere $|x-15| \leq 26$ biçiminde gösterilir.


- B bitkisinin dayanabildiği en düşük ve en yüksek sıcaklıkların ortalaması $\frac{-20+10}{2} = -5$ °C'tur. −5'in −20 ve 10'a olan uzaklığı, $|-20-(-5)| = |10-(-5)| = 15$ olarak bulunur. Buna göre bitkinin dayanabildiği en düşük ve en yüksek sıcaklık değeri, bu değerlerin ortalamasından 15 °C sapmaktadır. Buradan B bitkisinin sıcağa dayanıklılık aralığı $[-20, 10]$ olup mutlak değerli eşitsizlik olarak $x \in \mathbb{R}$ olmak üzere $|x-(-5)| \leq 15 \Rightarrow |x+5| \leq 15$ biçiminde gösterilir.

18. ÖRNEK

Bir a gerçek sayısı ile 5 sayısı arasındaki farkın $\frac{21}{4}$'ten büyük olduğu biliniyor. Bu şartı sağlayan gerçek sayıları mutlak değerli eşitsizlik ve aralık şeklinde ifade ediniz.

Çözüm

a gerçek sayısı ile 5 sayısı arasındaki fark $|a-5|$ olarak ifade edilir. Buradan soruda verilen ifade mutlak değerli eşitsizlik olarak $|a-5| > \frac{21}{4}$ şeklinde yazılır.



$|a-5| > \frac{21}{4}$ eşitsizliği, cebirsel olarak $a-5 > \frac{21}{4}$ veya $5-a > \frac{21}{4}$ şeklinde gösterilir.

Buradan $a-5 > \frac{21}{4} \Rightarrow a > \frac{21}{4}+5 \Rightarrow a > \frac{41}{4}$ veya $-a+5 > \frac{21}{4} \Rightarrow 5-\frac{21}{4} > a \Rightarrow -\frac{1}{4} > a$ olur.

Bulunan cebirsel ifadelerin aralık gösterimi $\left(-\infty, -\frac{1}{4}\right) \cup \left(\frac{41}{4}, \infty\right)$ şeklindedir.

13. Sıra Sizde

1. İnsanlarda ortalama ideal vücut sıcaklığı değeri 37 °C'tur. Bu değerin 4 °C üzerindeki değerlerde nefes alamama, şiddetli baş ağrısı, bayılma, su kaybı ve aşırı terleme görülür; tıbbi müdahale gerekir. Benzer şekilde 37 °C'un 4 °C altındaki değerlerde birey bazı hareketlere tepki veremez, nefes almakta güçlük çeker, bireyin nabzı düşer ve uykusu gelir. Her iki durumda da birey hayati risk taşıyan vücut sıcaklığı eşik değerine gelir.

Buna göre hayati risk taşımayan vücut sıcaklığı aralığını mutlak değerli eşitsizlik olarak yazınız.

2. Bir akvaryumda bulunan balıklar için ideal su sıcaklığı 25 °C'tur. Su sıcaklığını kontrol eden bir sıcaklık sensörlü motor, ideal sıcaklık ile ölçülen sıcaklık arasında 3 °C'tan fazla fark olması durumunda devreye girerek suyu balıkların ideal yaşama sıcaklığına getirmektedir.

Buna göre sıcaklık sensörlü motorun devreye gireceği sıcaklık aralığını mutlak değerli eşitsizlik olarak yazınız.

Performans Görevi

Aydınlatma Ürünlerinin Enerji Verimliliği

η_{TM}, bir optik sistemdeki ışık geçiş verimliliğini ifade eden verimlilik katsayısıdır. Işığın optik sisteme girişinden çıkışına kadar ışık enerjisinin ne kadarının sistemi geçtiği, ne kadarının sistemde kaybolduğu bu verimlilik katsayısıyla ifade edilir. 1 Eylül 2021'de yürürlüğe giren yasa ile aydınlatma ürünleri için enerji verimliliğini ifade eden sınıflama zorunlu hâle getirilmiştir.

Bu görevde sizden aydınlatma ürünlerinin verimlilik katsayılarına, enerji verimliliği sınıfına, okulunuzda bulunan aydınlatma ürünlerinin enerji verimliliğine göre hangi sınıfta olduğuna dair bilgileri araştırmanız, elde ettiğiniz verileri sınıfta farklı matematiksel temsillerle göstermeniz, araştırdığınız bilgiler yardımıyla tabloyu doldurmanız ve çalışmanızı sınıfta poster şeklinde hazırlayarak sınıf arkadaşlarınıza sunmanız beklenmektedir.

Göreve başlamadan önce aşağıdaki hususa dikkat ediniz.

- Çalışmanın yapılış basamaklarını belirleyiniz.

Görev esnasında aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

- Araştırmanız sonucunda elde ettiğiniz bilgilerden yararlanarak tabloyu uygun değerlerle doldurunuz.

Enerji Verimliliği Sınıfı	η_{TM} Verimlilik Katsayısının Değer Aralığı (lm/W)
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

- A, B, C, D, E, F ve G verimlilik sınıflarına ait η_{TM} değer aralıklarını sayı doğrusu üzerinde, cebirsel ve küme gösterimiyle ifade ediniz.
- Aşağıda η_{TM} değerleri verilen aydınlatma ürünlerinin hangi enerji verimliliği sınıfında olabileceğini tablodaki bilgilerden yararlanarak bulunuz.

  a) $\eta_{TM} = 3^5$ lm/W

  b) $\eta_{TM} = 0,0128 \cdot 10^4$ lm/W

  c) $\eta_{TM} = 60\sqrt{10}$ lm/W

Görev bitiminde aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.






- Tabloyu ve elde ettiğiniz bilgileri sınıf ortamında poster şeklinde hazırlayarak arkadaşlarınıza sununuz.
- Çalışmanızı öğretmeninize zamanında teslim ediniz.

Performans göreviniz, analitik dereceli puanlama anahtarı ile öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir.

Analitik dereceli puanlama anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

Kontrol Noktası

- Sayı doğrusu, gerçek sayıların bir temsilidir.
- Gerçek sayı aralıkları cebirsel temsil, sayı doğrusu ve küme gösterimiyle ifade edilebilir.
- Gerçek sayı aralıkları ve bu aralıklarla yapılacak işlemler için evrensel küme, gerçek sayılar kümesidir.
- $a, b \in \mathbb{R}$ ve $a < b$ olmak üzere gerçek sayı aralıklarının gösterim biçimleri tablodaki gibi ifade edilebilir.

Aralık	Sayı Doğrusu	Cebirsel Temsil ($x \in R$)	Küme Gösterimi
(a, b)		$a < x < b$	$A = \{x \mid a < x < b, x \in \mathbb{R}\}$
$[a, b)$		$a \leq x < b$	$B = \{x \mid a \leq x < b, x \in \mathbb{R}\}$
$(a, b]$		$a < x \leq b$	$C = \{x \mid a < x \leq b, x \in \mathbb{R}\}$
$[a, b]$		$a \leq x \leq b$	$D = \{x \mid a \leq x \leq b, x \in \mathbb{R}\}$
$(-\infty, a)$		$x < a$ veya $a > x$	$F = \{x \mid x < a, x \in \mathbb{R}\}$
$(-\infty, a]$		$x \leq a$ veya $a \geq x$	$G = \{x \mid x \leq a, x \in \mathbb{R}\}$
(b, ∞)		$x > b$ veya $b < x$	$H = \{x \mid x > b, x \in \mathbb{R}\}$
$[b, \infty)$		$x \geq b$ veya $b \leq x$	$I = \{x \mid x \geq b, x \in \mathbb{R}\}$

- (a, b) nın mutlak değerli eşitsizlik olarak gösterimi $x \in \mathbb{R}$, $c = \frac{a+b}{2}$ ve $d = \frac{|a-b|}{2}$ olmak üzere $|x - c| < d$ biçimindedir.
- $[a, b]$ nın mutlak değerli eşitsizlik olarak gösterimi $x \in \mathbb{R}$, $c = \frac{a+b}{2}$ ve $d = \frac{|a-b|}{2}$ olmak üzere $|x - c| \leq d$ biçimindedir.

$x, a \in \mathbb{R}$ ve $b \in \mathbb{R}^+$ olmak üzere

- $|x - a| < b$ eşitsizliğinin aralık gösterimi, $(-b + a, b + a)$ biçimindedir.
- $|x - a| \leq b$ eşitsizliğinin aralık gösterimi, $[-b + a, b + a]$ biçimindedir.
- $|x - a| > b$ eşitsizliğinin aralık gösterimi, $(-\infty, -b + a) \cup (b + a, \infty)$ biçimindedir.
- $|x - a| \geq b$ eşitsizliğinin aralık gösterimi, $(-\infty, -b + a] \cup [b + a, \infty)$ biçimindedir.

Alıştırmalar

1. Aşağıdaki tabloda gerçek sayı aralıklarının farklı gösterimleri verilmiştir.
Buna göre tabloda boş bırakılan bölümleri uygun şekilde doldurunuz.

Sözel İfade	Cebirsel Temsil $(x \in \mathbb{R})$	Küme ve Aralık Gösterimi	Sayı Doğrusu Üzerinde Gösterim
En küçük iki basamaklı negatif tam sayı ile en küçük üç basamaklı pozitif tam sayı arasındaki gerçek sayılar			
	$-\frac{13}{3} \leq x < \frac{1}{2}$		
		$C = \{x \mid 1 < x, x \in \mathbb{R}\}$ $(1, \infty)$	
	$(-2)^3 < x < \sqrt{3}$		
			

2. **$x \in \mathbb{R}$ olmak üzere aşağıda verilen mutlak değerli eşitsizlikleri aralık gösterimiyle yazınız.**

a) $|x-1| < 7$

b) $|x+2| \leq 4$

c) $\left|x-\frac{3}{2}\right| > 5$

ç) $|x-\sqrt{2}| \geq \sqrt{8}$

3. Aşağıda verilen ifadeleri mutlak değerli eşitsizlik olarak yazınız.

a) $\left(\frac{11}{3}, \frac{19}{3}\right)$

b) $[\pi, 3\pi]$

c) $(-\infty, -1) \cup (7, \infty)$

ç) $(-\infty, -\frac{11}{6}] \cup [-\frac{5}{6}, \infty)$

4. $A = [-2, 13]$ **ve** $B = (-4, 10]$ **gerçek sayı aralıkları olmak üzere aşağıdaki kümeleri sayı doğrusu üzerinde gösteriniz ve cebirsel temsille ifade ediniz.**

a) $A \cap B$

b) $A \cup B$

c) $A \setminus B$

ç) $B \setminus A$

d) A'

e) B'


5. Bir havacılık ve uzay bilimleri fakültesi, kayıt ve kabul koşullarında pilotaj bölümüne alınacak öğrencilerin boyunun en az 165 cm ve en fazla 195 cm olması gerektiğini belirtmiştir.

Buna göre pilotaj bölümüne kabul için gerekli boy (cm) aralığını mutlak değerli eşitsizlik olarak yazınız.

Konu ile ilgili daha fazla soru çözmek için karekodu okutunuz.


1.3. SAYI KÜMELERİNİN ÖZELLİKLERİ

Konuya Başlarken




Görsel 1

Eski çağlardan itibaren insanlar mevsim ve ay döngülerini takip etmek, avladıkları hayvan sayısının miktarını belirtmek gibi durumlar için mağara duvarlarına veya ağaç gövdelerine attıkları çentiklerden yararlanmışlardır (Görsel 1).



Görsel 2

Antik Mısır medeniyetinde yaklaşık 3000 yıl önce sayılar, hiyerogliflerin tekrar edilmesiyle ifade edilmiştir. Büyük sayıları göstermek için 10'un katlarını tercih eden Antik Mısırlılar, kesirleri birim kesirler yardımıyla göstermiştir (Görsel 2).



Görsel 3

Konumsal yazım, matematikte sayıların değerinin sayının yazılışındaki konumuna bağlı olduğu bir sayı yazım sistemidir. Sembolleri tekrar ederek büyük sayıları yazmak zorlaşınca bazı medeniyetler, sayıların gösteriminde konumsal yazımı tercih etmiştir. Mezopotamya coğrafyasında MÖ 1894-MÖ 539 yılları arasında hüküm süren Babilliler, altmışlık sayı sistemiyle konumsal yazım kullanmıştır (Görsel 3).

Örneğin YBC 7289 adındaki Babil kil tabletinde Görsel 3'te verilen sayı yer almaktadır. Bu sayının günümüzdeki gösterimi $1 \cdot 60^0 + 24 \cdot 60^{-1} + 51 \cdot 60^{-2} + 10 \cdot 60^{-3}$ şeklindedir. Babilliler, gösterimlerinde basamakları ayırmak için aralarına boşluk koymuştur.

İkişer kişilik gruplar oluşturarak aşağıdaki sorularla ilgili fikirlerinizi önce grubunuzla, daha sonra sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. Antik Mısırlıların kullandığı 10 ve 10'un kuvveti olan sayılar, günümüzde farklı olarak üslü şekilde gösterilmektedir. Bu farklılığın sebepleri neler olabilir?

2. Mezopotamya coğrafyasında hangi sayı sistemlerinden yararlanılmıştır?

3. Babillilerin kullandığı $1 \cdot 60^0 + 24 \cdot 60^{-1} + 51 \cdot 60^{-2} + 10 \cdot 60^{-3}$ ifadesi 1,4142'ye eşittir. Babilliler, bu gösterimle ifade ettikleri sayıları günlük hayatta hangi amaçla kullanmış olabilir?

Sayı kümelerinin tarihî gelişimi, matematiksel düşüncenin insan ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl değiştiğini göstermektedir. Her bir yeni kavram ve sayı kümesi, matematiksel bilgi birikimini genişletmiş ve matematiğin uygulamalarını çeşitlendirmiştir.

16. Uygulama

Serbest Düşme

Üçer kişilik gruplara ayrılarak aşağıda verilenleri inceleyiniz.

Bir cismin yer çekimi kuvvetinin etkisiyle yaptığı hareket, serbest düşmedir. Düşme sırasında cismin üzerine herhangi bir dış kuvvet uygulanmaz ve hava direnci gibi faktörler de göz ardı edilir. g yer çekimi ivmesini $(m/sn.^2)$ göstermek üzere serbest düşme hareketi yapan bir cismin t saniye sonunda ilk konumuna göre yer değiştirme (m) miktarı $x = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$ eşitliği ile hesaplanabilir.

Yer çekimi ivmesi gök cisimlerine göre farklılık göstermektedir. Tablo 1'de Dünya, Ay ve Mars'ın yer çekimi ivmelerinin $(m/sn.^2)$ yaklaşık değerleri verilmiştir.

Tablo 1

Gök Cismi	Yer Çekimi İvmesi $(m/sn.^2)$
Dünya	9,8
Ay	1,6
Mars	3,7

Tablo 2'de farklı gök cisimlerinde aynı yükseklikten bırakılan bir cismin serbest düşme hareketi yaparken ilk konumuna göre yer değiştirme miktarları (m) verilmiştir.

Örneğin Dünya'da belirli bir yükseklikten serbest düşme hareketine başlayan bir cismin 2 saniye sonunda ilk konumuna göre yer değiştirme miktarı (m), yaklaşık olarak $x = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 \Rightarrow x = \frac{1}{2} \cdot 9{,}8 \cdot 2^2 = 19{,}6$ m bulunur.

Tablo 2

Dünya		Ay		Mars	
t (sn.)	x (m)	t (sn.)	x (m)	t (sn.)	x (m)
2	19,6	2		2	
1,3		1,3		1,3	
1,25		1,25		1,25	

Grup içinde her bir kişinin birer gök cismini seçmesi koşuluyla gök cisimlerini paylaşarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Hesap makinesi yardımıyla Tablo 2'yi örnekteki gibi tamamlayınız.

2. Tablo 2'de elde edilen yer değiştirme miktarlarını ifade etmek için hangi sayı kümelerine ve sayıların farklı temsillerine ihtiyaç duyulduğunu gerekçeleriyle açıklayınız.

3. "Mars'ta belirli bir yükseklikten serbest düşme hareketine başlayan bir cisim, kaç saniye sonra ilk konumuna göre 74 m yer değiştirir?" sorusunu cevaplamak için hangi sayı kümelerinin elemanlarına ihtiyaç vardır?

Sayı Kümelerinin Sıralı Olması ve Herhangi İki Sayı Arasındaki Sayıları Belirleme

Sayı kümelerinin sıralı olması, o kümedeki elemanların birbirleriyle karşılaştırılabilir ve bir düzen içinde sıralanabilir olması anlamına gelir.

17. Uygulama

Sayı Kümelerinin Sıralama Özelliklerini İnceleme

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Doğal sayılar ($\mathbb{N}$), tam sayılar ($\mathbb{Z}$), rasyonel sayılar ($\mathbb{Q}$) ve gerçek sayılar ($\mathbb{R}$) kümelerinde sıralama ile ilgili hangi özelliklerin olduğu söylenebilir? Varsayımlarınızı sınıf arkadaşlarınızla saygı çerçevesinde tartışarak oluşturunuz.

2. Tabloda bazı sıralama özellikleri verilmiştir. Her sayı kümesi için o kümeden seçeceğiniz a, b, c sayıları ile sıralama özelliklerinin doğruluğunu örneklerdeki gibi gösteriniz.

Sıralama Özelliği \ Sayı Kümeleri	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
$a \leq a$	$3 \leq 3$	$-2 \leq -2$	$\frac{2}{5} \leq \frac{2}{5}$	$\sqrt{5} \leq \sqrt{5}$
$a \leq b$ veya $b \leq a$				
$a \leq b$ ve $b \leq a$ ise $a = b$ dir.				
$a \leq b$ ve $b \leq c$ ise $a \leq c$ dir.				
$a \leq b$ ise $a + c \leq b + c$ dir.				
$a \leq b$ ve $0 \leq c$ ise $a \cdot c \leq b \cdot c$ dir.				
$a \leq b$ ve $0 \geq c$ ise $a \cdot c \geq b \cdot c$ dir.				
$0 < a < b$ veya $a < b < 0$ ise $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ dir.				
$0 < a < b$ ise $a^n < b^n$ dir. $(n \in Z^+)$				

3. Tabloda elde ettiğiniz sonuçlardan yararlanarak $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ ve $\mathbb{R}$ kümelerinin sıralama özellikleriyle ilgili genellemelerinizi oluşturunuz.

4. Varsayımlarınızla genellemelerinizi karşılaştırarak $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ ve $\mathbb{R}$ kümelerinin sıralama özelliklerine dair önermelerinizi oluşturunuz.

5. Oluşturduğunuz önermeler yardımıyla aşağıda verilen problemi çözünüz. Önermelerin problemin çözümünde ne tür kolaylıklar sağladığını ve başka hangi problem durumlarında kullanılabileceğini sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.

A, B ve C bitkilerinin boyları (cm) ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.

A bitkisinin boyu, C bitkisinin boyundan uzundur.

B bitkisinin boyu, C bitkisinin boyuna eşit veya C bitkisinin boyundan kısadır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) A ve C, B ve C, A ve B bitkilerinin boylarını karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi eşitsizlik sembolleriyle ifade ediniz.

b) A, B ve C bitkilerinin boyları (cm), hangi sayı kümelerinin elemanı olabilir? Üç bitkinin boyları arasındaki ilişkiler, sayı kümelerinin hangi sıralama özellikleriyle açıklanabilir?

6. Oluşturduğunuz önermeleri matematiksel olarak doğrulayınız. Doğrulama yöntemlerinizi sınıf arkadaşlarınızın kullandığı yöntemlerle karşılaştırarak kullanışlılık açısından değerlendiriniz.

19. ÖRNEK

"a, $b \in \mathbb{Q}$, $b < a$ olmak üzere a ve b nin toplamının yarısı b den büyük, a dan küçüktür." önermesinin doğru olup olmadığını cebirsel olarak ispatlayınız.

Çözüm

Önerme: $a, b \in \mathbb{Q}$ olmak üzere $b < a$ ise $b < \frac{a+b}{2} < a$ olur.

Hipotez: $a, b \in \mathbb{Q}$ olmak üzere $b < a$ olsun.

Hüküm: $b < \frac{a+b}{2} < a$ olur.

İspatın adımları aşağıdaki gibidir.

1. adım: Ortalama alınır.

a ve b nin aritmetik ortalaması $\frac{a+b}{2}$ olur.

2. adım: Eşitsizliğin iki tarafı b ile toplanarak b nin ortalamadan küçük olduğu gösterilir.

$b < a$ ise $b + b < a + b$ ise $2b < a + b$ ise $b < \frac{a+b}{2}$ olur.

3. adım: Eşitsizliğin her iki tarafı a ile toplanarak a nın ortalamadan büyük olduğu gösterilir.

$b < a$ ise $a + b < a + a$ ise $a + b < 2a$ ise $\frac{a+b}{2} < a$ olur.

4. adım: 2 ve 3. adımlarda elde edilen eşitsizlikler yardımıyla $b < \frac{a+b}{2} < a$ elde edilerek hükme ulaşılır. Bu durumda önermenin doğru olduğu ispatlanmış olur.

14. Sıra Sizde

Gerçek sayılarda sıralama özellikleri yardımıyla x, y, m ve $n \in \mathbb{R}$ **olmak üzere** $x < y$ **ve** $m < n$ **için** $x + m < y + n$ **olup olmadığını cebirsel olarak ispatlayınız.**

Bir sayı kümesindeki herhangi iki sayı arasında aynı sayı kümesinden başka bir sayının yer alması, o kümenin **arada olma** özelliğine sahip olduğunu gösterir.

Örneğin bir mühendis, bir köprü veya bina tasarlarken yapının taşıyacağı maksimum ve minimum yükleri hesaplar. Arada olma özelliği sayesinde yapının bu iki yük arasındaki herhangi bir değeri güvenle taşıyabileceğini bilir ve buna göre tasarımını yapar.

18. Uygulama

Sayı Kümelerinin Arada Olma Özelliğini İnceleme

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Doğal sayılar ($\mathbb{N}$), tam sayılar ($\mathbb{Z}$), rasyonel sayılar ($\mathbb{Q}$) ve gerçek sayılar ($\mathbb{R}$) kümelerinde arada olma özelliği ile ilgili varsayımlarınızı oluşturunuz.

2. Tabloda $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ ve $\mathbb{R}$ kümelerindeki bazı elemanlar verilmiştir. Sayı kümelerine ait elemanların arasında o sayı kümesine ait başka bir eleman ya da elemanlar var ise yazarak tabloyu örnekteki gibi doldurunuz.

$\mathbb{N}$		$\mathbb{Z}$		$\mathbb{Q}$		$\mathbb{R}$	
Hangi Sayılar Arasında Arandığı	**Aradaki Sayı Örneği**	**Hangi Sayılar Arasında Arandığı**	**Aradaki Sayı Örneği**	**Hangi Sayılar Arasında Arandığı**	**Aradaki Sayı Örneği**	**Hangi Sayılar Arasında Arandığı**	**Aradaki Sayı Örneği**
1 ile 3	2	-2 ile -1	–	0 ile 1	$\frac{1}{8}$	2 ile 3	$\frac{5}{2}$
0 ile 5		-5 ile -3		-3 ile 2		$\frac{1}{2}$ ile $\frac{3}{4}$	
51 ile 60		-11 ile 11		-1 ile 0		$\sqrt{3}$ ile 2	
45 ile 46		3 ile 4		$\frac{1}{3}$ ile $\frac{1}{2}$		$-\sqrt{5}$ ile 0	
100 ile 500		5 ile 9		-2 ile $-\frac{3}{2}$		3,002 ile 3,02	
0 ile 1		-18 ile -16		$\frac{5}{7}$ ile $\frac{6}{7}$		$\sqrt{2}$ ile 1,5	

3. Tablodan elde ettiğiniz sonuçlardan yararlanarak verilen sayı kümelerinde arada olma özelliği ile ilgili genellemelerinizi oluşturunuz.

4. Varsayımlarınızla genellemelerinizi karşılaştırarak $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ ve $\mathbb{R}$ kümelerinin arada olma özelliğine dair önermelerinizi oluşturunuz.

5. Oluşturduğunuz önermeler yardımıyla aşağıda verilen problemi çözünüz. Önermelerin problemin çözümünde ne tür kolaylıklar sağladığını ve başka hangi problem durumlarında kullanılabileceğini yazınız.

Dünyanın en ağır kitaplarından birisinin kütlesi 8 kg ile 9 kg arasındadır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Kitabın kütlesi (kg) doğal sayı veya tam sayı olabilir mi? Nedenleriyle açıklayınız.

b) Kitabın kütlesi (kg) rasyonel sayı veya gerçek sayı olarak ifade edilebilir mi? Nedenleriyle açıklayınız.

c) Kitabın kütlesinin (kg) bazı sayı kümeleri ile ifade edilip bazı sayı kümeleri ile ifade edilememesi bu sayı kümelerinin hangi özelliği ile ilişkilidir?

6. Oluşturduğunuz önermeleri matematiksel olarak doğrulayınız ve doğrulama yöntemlerinizi kullanışlılık açısından değerlendiriniz.

Karşıt örnek sunma bir önermenin tüm durumlar için geçerli olmadığını kanıtlamak için kullanılan matematiksel bir yöntemdir. Bir önermenin yanlış olduğunu göstermek amacıyla bu önermeye uymayan tek bir örnek bulmak yeterlidir.

Kontrol Noktası

- Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılar kümeleri sıralı kümelerdir.
- Ardışık iki doğal sayı arasında herhangi bir doğal sayı yer almaz.
- Ardışık iki tam sayı arasında herhangi bir tam sayı yer almaz.
- $\mathbb{N}$ ve $\mathbb{Z}$ kümelerinde arada olma özelliği yoktur.
- Herhangi iki rasyonel sayı arasında istenen sayıda rasyonel sayı bulunabilir.
- Herhangi iki gerçek sayı arasında istenen sayıda gerçek sayı bulunabilir.
- $\mathbb{Q}$ ve $\mathbb{R}$ kümelerinde arada olma özelliği vardır.

Sayı Kümelerinin Dört İşleme Göre Kapalılığı

Bir sayı kümesinde yapılan işlemler (toplama, çıkarma, çarpma ve bölme) sonucunda elde edilen değerlerin yine o küme içinde kalması, algoritmalar ve formüllerin geliştirilmesi sırasında tutarlılık ve işlevsellik sağlar. Bu durum, sayı kümeleriyle ilgili işlemlerin yapısal özelliklerinin anlaşılmasında önemli bir role sahip olup çeşitli matematiksel yapıların temelini oluşturmaktadır.

Bir kümedeki herhangi iki eleman bir işleme girdiğinde elde edilen sonuç yine aynı kümenin elemanı ise bu **küme o işleme göre kapalıdır**.

19. Uygulama

Sayı Kümelerinin Dört İşleme Göre Kapalılığını İnceleme

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ ve $\mathbb{R}$ kümelerinden alınan herhangi iki eleman ile yapılan bir işlemin (toplama, çıkarma, çarpma ve bölme) sonucunun aynı kümenin elemanı olup olmaması durumuyla ilgili varsayımlarınızı oluşturunuz.

2. Tabloda verilen her bir küme için bu kümeye ait herhangi iki eleman seçiniz. Seçtiğiniz elemanlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yaparak tabloyu örnekteki gibi doldurunuz.

Küme	Elemanlar	Toplama	Çıkarma	Çarpma	Bölme
$\mathbb{N}$	4 ve 7	$4+7=11 \in \mathbb{N}$	$4-7=-3 \notin \mathbb{N}$	$4 \cdot 7=28 \in \mathbb{N}$	$\frac{4}{7} \notin \mathbb{N}$
$\mathbb{Z}$					
$\mathbb{Q}$					
$\mathbb{R}$					

Tabloda elde ettiğiniz sonuçlardan yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Herhangi iki doğal sayının toplanması durumunda elde edilen sonucun bir doğal sayı olup olmadığı ve bu özelliğin başka hangi sayı kümelerinde geçerli olduğu ile ilgili fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

b) Herhangi iki tam sayının farkının alınması durumunda elde edilen sonucun her zaman bir tam sayı olup olmadığı ve bu özelliğin başka hangi sayı kümelerinde geçerli olduğu ile ilgili fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ ve $\mathbb{R}$ kümelerinin kapalılık özelliği ile ilgili genellemelerinizi oluşturunuz.

4. Varsayımlarınızla genellemelerinizi karşılaştırarak $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ ve $\mathbb{R}$ kümelerinin kapalılık özelliğine dair önermelerinizi oluşturunuz.

5. Oluşturduğunuz önermeler yardımıyla aşağıda verilen problemi çözünüz. Önermelerin problemin çözümünde ne tür kolaylıklar sağladığını ve başka hangi problem durumlarında kullanılabileceğini yazınız.

Gerçek sayıların alt kümesi olan bir A kümesi oluşturunuz. A kümesinin toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerine göre kapalı olup olmadığını inceleyiniz.

6. Oluşturduğunuz önermeleri matematiksel olarak doğrulayınız ve doğrulama yöntemlerinizi kullanışlılık açısından değerlendiriniz.

20. ÖRNEK

İrrasyonel sayılar kümesinin çarpma işlemine göre kapalı olup olmadığını gösteriniz.

Çözüm

İrrasyonel sayılar kümesinin çarpma işlemine göre kapalı olmadığı karşıt örnek sunularak gösterilebilir. $\sqrt{3}, \sqrt{12} \in \mathbb{Q}'$ için $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12} = \sqrt{36} = 6 \notin \mathbb{Q}'$ olur. Böylece aksine örnek verme yöntemi ile doğrulama yapılmış olur.

Bu durumda bazı $a, b \in \mathbb{Q}'$ için $a \cdot b \notin \mathbb{Q}'$ olduğundan $\mathbb{Q}'$ kümesi çarpma işlemine göre kapalı değildir.

15. Sıra Sizde

İrrasyonel sayılar kümesinin bölme işlemine göre kapalı olup olmadığını gösteriniz.

21. ÖRNEK

$A = \{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$ kümesinin dört işleme göre kapalı olup olmadığını inceleyiniz.

Çözüm

A kümesinin herhangi iki elemanı x_1 ve x_2 olsun. $x_1 = 2a$ ve $x_2 = 2b$ olacak şekilde $a, b \in \mathbb{Z}$ vardır.

$x_1 + x_2 = 2a + 2b = 2(a + b) \in A$ olur. $x_1 - x_2 = 2a - 2b = 2(a - b) \in A$ olur.


$x_1 \cdot x_2 = 2a \cdot 2b = 4ab \in A$ olur.

$\frac{x_1}{x_2} = \frac{2a}{2b} = \frac{a}{b}$ olur. $\frac{x_1}{x_2}$ ifadesi bazı $a, b \in \mathbb{Z}$ için A kümesinin elemanı olmaz. Bu durum, karşıt örnek sunularak da gösterilebilir. $a = 1$ ve $b = 3$ seçilirse $\frac{x_1}{x_2} = \frac{a}{b} = \frac{1}{3} \notin A$ elde edilir.

Bu durumda A kümesi toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerine göre kapalıdır; bölme işlemine göre kapalı değildir. Aksine örnek verme yöntemi hipotezin doğru olmadığını gösterirken matematiksel olarak kolaylık sağlamaktadır.

Kontrol Noktası

Aşağıdaki bilgi görselinde $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ ve $\mathbb{R}$ kümelerinin hangi işlemlere göre kapalı olduğu verilmiştir.



Alıştırmalar

1. Bir yüzme yarışmasında farklı yaş gruplarında en hızlı yüzen üç yüzücünün kronometre ile elde edilen yarışı tamamlama süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yaş Aralığı	Yüzücüler	Yarışı Tamamlama Süreleri (sn.)
18-25	Barış	57,32
	Ayşe	57,38
	Azra	57,67
26-35	Batuhan	58,15
	Elif	58,59
	Özlem	58,02
36-45	Uğur	57,88
	Engin	59,75
	Esra	59,43

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) 18-25 yaş aralığındaki yüzücülerden birinci olanı belirlemek için gerçek sayılarda sıralamanın özelliklerinden hangisinin kullanılabileceğini bulunuz.

b) 18-25 yaş aralığındaki yüzücülerin her biri yarışı ikişer saniye geç tamamlasaydı sıralama değişir miydi? Bu durum gerçek sayılarda sıralamanın hangi özelliği ile açıklanabilir?

c) 26-35 yaş aralığındaki yüzücülerin dereceleri arasında sadece saniyeler dikkate alınsaydı sıralamanın nasıl değişeceğini açıklayınız.

ç) 36-45 yaş aralığındaki yüzücülerin dereceleri yardımıyla "$a \leq b$ ve $b \leq c$ ise $a \leq c$" özelliğini doğrulayınız.

2. Herhangi iki farklı irrasyonel sayının arasında yer alan beş tane irrasyonel sayı bulunuz. Bulduğunuz sayıların arasında başka irrasyonel sayılar olup olmadığını inceleyiniz.

3. $A = \{x \mid x = 2 \cdot k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$ kümesinin dört işleme göre kapalı olup olmadığını inceleyiniz.

Konu ile ilgili daha fazla soru çözmek için karekodu okutunuz.

Konu ile ilgili etkileşimli içeriğe ulaşmak için karekodu okutunuz.

Konu ile ilgili çalışma kâğıdına ulaşmak için karekodu okutunuz.

1.4. GERÇEK SAYILARIN İŞLEM ÖZELLİKLERİ

Konuya Başlarken



Adil öğretmen ve öğrencileri arasında aşağıdaki konuşmalar geçiyor.

Öğretmen: Çocuklar nüfus yoğunluğu nedir?

Ali: Nüfus yoğunluğu, birim alan başına düşen kişi sayısıdır.

Öğretmen: Doğru. Peki, bir bölgenin nüfus yoğunluğunu hesaplayabilmek için hangi bilgilere ihtiyacımız vardır?

Pelin: Bir bölgenin nüfus yoğunluğunu hesaplayabilmek için o bölgenin yüz ölçümünün kaç km^2 olduğunu bilmek yeterlidir.

Öğretmen: Bir bölgenin nüfus yoğunluğunu hesaplayabilmek için sadece yüz ölçümü bilgisi yeterli değildir. Başka cevap vermek isteyen arkadaşınız var mı?

Selcan: Bir bölgenin nüfus yoğunluğunu hesaplayabilmek için o bölgenin yüz ölçümünü ve o bölgede yaşayan kişi sayısını bilmek gerekir.

Öğretmen: Evet, doğru. Bir bölgenin nüfus yoğunluğu, bölgede yaşayan kişi sayısının bölgenin yüz ölçümüne oranıdır.

Buna göre aşağıdaki sorularla ilgili fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. Adil öğretmen ve öğrencileri arasında geçen konuşmadaki cümleleri inceleyiniz. Kesin doğru ya da kesin yanlış şeklinde karara varılabilen cümleler hangileridir?

2. Çevrenizdeki kişilerin kullandığı cümlelere dikkat ediniz. Doğru ya da yanlış hüküm bildiren cümleleri belirleyiniz.

Matematikte kavramlar, kavramlara ait özellikler, işlemlerden elde edilen sonuçlar sözel olarak veya sembollerle ifade edilebilir. Bu ifadelerden bazıları kesin doğru ya da kesin yanlış bir hüküm bildirir. Kesin doğru ya da kesin yanlış bir hüküm bildiren matematiksel örnekler veriniz.

20. Uygulama

Önerme Kavramı

Verilenlere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdaki tabloda bazı matematiksel ifadeler verilmiştir. Verilen ifadelerin doğru veya yanlış olma durumlarını belirleyerek tabloyu doldurunuz.

İfadeler	Doğru	Yanlış	Doğru ya da Yanlış Olduğu Belirlenemez
Tabanları eşit olan üslü gösterimi verilen sayılar çarpılırken ortak taban aynen yazılır, üsler toplanır.	✓		
$\sqrt[3]{x} = 5$ olduğuna göre x kaçtır?			✓
-1 sayısının 12. kuvveti kendisine eşittir.			
Doğal sayılar kümesi, gerçek sayılar kümesinin bir alt kümesidir.			
2 ve 4 arasındaki (2 ve 4 dâhil) gerçek sayılar kümesi ile 1 ve 2 arasındaki gerçek sayılar kümesinin ortak elemanlarının oluşturduğu küme boş kümedir.			

2. Tabloda sözel olarak verilen "Tabanları eşit olan üslü ifadeler çarpılırken ortak taban aynen yazılır, üsler toplanır." ifadesi, uygun matematiksel semboller kullanılarak "$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$ dir." biçiminde de yazılabilir.

Tabloda sözel olarak verilen ifadeleri sembol kullanarak, sembolik olarak verilen ifadeleri sözel olarak yazınız. Hangi gösterimlerin daha kullanışlı olduğunu tartışınız.

3. Kesin doğru ya da kesin yanlış olan farklı ifadeler oluşturunuz. Bulduğunuz ifadeleri hem sözel olarak hem de semboller kullanarak ifade ediniz.

Kesin doğru ya da kesin yanlış bir hüküm bildiren ifadelere **önerme** denir. Önermeler sözel olarak veya sembollerle ifade edilebilir. Bir önermenin hükmü değiştirilerek elde edilen önermeye o önermenin **değili (olumsuzu)** denir.

Bir önermenin değilini yazarken o önermede kullanılan sembollerin değilleri kullanılır. Tablo 1.1'de bazı semboller ve sembollerin değilleri gösterilmiştir.

Tablo 1.1: *Semboller ve Sembollerin Değilleri*

Sembol	$=$	$\neq$	$\in$	$\notin$	$<$	$>$	$\leq$	$\geq$
Sembolün Değili	$\neq$	$=$	$\notin$	$\in$	$\geq$	$\leq$	$>$	$<$


Örneğin "$[-5,4] \cap [4,10] = \{4\}$ dir." önermesi doğrudur. Bu önermenin değili "$[-5,4] \cap [4,10] \neq \{4\}$ dir." biçiminde yazılır. Bu önerme doğru bir hüküm bildirdiğinden değili yanlış hüküm bildirmektedir. Tam tersi de olabilir. Bir önerme yanlış hüküm bildiriyorsa o önermenin değili doğru hüküm bildirir.

21. Uygulama


Çevre Uzunluğu Hesabı

Verilenlere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Esin öğretmen, tahtaya iki dikdörtgen çizmiştir. Şekil 1'deki ABCD dikdörtgeninin kenar uzunluklarını tam sayı, Şekil 2'deki EFGH dikdörtgeninin kenar uzunluklarını rasyonel sayı olarak vermiştir. Öğrencilerinden dikdörtgenlerin çevre uzunluklarını hesaplamalarını istemiştir.



Şekil 1



Şekil 2

1. Tabloda doğru cevaba ulaşan bazı öğrencilerin işlem adımları verilmiştir. İşlem adımlarından yararlanarak a uzun kenar uzunluğu, b kısa kenar uzunluğu olmak üzere dikdörtgenlerin çevre uzunluğunu veren ifadelerin cebirsel temsillerini örnekteki gibi bulunuz.

Öğrenci	Ç (ABCD)	Ç (EFGH)	Cebirsel Temsili
Cemre	$2 \cdot 3 + 2 \cdot 1 = 8$ cm	$2 \cdot \frac{9}{2} + 2 \cdot \frac{7}{3} = \frac{41}{3}$ cm	2a + 2b
Ali	$2 \cdot 1 + 2 \cdot 3 = 8$ cm	$2 \cdot \frac{7}{3} + 2 \cdot \frac{9}{2} = \frac{41}{3}$ cm	
Elif	$2 \cdot (3 + 1) = 2 \cdot 4 = 8$ cm	$2 \cdot \left(\frac{9}{2} + \frac{7}{3}\right) = 2 \cdot \frac{41}{6} = \frac{41}{3}$ cm	
Hasan	$(3 + 1) \cdot 2 = 4 \cdot 2 = 8$ cm	$\left(\frac{9}{2} + \frac{7}{3}\right) \cdot 2 = \frac{41}{6} \cdot 2 = \frac{41}{3}$ cm	

2. Tabloda bulduğunuz cebirsel temsilleri karşılaştırınız. Elde ettiğiniz cebirsel temsiller birbirine eşit midir?

3. Cebirsel temsiller arasındaki ilişki, tam sayılarda ve rasyonel sayılarda toplama veya çarpma işlemlerinin özelliklerinden (değişme, birleşme, dağılma, etkisiz eleman, ters eleman, yutan eleman) hangileriyle ilişkilendirilebilir? Gerekçelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla saygı ve nezaket çerçevesinde tartışarak fikirlerinizi paylaşınız.

4. Dikdörtgenlerin kenar uzunlukları $a = 4\sqrt{2}$ cm ve $b = 3\sqrt{2}$ cm olarak seçildiğinde irrasyonel sayılarda dört işlemin hangi özellikleri (değişme, birleşme, dağılma, etkisiz eleman, ters eleman, yutan eleman) gözlemlenebilir? Açıklayınız.

22. Uygulama

Sayı Kümelerinin İşlem Özellikleri

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. a) Tablo 1'de verilen toplama ve çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

Tablo 1

Toplama İşlemi		Çarpma İşlemi	
$3\sqrt{5}+(-\sqrt{5})=$	$(-\sqrt{5})+3\sqrt{5}=$	$3\sqrt{5}\cdot(-\sqrt{5})=$	$(-\sqrt{5})\cdot 3\sqrt{5}=$
$\frac{1}{2}+(-3)=$	$(-3)+\frac{1}{2}=$	$\frac{1}{3}\cdot(-2)=$	$(-2)\cdot\frac{1}{3}=$
$(-2\sqrt{6})+(-3\sqrt{6})=$	$(-3\sqrt{6})+(-2\sqrt{6})=$	$(-2\sqrt{6})\cdot(-\sqrt{2})=$	$(-\sqrt{2})\cdot(-2\sqrt{6})=$

b) Aynı satırdaki işlemlerde toplanan veya çarpılan sayıların yerlerinin değişmesi, sonuçları değiştirmiş midir? Açıklayınız.

2. a) Tablo 2'de verilen toplama ve çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

Tablo 2

Toplama İşlemi		Çarpma İşlemi	
$3\sqrt{5}+(\sqrt{5}+2\sqrt{5})=$	$(3\sqrt{5}+\sqrt{5})+2\sqrt{5}=$	$3\sqrt{5}\cdot(\sqrt{5}\cdot 2\sqrt{5})=$	$(3\sqrt{5}\cdot\sqrt{5})\cdot 2\sqrt{5}=$
$2{,}1+[3{,}6+(-2{,}5)]=$	$(2{,}1+3{,}6)+(-2{,}5)=$	$2{,}5\cdot(0{,}5\cdot 4)=$	$(2{,}5\cdot 0{,}5)\cdot 4=$

b) Aynı satırdaki işlemlerde işlem sırasının değişmesi, sonuçları değiştirmiş midir? Açıklayınız.

3. a) Tablo 3'te verilen toplama ve çarpma işlemlerinde verilmeyen sayıları bulunuz.

Tablo 3

Toplama İşlemi		Çarpma İşlemi	
$3\sqrt{5}+\ldots.=3\sqrt{5}$	$\ldots.+3\sqrt{5}=3\sqrt{5}$	$(-\sqrt{7})\cdot\ldots.=-\sqrt{7}$	$\ldots.\cdot(-\sqrt{7})=-\sqrt{7}$
$(-2{,}4)+\ldots.=-2{,}4$	$\ldots.+(-2{,}4)=-2{,}4$	$\left(-\frac{1}{3}\right)\cdot\ldots.=-\frac{1}{3}$	$\ldots.\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)=-\frac{1}{3}$
$a\in\mathbb{R}, a+\ldots.=a$	$a\in\mathbb{R}, \ldots.+a=a$	$a\in\mathbb{R}, a\cdot\ldots.=a$	$a\in\mathbb{R}, \ldots.\cdot a=a$

b) Bulduğunuz sonuçlardan hareketle verilen işlemler, toplama ve çarpmanın hangi özelliği ile ilişkilendirilebilir? Açıklayınız.

4. **a)** Tablo 4'te verilen toplama ve çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

Tablo 4

Toplama İşlemi		Çarpma İşlemi	
$\sqrt{5}+(-\sqrt{5})=$	$(-\sqrt{5})+\sqrt{5}=$	$\sqrt{5}\cdot\frac{1}{\sqrt{5}}=$	$\frac{1}{\sqrt{5}}\cdot\sqrt{5}=$
$(-2{,}4)+2{,}4=$	$2{,}4+(-2{,}4)=$	$\left(-\frac{\sqrt{2}}{3}\right)\cdot\left(-\frac{3}{\sqrt{2}}\right)=$	$\left(-\frac{3}{\sqrt{2}}\right)\cdot\left(-\frac{\sqrt{2}}{3}\right)=$
$a\in\mathbb{R}, a+(-a)=$	$a\in\mathbb{R}, (-a)+a=$	$a\in\mathbb{R}-\{0\}, \frac{1}{a}\cdot a=$	$a\in\mathbb{R}-\{0\}, a\cdot\frac{1}{a}=$

b) Tablo 4'te elde edilen sonuçlara göre toplanan veya çarpılan gerçek sayıların aralarında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.

5. **a)** Tablo 5'teki çarpma işlemlerinin sonuçlarını ve verilmeyen sayıları bulunuz.

Tablo 5

Çarpma İşlemi			
$\frac{1}{2}\cdot 0=$	$0\cdot\frac{1}{2}=$	$\sqrt{5}\cdot 0=$	$0\cdot\sqrt{5}=$
$(-2{,}4)\cdot 0=$	$0\cdot(-2{,}4)=$	$\left(-\frac{\sqrt{2}}{3}\right)\cdot 0=$	$0\cdot\left(-\frac{\sqrt{2}}{3}\right)=$
$a\in\mathbb{R}, a\cdot\ldots=0$	$a\in\mathbb{R}, \ldots\cdot a=0$	$a\in\mathbb{R}, \ldots\cdot\frac{2a}{5}=0$	$a\in\mathbb{R}, \frac{2a}{5}\cdot\ldots=0$

b) Tablo 5'teki işlemler ve elde edilen sonuçlar, çarpma işleminin hangi özelliği ile ilişkilendirilebilir? Açıklayınız.

6. **a)** Gerçek sayılar kümesinden m ve n gibi iki farklı sayı seçerek aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

Tablo 6

	1. Sütun	2. Sütun
1. Satır	m = n =	$3\cdot(m+n)=$ $3m+3n=$
2. Satır	m = n =	$(3m-n)\cdot 2=$ $6m-2n=$

b) Tablo 6'nın 2. sütununda elde ettiğiniz işlemlerin sonuçlarını her satırı kendi içinde olacak şekilde karşılaştırınız.

7. Gözlemlerinizden yararlanarak gerçek sayılarda hangi işlem özellikleri (değişme, birleşme, dağılma, ters eleman, birim eleman, etkisiz eleman, yutan eleman) vardır? Tam sayılar ve rasyonel sayılarda dört işlem özelliklerini dikkate alarak gerçek sayılarda dört işlem özelliklerini sözel olarak ifade ediniz.

8. Sözel olarak ifade ettiğiniz önermeleri cebirsel olarak gösteriniz.

9. Elde ettiğiniz özelliklerden yararlanarak iki cebirsel ifadenin çarpımının sıfıra eşit olması durumunda çarpılan cebirsel ifadelerle ilgili çıkarımınızı örnek vererek açıklayınız.

10. Gerçek sayılarda çıkarma ve bölme işlemlerinin sahip olduğu ya da olmadığı işlem özelliklerine dair fikirlerinizi açıklayınız.

Niceleyiciler ve Mantık Bağlaçları

Gerçek sayılarda işlem özelliklerini ifade eden önermeler, semboller kullanılarak yazılabilir. Matematikte sembolik dilin kullanılmasının nedeni ne olabilir ve sağladığı avantajlar nelerdir?

"Her a gerçek sayısı sıfırla çarpıldığında sonuç sıfırdır.", "Bazı b gerçek sayıları $\frac{a}{b}$ ifadesini tanımsız yapar." önermeleri matematiksel olarak nasıl ifade edilebilir? Matematiksel ifadeler arasında yer alan niceleyicilerin (her, bazı), mantık bağlaçlarının (ve, veya, ya da, ise, ancak ve ancak) sembolleri Tablo 1.2'de verilmiştir.

Tablo 1.2: *Matematiksel Sembollerin Anlamları*

	Niceleyiciler		Mantık Bağlaçları				
Sembol	$\exists$	$\forall$	$\wedge$	$\vee$	$\veebar$	$\Rightarrow$	$\Leftrightarrow$
Anlamı	bazı (En az bir)	her	ve	veya	ya da	ise	ancak ve ancak

İki veya daha fazla önermeyi birlikte ifade edebilmek için mantık bağlaçlarından faydalanılır.

Tablo 1.3'te niceleyicilerle "ve", "veya" bağlaçlarının değilleri gösterilmiştir.

Tablo 1.3: *Semboller ve Sembollerin Değilleri*

Sembol	$\forall$	$\exists$	$\wedge$	$\vee$
Sembolün Değili	$\exists$	$\forall$	$\vee$	$\wedge$

23. Uygulama

Önermelerin Niceleyiciler ve Mantık Bağlaçlarıyla İfade Edilmesi

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Gerçek sayılarda bazı işlemlerle ilgili sözel önermeler aşağıda verilmiştir.

a) Her a, b gerçek sayısı için a, b den büyükse a nın b den çıkarılmasıyla elde edilen değer sıfırdan büyüktür.

b) Sıfırdan farklı her a gerçek sayısı için a ile b sayısının çarpımının 1 olmasını sağlayan en az bir b gerçek sayısı vardır.

c) a ile b gerçek sayı olmak üzere a ile b nin çarpım sonucu, ancak ve ancak a veya b sayıları sıfıra eşitse sıfırdır.

ç) a gerçek sayısı sıfıra eşit veya sıfırdan küçükse ve sıfıra eşit veya sıfırdan büyükse a sıfıra eşittir.

d) İki gerçek sayının çarpımının sıfırdan farklı olması için ancak ve ancak çarpanlarının ikisinin de sıfırdan farklı olması gerekmektedir.

e) a ve b gerçek sayılarının çarpımlarının değeri negatifse a ya da b negatiftir.

Yukarıdaki önermelerde kullanılan mantık bağlaçlarını ve niceleyicileri belirleyiniz.

2. Aşağıda sembolik dil kullanılarak verilen önermeleri inceleyiniz. Önermelerde yer alan mantık bağlaçları ve niceleyici sembollerinin anlamlarına dair fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

f) $\forall a,b \in \mathbb{R}$ için $a > b \Rightarrow b - a > 0$'dır.

g) $\exists a \in \mathbb{R},\ a \neq 0$ için $\forall b \in \mathbb{R}$ vardır. Öyle ki $a \cdot b = 1$'dir.

ğ) $a \in \mathbb{R}$ için $a \leq 0 \wedge a \geq 0 \Rightarrow a = 0$'dır.

h) $a, b \in \mathbb{R}$ için $a \cdot b = 0 \Leftrightarrow a = 0 \vee b = 0$'dır.

ı) $\forall a,b \in \mathbb{R}$ için $a < b \vee a - b < 0$'dır.

i) $a,b \in \mathbb{R}$ olmak üzere $a \cdot b \neq 0 \Leftrightarrow a \neq 0 \wedge b \neq 0$'dır.

j) $a,b \in \mathbb{R}$ olmak üzere $a \cdot b < 0 \Rightarrow a < 0 \veebar b < 0$'dır.

k) $\forall a \in \mathbb{R},\ a \neq 0$ için $\exists b \in \mathbb{R}$ vardır. Öyle ki $a \cdot b = 1$'dir.

3. 1. maddede verilen sözel önermelerin karşılıkları yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri olabilir? Gerekçeleriyle açıklayınız.

4. Tabloda verilen önermelerin değillerini örnekteki gibi sembolik olarak yazınız. Kullanılan sembollerin anlamlarına ve önermelerin hükümlerine dair fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

Önerme	Önermenin Değili
$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 < 0$	$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \geq 0$
$\forall x \in \mathbb{Z}^-,\ -5 < x < 0$	
$\exists x \in \mathbb{N},\ 3x - 2 = 0$	
$\forall x, y \in \mathbb{N},\ x + y \in \mathbb{N}$	

5. Elde ettiğiniz sonuçlardan yararlanarak sembolik dille farklı önermeler ve bu önermelerin değillerini yazınız. Yazdığınız önermelerin sözel karşılıklarını bulunuz. Hangi gösterimlerin daha kullanışlı olduğuna dair fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

22. ÖRNEK

"Her tek doğal sayının karesi tek sayıdır." önermesi veriliyor.

a) Önermeyi matematiksel sembol kullanarak yazınız.

b) Önermenin cebirsel ispatını yapınız.

Çözüm

a) $\forall x \in \mathbb{N}$, x tek sayı $\Rightarrow$ x^2 tek sayıdır.

b) Hipotez: x tek doğal sayıdır.

Hüküm: x^2 tek sayıdır.

İspat: x tek doğal sayı olduğundan $\exists a \in \mathbb{N}, x = 2a + 1$ olur. x in karesi alındığında

$x^2 = (2a + 1)^2 = (2a + 1) \cdot (2a + 1) = 4a^2 + 4a + 1 = 4(a^2 + a) + 1$ elde edilir.

$\forall a \in \mathbb{N}$ için $4(a^2 + a)$ ifadesi çift sayı olduğundan bu sayıya 1 eklenmesiyle oluşan $4(a^2 + a) + 1$ ifadesi tek sayıdır.

16. Sıra Sizde

"Her çift tam sayının karesi çift tam sayıdır." önermesi veriliyor.

a) Önermeyi matematiksel sembol kullanarak yazınız.

b) Önermenin cebirsel ispatını yapınız.

Kontrol Noktası

Gerçek Sayılarda İşlem Özellikleri


- **Değişme özelliği:** $\forall a, b \in \mathbb{R}$ için $a + b = b + a$ ve $a \cdot b = b \cdot a$ olur.
- **Birleşme özelliği:** $\forall a, b \in R$ için $a + (b + c) = (a + b) + c$ ve $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ olur.
- **Birim eleman:** $\forall a \in \mathbb{R}$ için $a + 0 = 0 + a = a$ ve $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$ olur.
  Toplama işleminin **birim elemanı 0** ve çarpma işleminin **birim elemanı 1**'dir.
- **Ters eleman:** $\forall a \in \mathbb{R}$ ve $a \neq 0$ için
  $a + (-a) = (-a) + a = 0$ olduğundan **a nın toplama işlemine göre tersi –a** olur.
  $a \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{a} \cdot a = 1$ olduğundan **a nın çarpma işlemine göre tersi** $\frac{1}{a} = a^{-1}$ olur.
- **Yutan eleman:** $\forall a \in \mathbb{R}$ için $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$ olduğundan çarpma işleminin **yutan elemanı 0**'dır.
- **Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği:** $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$ için
  $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ ve $(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$ olur.
  Çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği: $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$ için
  $a \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c$ ve $(b - c) \cdot a = b \cdot a - c \cdot a$ olur.
- Gerçek sayılarda toplama, çıkarma ve bölme işlemlerinin **yutan elemanı** yoktur.
- Gerçek sayılarda çıkarma ve bölme işlemlerinin **değişme** özelliği, **birleşme** özelliği, **birim elemanı** ve **ters elemanı** yoktur.

24. Uygulama

İki Gerçek Sayının Farklı Gösterimlerinin ve İki Farklı Cebirsel İfadenin Birbirine Eşitliğini İnceleme

Verilenlere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Aşağıda kenar uzunlukları a cm ve b cm olan dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiştir. Bu dikdörtgenin her köşesinden bir kenar uzunluğu k cm olan kare şeklindeki parçalar kesilerek çıkartılmıştır.



1. **a)** Dikdörtgenin kesilmeden önceki çevre uzunluğunu a ve b değerlerine bağlı olarak yazınız.

b) Dikdörtgen kesildikten sonra oluşan şeklin çevre uzunluğunu a, b ve k değerlerine bağlı olarak yazınız.

c) Bulduğunuz cebirsel ifadelerin birbirine eşit olup olmadığını belirleyiniz.

2. **a)** a, b ve k değişkenlerine $k < b < a$ olacak şekilde pozitif gerçek sayı değerleri veriniz.

b) Dikdörtgenin kesilmeden önceki çevre uzunluğu ile kesildikten sonraki çevre uzunluğunu hesaplayınız.

c) Bulduğunuz çevre uzunlukları değerlerinin birbirine eşit olup olmadığını belirleyiniz.


25. Uygulama

Özdeşliklerin Cebirsel ve Geometrik Temsilleri

Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. **a)** a, b birer pozitif gerçek sayı ve $b < a$ olmak üzere $(a + b)^2$ ifadesinin eşitini gerçek sayılarda işlem özelliklerini kullanarak bulunuz.

b) Aşağıda bir kenar uzunluğu $(a + b)$ birim olan ABCD karesi verilmiştir. ABCD karesi 1, 2, 3, 4 numaralı dört bölüme ayrılmıştır.



1: Bir kenar uzunluğu a birim olan kare

2: Kısa kenar uzunluğu b birim, uzun kenar uzunluğu a birim olan dikdörtgen

3: Kısa kenar uzunluğu b birim, uzun kenar uzunluğu a birim olan dikdörtgen

4: Bir kenar uzunluğu b birim olan kare

ABCD karesi ile 1, 2, 3, 4 numaralı bölümlerin alanlarını cebirsel olarak ifade ediniz.


c) Bulduğunuz cebirsel ifadeleri kullanarak a maddesinde elde ettiğiniz eşitliği doğrulayınız.

2. a, b birer pozitif gerçek sayı ve $b < a$ olsun. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) $(a - b)^2$ ifadesinin eşitini gerçek sayılarda işlem özelliklerini kullanarak bulunuz.

b) $(a - b)\cdot(a + b)$ ifadesinin eşitini gerçek sayılarda işlem özelliklerini kullanarak bulunuz.

c) Aşağıda bir kenar uzunluğu a birim olan EFGH karesi verilmiştir. EFGH karesi 1, 2, 3, 4 numaralı dört bölüme ayrılmıştır.



1: Bir kenar uzunluğu (a − b) birim olan kare

2: Kısa kenar uzunluğu b birim, uzun kenar uzunluğu (a − b) birim olan dikdörtgen

3: Kısa kenar uzunluğu b birim, uzun kenar uzunluğu (a − b) birim olan dikdörtgen

4: Bir kenar uzunluğu b birim olan kare

EFGH karesi ile 1, 2, 3, 4 numaralı bölümlerin alanlarını cebirsel olarak ifade ediniz.

ç) c maddesinde bulduğunuz cebirsel ifadeleri kullanarak a ve b maddelerinden elde ettiğiniz eşitlikleri doğrulayınız.

Cebirsel ifadelerdeki değişkenlerin alacağı tüm gerçek sayı değerleri için sağlanan eşitliklere **özdeşlik** denir. Aşağıda bazı özdeşlikler verilmiştir.

İki terimin toplamının karesi özdeşliği: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

İki terimin farkının karesi özdeşliği: $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

İki terimin karelerinin farkı özdeşliği: $a^2 - b^2 = (a-b) \cdot (a+b)$

17. Sıra Sizde

1. Aşağıdaki ifadelerin özdeşini yazınız.

a) $(x+2)^2 =$

b) $9x^2 - 4 =$

c) $x^2 - 6x + 9 =$

ç) $2^{10} - 1 =$

d) $a > 0, (\sqrt{a} - 1) \cdot (\sqrt{a} + 1) =$

e) $(5x - 2y)^2 =$

2. A,B ve C gerçek sayılar olmak üzere $\left(3x - \frac{1}{2}\right)^2 = Ax^2 + Bx + C$ eşitliği veriliyor.


Buna göre $A + B - C$ **ifadesinin değerini bulunuz.**

3. $(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$ özdeşliği veriliyor.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Bu özdeşliğin doğruluğunu cebirsel olarak gösteriniz.


b)



Yandaki bir kenar uzunluğu, $(a+b)$ birim olan kare verilmiştir. Bu kare, 4 eş dikdörtgen ve 1 kare olacak şekilde beş parçaya ayrılmıştır.

Yukarıda verilen özdeşliğin doğruluğunu geometrik temsiller yardımıyla gösteriniz.

23. ÖRNEK



Yukarıda bir kenar uzunluğu x cm ve alanı A cm^2 olan bir kare ile alanları B cm^2 ve C cm^2, kenar uzunlukları sırasıyla 2 ve 4 cm, x ve $\sqrt{32}$ cm olan iki dikdörtgen verilmiştir. A + B = C olduğuna göre x in kaç cm olduğunu bulunuz.

Çözüm

$A = x \cdot x = x^2\ cm^2$, $B = 2 \cdot 4 = 8\ cm^2$ ve $C = \sqrt{32} \cdot x = \sqrt{16 \cdot 2} \cdot x = 4\sqrt{2} \cdot x\ cm^2$ bulunur.

$A + B = C$ olduğundan $x^2 + 8 = 4\sqrt{2} \cdot x \Rightarrow x^2 - 4\sqrt{2} \cdot x + 8 = 0$ bulunur.

Eşitliğin sol tarafı x ve $2\sqrt{2}$ terimlerinin farkının karesinin açılımıdır.



Buradan $x^2 - 4\sqrt{2} \cdot x + 8 = 0 \Rightarrow x^2 - 2 \cdot 2\sqrt{2} \cdot x + (2\sqrt{2})^2 = 0 \Rightarrow (x - 2\sqrt{2}) \cdot (x - 2\sqrt{2}) = 0$ olur. Çarpımın sonucu sıfırsa çarpılan iki ifadeden en az biri sıfıra eşit olur. Buradan $x - 2\sqrt{2} = 0 \Rightarrow x = 2\sqrt{2}$ cm olur.

26. Uygulama

Bahçe Düzeni

Verilenlere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Deniz Hanım; bir kenar uzunluğu 15,75 m olan kare şeklindeki bahçesinin zemininin bir kısmını seramikle, geri kalan kısmını hazır çimle kaplatacaktır. Deniz Hanım, seramikle kaplanacak bölümün kare şeklinde olmasını istemektedir. Bahçenin iki farklı planı için seramik kaplanacak karesel bölgelerin bir kenar uzunlukları sırasıyla 14,25 m ve 11,25 m'dir. Bahçenin iki farklı planına göre alınan fiyat teklifleri tabloda verilmiştir.

	1. Teklif	2. Teklif
Çim ve Seramik Kaplanacak Alan		
Çim Kaplama Ücreti	8100 TL	19 440 TL

Deniz Hanım, iki fiyat teklifi için 1 m^2 çim kaplama ücretini karşılaştıracaktır. 1 m^2 çim kaplama ücretinin daha düşük olduğu teklifi tercih edecektir.

1. Her iki teklif için çim kaplanacak alanı nasıl hesaplarsınız? Yönteminizi açıklayınız.

2. Çim kaplanacak alanları bulurken işlemlerinizi kolaylaştıracak stratejileri belirleyiniz.


3. Belirlediğiniz stratejileri kullanarak çim kaplanacak alanları hesaplayınız.

4. 1. fiyat teklifi için 1 m^2 çim kaplama ücreti x Türk lirası, 2. fiyat teklifi için 1 m^2 çim kaplama ücreti y Türk lirası olsun. İki durum için çim kaplama ücretini veren cebirsel ifadeleri yazınız.

5. Oluşturduğunuz cebirsel ifadeler yardımıyla 1 m^2 çim kaplama ücretlerini bularak Deniz Hanım'ın seçeceği teklifi yazınız.

24. ÖRNEK

Kare şeklindeki bir tuval, yandaki gibi üç farklı renge boyanmıştır. Gri renkli bölgenin alanı $\frac{4}{9}$ dm^2, mavi renkli bölgenin alanı $\frac{10}{9}$ dm^2 ve sarı renkli bölgenin alanı $\frac{25}{36}$ dm^2 dir. Bu tuval için seçilecek bir çerçevenin bir kenar uzunluğunun en az kaç dm olması gerektiğini bulunuz.



Çözüm

Kare tuvalin bir kenar uzunluğu $\sqrt{\frac{4}{9}+\frac{10}{9}+\frac{25}{36}}$ dm'dir. Kökün içindeki sayılar incelendiğinde $\frac{4}{9}=\left(\frac{2}{3}\right)^2$, $\frac{25}{36}=\left(\frac{5}{6}\right)^2$ ve $\frac{10}{9}=2\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{5}{6}$ olduğu görülür. Buradan kökün içi $\frac{2}{3}$ ve $\frac{5}{6}$ sayılarının toplamının karesinin özdeşi olduğundan $\sqrt{\frac{4}{9}+\frac{10}{9}+\frac{25}{36}}=\sqrt{\left(\frac{2}{3}+\frac{5}{6}\right)^2}=\left|\frac{2}{3}+\frac{5}{6}\right|=\frac{9}{6}=\frac{3}{2}$ bulunur. Tuval için seçilecek çerçevenin bir kenar uzunluğu, en az $\frac{3}{2}$ dm olmalıdır.

Konu ile ilgili etkileşimli içeriğe ulaşmak için karekodu okutunuz.

Alıştırmalar

1. **"a, b ve c gerçek sayılar olmak üzere b, a dan büyük ve c, b den büyük ise a, c den küçüktür." önermesini sembolik dille ifade ediniz.**

2. "Tabanı 1'den büyük gerçek sayı olan üslü gösterimlerin kuvveti arttıkça üslü gösterimin değeri artar." önermesi veriliyor.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.


a) Önermeyi matematiksel sembol kullanarak yazınız.


b) Önermenin cebirsel ispatını yapınız.


3. $a, b \in \mathbb{R}$ olmak üzere a sayısı $\sqrt{45}$'in toplama işlemine göre tersine, b sayısı $\frac{\sqrt{5}}{12}$'nin çarpma işlemine göre tersine eşittir.

Buna göre $a^2 + 2ab + b^2$ **ifadesinin değerini bulunuz.**

4. Aşağıda verilen şekillerde yuvarlak içindeki ifadelerin çarpımı dikdörtgenlerin içine yazılmıştır $(a, b \in \mathbb{R})$.








$K = \frac{\sqrt{3}+1}{2}$ ve $L = \sqrt{48}$ **olduğuna göre** $a \cdot b$ **ifadesinin değerini bulunuz.**

5. $x = 4026$ ve $y = 2374$ olarak veriliyor.

Buna göre $4xy + (x - y)^2$ **ifadesinin değerini bulunuz.**

6. $(3-1) \cdot (3-\sqrt{2}) \cdot (3-\sqrt{3}) \cdot (3-\sqrt{4}) \cdot \ldots \cdot (3-\sqrt{30})$ **işleminin sonucunu bulunuz.**


7.



Yandaki şekilde bir kenar uzunluğu x cm olan özdeş dört karenin birer köşesi, bir kenar uzunluğu y cm olan karenin köşeleri ile çakışıktır.

$|AB| = 7$ cm, $x \cdot y = \frac{3}{2}$ **olduğuna göre şeklin alanının kaç cm² olduğunu bulunuz.**

8.




Yanda bir kenar uzunluğu 256 cm olan kare şeklinde bir zemin verilmiştir. Bu zemine bir kenar uzunluğu 64 cm olan, birbirine eş, kare şeklinde 4 adet seramik köşeleri birbirine çakışacak biçimde yapıştırılmıştır. Geri kalan bölüm mavi renge boyanmıştır.

Boyaya ödenen ücretin (TL) üslü gösterimi $2^{14} \cdot 3^2 \cdot 5^{-4}$ **olduğuna göre 1 metrekarelik alan için boya ücretinin kaç TL olacağını bulunuz.**

9.



Şekil 1



Şekil 2

Ön yüzü mor, arka yüzü sarı olan dikdörtgen şeklindeki bir karton Şekil 1'deki gibi verilmiştir. Bu kartonun DC kenarı, BC kenarı ile çakışacak biçimde Şekil 2'deki gibi katlanıyor. Şekil 2'de oluşan ED'C üçgeninin alanı $(2x^2 + 8x + 8)$ cm² ve ABD'E dikdörtgeninin çevre uzunluğu 8x cm'dir.

Buna göre ABD'E **dikdörtgeninin alanının cebirsel temsilini bulunuz.**

Konu ile ilgili daha fazla soru çözmek için karekodu okutunuz.

Konu ile ilgili çalışma kâğıdına ve bütüncül dereceli puanlama anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

Ölçme ve Değerlendirme

Bu bölümde cevaplamanız için farklı soru tiplerinde 13 adet soru bulunmaktadır.
Ölçme ve değerlendirme bölümünün sonunda verilen karekodu okutarak ek sorulara ulaşabilirsiniz.

1. Aşağıdaki tabloda bazı gök cisimlerinin kütleleri (kg) yaklaşık olarak verilmiştir.

Gök Cismi	Yaklaşık Kütlesi (kg)
Güneş	$1,99 \cdot 10^{30}$
Dünya	$5,97 \cdot 10^{24}$
Mars	$6,42 \cdot 10^{23}$
Satürn	$5,68 \cdot 10^{26}$
Ay	$7,34 \cdot 10^{22}$

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Dünya'nın kütlesinin Mars'ın kütlesinden kaç kg fazla olduğunu yaklaşık olarak bulunuz.

b) Dünya, Mars ve Ay'ın kütleleri toplamının kaç kg olduğunu yaklaşık olarak bulunuz.


c) Güneş'in kütlesinin Dünya'nınkinin kaç katı olduğunu yaklaşık olarak bulunuz.

ç) Gerçek oranlara sadık kalınarak yapılan bir Güneş sistemi maketinde Satürn modelinin kütlesi 5,68 kg'dır.

Bu makette Ay modelinin kütlesinin kaç kg olduğunu bulunuz.

2. Semih Bey, kare şeklindeki bahçesinin dikdörtgen şeklindeki bir bölümünü otopark olarak kullanmaktadır. Semih Bey'in bahçesi ABCD karesiyle, otopark bölümü EFGD dikdörtgeniyle modellenmiştir.

Bahçe ve otoparkla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.



- Bahçenin alanı 108 m^2 dir.
- Otoparkın uzun kenarının uzunluğu, kısa kenarının uzunluğunun 2 katıdır.
- Bahçenin bir kenarının uzunluğu, otoparkın kısa kenar uzunluğunun 3 katıdır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Bahçenin çevre uzunluğunun kaç metre olduğunu bulunuz.

b) Semih Bey, otoparkının zeminine metrekaresi 550 Türk lirası olan taşlardan döşetecektir.

Semih Bey'in bu işlem için toplam kaç Türk lirası ödemesi gerektiğini bulunuz.

c) Semih Bey bahçesinin çevresini çitle çevirecektir.

Semih Bey'in bu işlem için alacağı çitin uzunluğunun hangi ardışık iki tam sayı arasında olduğunu metre cinsinden bulunuz.

3. A ve B şehirlerinin mart ayında ölçülen sıcaklık değerleriyle ilgili bilgiler aşağıda veriliyor.

- A şehrinde aylık ortalama sıcaklık değeri 12 ^{o}C'tur ve herhangi bir anda ölçülen sıcaklık değeri ortalamadan en fazla 8 ^{o}C sapma yapmaktadır.
- B şehrinde aylık ortalama sıcaklık değeri 7 ^{o}C'tur. En düşük sıcaklık -2 ^{o}C, en yüksek sıcaklık 16 ^{o}C olarak ölçülmüştür.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) A ve B şehirlerinde mart ayında ölçülebilecek sıcaklık değerlerini mutlak değerli eşitsizlik ve gerçek sayı aralığı biçiminde gösteriniz.

b) Mart ayında ölçülen bir sıcaklık değerinin hem A hem B şehrine ait olabileceği biliniyor.

Ölçülen sıcaklığın alabileceği değerleri gerçek sayı aralığı biçiminde, küme gösterimiyle ve sayı doğrusunda gösteriniz.

c) Mart ayında ölçülen bir sıcaklık değerinin A şehrine ait olup B şehrine ait olmadığı biliniyor.

Ölçülen sıcaklığın alabileceği değerleri gerçek sayı aralığı biçiminde, küme gösterimiyle ve sayı doğrusunda gösteriniz.

ç) Mart ayında ölçülen bir sıcaklık değerinin A veya B şehirlerine ait olduğu biliniyor.

Ölçülen sıcaklığın alabileceği değerleri gerçek sayı aralığı biçiminde, küme gösterimiyle ve sayı doğrusunda gösteriniz.

4. Aşağıdaki tabloda resmî futbol müsabakalarında kullanılacak topların standartlaşmış ölçülerinin hangi aralıklarda olması gerektiği verilmiştir.

Ölçüm	Alabileceği Değer
Çevre Uzunluğu	En az 68 cm, en fazla 70 cm
Kütlesi	En az 410 gr, en fazla 450 gr
İç Basıncı (Deniz Seviyesinde)	En az 0,6 atm, en fazla 1,1 atm

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Topun çevre uzunluğunun kaç cm olabileceğini gösteren aralığı mutlak değerli eşitsizlik olarak yazınız.

b) Topun kütlesinin kaç gr olmayacağını gösteren aralığı mutlak değerli eşitsizlik olarak yazınız.

c) Topun iç basıncının kaç atm olabileceğini gösteren aralığı mutlak değerli eşitsizlik olarak yazınız.

5. Evinde organik reçel yapan Zeynep Hanım, ev bütçesine katkı sağlamak için bu reçellerin satışını yapmak istemektedir. Bunun için piyasada satılan reçellerin 1 kilogramının fiyatlarını araştırmış ve tablodaki değerlere ulaşmıştır.

Reçel Fiyatları (TL)			
184	145	220	175
130	155	134	225

Zeynep Hanım, belirleyeceği fiyatın araştırdığı fiyatların ortalamasından en fazla 20 Türk lirası sapmasını istemektedir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Zeynep Hanım'ın satışını yapacağı 1 kg reçel fiyatının alacağı değerleri mutlak değerli eşitsizlik kullanarak gösteriniz.

b) Zeynep Hanım'ın satışını yapacağı 1 kg reçel fiyatının alabileceği en büyük değer ile en küçük değeri bulunuz.

c) Zeynep Hanım'ın satışını yapacağı 1 kg reçel fiyatının alabileceği değerleri sayı doğrusu üzerinde gösteriniz.

ç) Tablodaki fiyatlardan hangilerinin Zeynep Hanım'ın belirlediği fiyat aralığına dâhil olduğunu bulunuz.

6. 100 metre koşu yarışı gibi kısa mesafe yarışlarında sporcuların sıralamalarının daha hassas bir şekilde yapılması için saniyenin ondalık gösterimine ihtiyaç duyulur.

5 sporcunun katıldığı bir 100 metre koşu yarışının bitiminde sporcuların yarışı kaç saniyede tamamladıklarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Her bir sporcunun yarışı bitirme süresi birbirinden farklıdır.

Sporcu	Yarışı Bitirme Süresi (sn.)
Ali	12,6a
Bora	12,6b
Cem	12,7c
Deniz	12,7d
Efe	12,7e


Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Ali 1. olduysa a ve b rakamlarını sıralayınız.

b) Bora 1. olduysa a nın hangi değeri alamayacağını bulunuz.

c) Cem 3. ve Efe 5. olduysa c, d ve e rakamlarını sıralayınız.

7. Aşağıda kare şeklindeki bir oyun kartı verilmiştir. Kartın yüzeyi kare ve dikdörtgen şeklindeki parçalara ayrılmış, her bir parçanın bir kenarının uzunluğu (cm) şekil üzerinde gösterilmiştir.




Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Oyun kartında verilen uzunluklardan yararlanarak $(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2$ ifadesinin eşitini geometrik temsiller yardımıyla bulunuz.

b) $(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2$ ifadesinin eşitini gerçek sayılarda işlem özelliklerini kullanarak bulunuz. Bulduğunuz ifadeyi a maddesinde bulduğunuz sonuç ile karşılaştırınız.

8. Aşağıda verilen ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir arsa, KLMN ve BCEL kareleri şeklinde iki parsele ayrılacaktır. Kalan kısım yeşil alan, KLMN karesel bölgesi çocuk parkı olarak düzenlenecektir. $|AK| = 2^x$ birim, $|KL| = (2^x + 1)$ birim ve $|LB| = 2^{x+1}$ birimdir.



Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Çocuk parkı olarak belirlenen bölgenin alanını x cinsinden ifade ediniz.

b) Yeşil alan olarak belirlenen bölgenin alanını x cinsinden ifade ediniz.

9.



Yukarıdaki görselde bir alışveriş merkezinin otoparkında doğrusal olarak yerleştirilen engelli park alanı levhaları verilmiştir. Bu levhaların yerleri sayı doğrusu üzerinde modellenmiştir. -5^{12} ile 5^{15} noktaları arasına eşit aralıklarla 20 park tabelası yerleştirilmiştir.

Buna göre ardışık iki park tabelası arasındaki mesafenin kaç birim olduğunu bulunuz.

10. Bir radyo istasyonu, bulunduğu noktanın $1,213 \cdot 10^5$ m uzağına kadar yayınını ulaştırabilmektedir. Ayla, Burak ve Ceren'in radyo istasyonuna uzaklıkları sırasıyla $6,84 \cdot 10^4$, $1,3 \cdot 10^5$ ve $0,11 \cdot 10^6$ m'dir.

Buna göre radyo yayını Ayla, Burak ve Ceren'den hangilerine ulaşır?

A) Yalnız Burak

B) Ayla ve Burak

C) Ayla ve Ceren

D) Burak ve Ceren

E) Ayla, Burak ve Ceren

11. Aşağıda bir önerme ve bu önermenin ispatı gösterilmiştir.

Önerme: x, y, z ve $t \in \mathbb{R}$ olmak üzere $x < y$ ve $z < t$ ise $x - t < y - z$ olur.

Hipotez: x, y, z ve $t \in \mathbb{R}$ olmak üzere $x < y$ ve $z < t$ olsun.

Hüküm: $x - t < y - z$ olur.

İspatın adımları aşağıdaki gibidir.

1. Adım: $x - t < y - z$ olduğu gösterilir.

$a \leq b$ ise $a + c \leq b + c$ sıralama özelliği yardımıyla

$x < y$ eşitsizliğinden $x + t < y + t$ eşitsizliği elde edilir.

2. Adım: $-t < -z$ olduğu gösterilir.

$a \leq b$ ve $0 \geq c$ ise $a \cdot c \geq b \cdot c$ sıralama özelliği yardımıyla

$z < t$ eşitsizliğinden $-t < -z$ eşitsizliği elde edilir.

3. Adım: $y - t < y - z$ olduğu gösterilir.

$a \leq b$ ise $a + c \leq b + c$ sıralama özelliği yardımıyla

$-t < -z$ eşitsizliğinden

$y - z < y - t$ eşitsizliği elde edilir.

4. Adım: $x - t < y - z$ olduğu gösterilir.

1 ve 3. adımda elde edilen eşitsizliklerden $x - t < y - z$ eşitsizliği elde edilir.


5. Adım: Hükme ulaşılır.

Buna göre ispata ait adımların hangisinde ilk defa hata yapılmıştır?


A) 1. adım B) 2. adım C) 3. adım

D) 4. adım E) 5. adım

12. Tabure satan bir mağazada satışa sunulan iki farklı tabure çeşidi Görsel 1 ve Görsel 2'de verilmiştir.



Görsel 1



Görsel 2

Mağazası için bu taburelerden toplu şekilde satın alan Merve Hanım, tabureleri depoya yerleştirirken aynı renk tabureleri üst üste ve tek sıra hâlinde dizmiştir. Tabureler ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

- Üst üste dizilen pembe ve mavi taburelerin yerden yükseklikleri eşittir.
- Pembe taburelerin yerden yüksekliği ve üst üste konan iki pembe taburenin üst yüzeyleri arasındaki mesafe Görsel 1'de verilmiştir.
- Mavi taburelerin yerden yüksekliği ve üst üste konan iki mavi taburenin üst yüzeyleri arasındaki mesafe Görsel 2'de verilmiştir.
- Üst üste duran taburelerin her birinin arasındaki mesafe eşittir.

Bu depoda üst üste en fazla 20 tane pembe tabure dizilebildiğine göre mavi taburelerden en çok kaç tanesi üst üste dizilebilir?

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

13. Aysun, Burak ve Canan isimli üç arkadaş evden işe giderken aynı tramvaya farklı saatlerde binmiştir. Aşağıdaki tabloda bu üç arkadaşın tramvaya biniş saatleri ve tramvayda bulundukları sürelerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

	Biniş Saati	Tramvayda Bulundukları Süre
Aysun	07.25	35 dakika
Burak	-	30 dakika
Canan	07.40	40 dakika

Tüm yolculuk boyunca Aysun, Burak ve Canan'ın tramvayda birlikte bulundukları süre 8 dakikadır.

Buna göre

I. Tüm yolculuk boyunca tramvayda Aysun, Burak ve Canan'dan en az birinin bulunduğu süre 55 dakikadır.

II. Tüm yolculuk boyunca tramvayda Aysun, Burak ve Canan'dan yalnız ikisinin birlikte bulunduğu süre 27 dakika ise tramvaydan son inen Canan'dır.

III. Tüm yolculuk boyunca tramvayda Aysun, Burak ve Canan'dan yalnız birinin bulunduğu süre 17 dakika ise tramvaya ilk binen Aysun'dur.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

Tema ile ilgili daha fazla soru çözmek için karekodu okutunuz.



2. TEMA

Nicelikler ve Değişimler

2.1. Gerçek Sayılarda Tanımlı Doğrusal Fonksiyonlar ve Nitel Özellikleri

2.2. Gerçek Sayılarda Tanımlı Mutlak Değer Fonksiyonları ve Nitel Özellikleri

2.3. Doğrusal Fonksiyonlarla İfade Edilebilen Denklem ve Eşitsizlikler İçeren Problemler

▶ **Anahtar Kavramlar**

- artanlık-azalanlık
- bağımlı-bağımsız değişken
- bire birlik
- doğrusal denklem ve eşitsizlik
- doğrusal fonksiyon
- doğrusal ilişki
- eğim
- fonksiyonların parçalı gösterimi
- fonksiyonun işareti
- fonksiyonun sıfırı
- katsayı
- kök
- maksimum-minimum noktaları
- mutlak değer fonksiyonu
- sabit fonksiyon
- sabit terim

▶ **Sembol ve Gösterimler**

- $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
- $f(x) = x$
- $f(x) = ax \pm b$
- $f(x) = |x|$
- $f(x) = \pm |ax \pm b| \pm c$

▶ **Bu temada sizden**

- gerçek sayılarda $f(x) = x$ şeklinde tanımlı doğrusal referans fonksiyonun nitel özellikleri ile bu fonksiyondan türetilen $g(x) = a \cdot f(x \pm r) \pm k$, $(a, r, k \in R, a \neq 0)$ doğrusal fonksiyonlarının nitel özelliklerine ilişkin matematiksel muhakeme yapabilmeniz,
- gerçek sayılarda $f(x) = \pm |ax \pm b| \pm c$ $(a, b, c \in R, a \neq 0)$ şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilmeniz,
- doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizlikleri içeren problemleri çözebilmeniz

beklenmektedir.

Tema boyunca sizden çalışma kâğıtlarındaki soruları çözmeniz, performans görevlerini yerine getirmeniz, ölçme ve değerlendirme sorularını çözmeniz beklenmektedir.



Tema karekodu

Tema sunusuna ulaşmak için karekodu okutunuz.

Başlarken

Günlük hayatta iki nicelik arasındaki doğrusal ilişkilere sıklıkla rastlanmaktadır. Örneğin okuldan eve sabit hızla yürüyen bir kişinin katettiği mesafe ile zaman, sabit maliyeti olan bir ürünün üretim miktarı ile toplam maliyeti, sabit hızla ilerleyen bir aracın katettiği mesafe ile harcadığı yakıt miktarı arasında doğrusal bir ilişki vardır. Bu doğrusal ilişkileri ifade etmek için doğrusal fonksiyonlar kullanılır.

Ön Değerlendirme

1. Aşağıda doğrusal ilişki içeren gerçek yaşam durumları verilmiştir.

- Sabit hızla yürüyen bir kişinin zamana bağlı aldığı mesafe
- Kullanılan su miktarına bağlı olarak su sayacında yazan değer
- Çekilen fotokopi sayısına bağlı ödenen ücret

Verilen durumları inceleyerek doğrusal ilişki içeren gerçek yaşam durumlarına farklı örnekler veriniz.

2. Gerçek sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonlarının cebirsel temsilleri $f(x) = 2x - 4$ ve $g(x) = -x + 3$ biçimindedir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Tabloda verilen x değerlerine karşılık gelen $f(x)$ ve $g(x)$ değerlerini bularak tabloyu örnekteki gibi doldurunuz.


x	−1	0	2	5
$f(x) = 2x - 4$	−6			
$g(x) = -x + 3$	4			

b) f ve g fonksiyonlarında x in aldığı değerler artarken $f(x)$ ve $g(x)$ in aldığı değerlerin nasıl değiştiğini belirleyiniz.

3. $x \in \mathbb{R}$ olmak üzere $-2x + 13 = \frac{1}{2}$ denklemini çözünüz.

4. $3x - 1 < 0$ eşitsizliğinin gerçek sayılardaki çözüm kümesini bulunuz.

5. Aşağıdaki dik koordinat sisteminde gerçek sayılarda tanımlı f, g, h ve k fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.



Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) f, g, h ve k fonksiyonlarını temsil eden doğruların eğimlerini bulunuz.

b) Doğrunun eğimi, dik koordinat sistemindeki konumunu nasıl etkilemektedir? Yorumlayınız.

6. Gerçek sayı doğrusu üzerindeki $a = -8$ ve $b = 14{,}4$ noktalarının sıfır noktasına olan uzaklıklarını bulunuz.

2.1. GERÇEK SAYILARDA TANIMLI DOĞRUSAL FONKSİYONLAR VE NİTEL ÖZELLİKLERİ

Konuya Başlarken

1.



Geçmişte haberleşme aracı olarak kullanılan dilek fenerleri, günümüzde genellikle açık hava etkinliklerinde kullanılmaktadır. Dilek fenerlerinin iç kısmında görseldeki gibi bir mum bulunmaktadır. Mum yakıldığında dilek feneri ısının etkisiyle yükselmeye başlar.

Başlangıçta deniz seviyesinde bulunan bir dilek feneri, tabanındaki mum yakıldıktan sonra gökyüzüne doğru bırakılmıştır. Sabit hızla yükseldiği kabul edilen dilek feneri, 1 saniyede 10 cm yükselmektedir.

Dilek fenerinin zamana (sn.) bağlı olarak deniz seviyesinden yüksekliğini (cm) gösteren ilişki, uygun aralıkta $f(x) = 10x$ şeklinde tanımlı f fonksiyonu ile ifade edilebilir.


Bu ilişkide zaman bağımsız değişken, yükseklik bağımlı değişkendir.


Buna göre aşağıdaki sorularla ilgili fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.


a) f fonksiyonunun doğrusal bir ilişkiyi temsil ettiği göz önüne alınırsa fonksiyonun grafiği nasıl çizilebilir?

b) f fonksiyonunun grafiği bir doğru belirtir mi? Fonksiyonun grafiği bir doğru belirtiyorsa doğrunun eğimi nasıl hesaplanabilir?

2. Aşağıda A, B ve C sıvılarının farklı ortamlarda ısıtılması ile elde edilen zamana (dk.) bağlı sıcaklıkları (°C) sırasıyla uygun aralıkta tanımlı f, g ve h fonksiyonları ile ifade edilmiştir. f, g ve h fonksiyonlarının grafik temsilleri aşağıda verilmiştir.







Buna göre aşağıdaki sorularla ilgili fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

a) f, g ve h fonksiyonlarının cebirsel temsillerinin ne gibi ortak yönleri vardır?

b) Sıcaklık (°C) ve zaman (dk.) değişkenleri arasındaki ilişki nasıl değişmektedir?

Gerçek yaşamda iki değişken arasında bulunan doğrusal ilişki, doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilir. Doğrusal fonksiyonların grafikleri dik koordinat sisteminde doğru belirtir. Fonksiyonların cebirsel ve grafik temsillerinden yararlanılarak doğrusal ilişki hakkında çıkarımlar yapılabilir.

Gerçek Sayılarda f(x) = x Şeklinde Tanımlı Doğrusal Referans Fonksiyon


Gerçek sayılarda f(x) = x şeklinde tanımlı f fonksiyonu doğrusal referans fonksiyondur. Doğrusal fonksiyonların grafikleri oluşturulurken ve nitel özellikleri (tanım kümesi, görüntü kümesi, işareti, artanlığı-azalanlığı, maksimum-minimum noktaları, sıfırı ve bire birliği) belirlenirken f doğrusal referans fonksiyonundan yararlanılabilir.

1. Uygulama

Gerçek Sayılarda $f(x) = x$ Şeklinde Tanımlı f Doğrusal Referans Fonksiyonunun Nitel Özellikleri

Verilen bilgileri inceleyerek soruları cevaplayınız.

1. Sabit hızla hareket eden bir araç, dakikada 1 kilometre yol almaktadır. Araç, sabit hızla 120 dakika boyunca hareket etmiş ve 120 km yol almıştır. Aracın hareketi gözlemlenmeye başladığı andan itibaren zamana (dk.) bağlı aldığı mesafeyi (km) gösteren fonksiyon g olmak üzere g fonksiyonunun cebirsel temsili, g(x) = x olur. Grafik 1'de g fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



Grafik 1

a) Tablo 1'de bağımsız değişkenin (x) aldığı bazı değerlere karşılık gelen bağımlı değişken (g(x)) değerleri verilmiştir. Tabloda verilmeyen değerleri bulunuz.

Tablo 1

x	0	15	30	.....	120
g(x)	0	.....	30	60	.....

b) Bağımlı değişkenin minimum (en küçük) ve maksimum (en büyük) değerini bulunuz.

c) Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin alabileceği değerlerin aralıklarını bulunuz.


ç) Bağımsız değişkenin hangi değeri için bağımlı değişkenin sıfıra eşit olduğunu bulunuz.

d) Bağımlı değişken; bağımsız değişkenin hangi değerleri için pozitif, hangi değerleri için negatif olur? Bulunuz.

e) Bağımsız değişkenin aldığı değerler artarken g fonksiyonunun aldığı değerlerin nasıl değiştiğini belirleyiniz.

f) Bağımsız değişkenin aldığı iki farklı değer için g fonksiyonunun aldığı değerler birbirinden farklı mıdır? Bu durumun bağımsız değişkenin alabileceği tüm değerler için geçerli olup olmadığını açıklayınız.

2. 1. maddede incelenen g fonksiyonu gerçek sayılarda tanımlanarak cebirsel temsili f(x) = x olan f doğrusal referans fonksiyonu elde edilmiştir. Grafik 2'de f doğrusal referans fonksiyonunun grafik temsili verilmiştir.



Grafik 2

a) Tablo 2'de f doğrusal referans fonksiyonunda x e bağlı f(x) in aldığı bazı değerler verilmiştir. Verilmeyen değerleri bularak tabloda ilgili yerlere yazınız.

Tablo 2

x	$-\infty$	...	.....	$-\sqrt{3}$	$-\frac{1}{2}$	.....	1	.....	...	∞
y=f(x)	$-\infty$	...	−2	$-\sqrt{3}$	.....	0	.....	$\frac{3}{2}$	...	∞

b) Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin alabileceği değerlerin aralığını bulunuz.

c) f fonksiyonunda f(x) = 0 eşitliğini sağlayan x değerini bulunuz.

ç) Bir fonksiyonda bağımlı değişken; bağımsız değişkenin bazı değerleri için pozitif, bazı değerleri için negatif olabilir. Tablo 3'te f fonksiyonunun aldığı negatif ya da pozitif değerler belirlenecektir. Tablonun ilk satırı bağımsız değişkenin 2. satırı bağımlı değişkenin aldığı değerleri temsil etmektedir. İlk satırdaki alana f fonksiyonunda f(x) = 0 eşitliğini sağlayan x değerini yazınız. f fonksiyonunun negatif ya da pozitif olduğu aralıkları belirleyerek ikinci satırdaki ilgili alanlara yazınız.

Tablo 3

x	$-\infty$	.....	∞
f(x)=x	.....	0	.....


d) Tablo 3'te elde ettiğiniz bilgilerden yararlanarak uygun gerçek sayı aralıklarını aşağıdaki cümlede boş bırakılan alanlara yazınız.

İşaret tablosuna göre $\forall x$ ..... için fonksiyonun işaretinin negatif olduğu, $\forall x$ ..... için fonksiyonun işaretinin pozitif olduğu görülür.

e) f fonksiyonunda bağımsız değişkenin aldığı değerler artarken bağımlı değişkenin aldığı değerlerin nasıl değiştiğini bulunuz.

f) Grafik 2'yi inceleyerek f fonksiyonunda bağımlı değişkenin minimum ve maksimum değerlerini bulunuz.


g) f doğrusal referans fonksiyonu $[1, 5]$nda tanımlanarak h fonksiyonu elde edilmiştir. Grafik 3'te h fonksiyonunun grafik temsili verilmiştir.



Grafik 3

Grafikten yararlanarak bağımlı değişkenin minimum ve maksimum değerlerini bulunuz.

ğ) f doğrusal referans fonksiyonu $(1, 5)$nda tanımlanarak m fonksiyonu elde edilmiştir. Grafik4'te m fonksiyonunun grafik temsili verilmiştir.




Grafik 4

Grafik 4'ü inceleyerek m fonksiyonunun maksimum veya minimum değerinin olup olamayacağını sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.

h) Bağımsız değişkenin aldığı iki farklı değer için f fonksiyonunun aldığı değerler birbirinden farklı mıdır? Bu durumun bağımsız değişkenin alabileceği tüm değerler için geçerli olup olmadığını açıklayınız.

3. Grafik 5'te gerçek sayılarda tanımlı k doğrusal fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



Grafik 5

Grafik 5'i inceleyerek k fonksiyonunda bağımsız değişkenin aldığı değerler artarken bağımlı değişkenin aldığı değerlerin nasıl değiştiğini bulunuz.

Bir fonksiyonda bağımsız değişkenin alabileceği tüm değerler, fonksiyonun **tanım kümesi** olarak adlandırılır. Bağımsız değişkenin alabileceği tüm değerlere karşılık bağımlı değişkenin alabileceği tüm değerlerin oluşturduğu küme, **görüntü kümesi** olarak adlandırılır.

Cebirsel temsili $f(x) = x$ olan f fonksiyonunda x, tüm gerçek sayı değerlerini alabilir. Bu sebeple f fonksiyonunun en geniş tanım kümesi gerçek sayılardır. f fonksiyonu, x in aldığı tüm gerçek sayı değerlerini kendisi ile eşleştirir. Bu sebeple f fonksiyonunun görüntü kümesi gerçek sayılardır.


Buradan f fonksiyonu, f: $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ biçiminde tanımlanabilir.

f fonksiyonunda $f(x) = 0$ eşitliğini sağlayan x değerine f fonksiyonunun **sıfırı** denir.

Fonksiyonun tanımlı olduğu belirli bir aralık için bağımsız değişkenin aldığı değerler artarken bağımlı değişkenin aldığı değerler de artıyorsa fonksiyon bu aralıkta **artan**dır.

Fonksiyonun tanımlı olduğu belirli bir aralık için bağımsız değişkenin aldığı değerler artarken bağımlı değişkenin aldığı değerler azalıyorsa fonksiyon bu aralıkta **azalan**dır.

Gerçek sayılarda $f(x) = x$ şeklinde tanımlı f doğrusal referans fonksiyonunda bağımsız değişkenin aldığı değerler artarken bağımlı değişkenin aldığı değerler de artmaktadır. Bu durum, f fonksiyonunun grafiği üzerinde Grafik 2.1'deki gibi gösterilir.



Grafik 2.1: *f fonksiyonunun artanlığının gösterimi*

$\forall a, b \in \mathbb{R}$ için
$a < b$ iken $f(a) < f(b)$ oluyorsa f, gerçek sayılarda **artan**;
$a < b$ iken $f(a) > f(b)$ oluyorsa f, gerçek sayılarda **azalan** fonksiyondur.

$a, b \in \mathbb{R}$ ve f fonksiyonu $[a, b]$nda tanımlı olsun.


$\forall x \in [a, b]$ için $f(x) \leq f(m)$ şartını sağlayan $f(m)$ değerine f fonksiyonunun **maksimum değeri**, bu değeri aldığı $x = m$ noktasına f fonksiyonunun **maksimum noktası** denir.

$\forall x \in [a, b]$ için $f(x) \geq f(n)$ şartını sağlayan $f(n)$ değerine f fonksiyonunun **minimum değeri**, bu değeri aldığı $x = n$ noktasına f fonksiyonunun **minimum noktası** denir.

Bir f fonksiyonunda tanım kümesinde farklı x değerlerine karşılık gelen $f(x)$ değerleri birbirinden farklı ise f, **bire bir** fonksiyondur. Benzer şekilde görüntü kümesindeki bir $f(x)$ değerine tanım kümesinde sadece bir x değeri karşılık geliyorsa f, **bire bir** fonksiyondur.

Gerçek sayılarda tanımlı bir f fonksiyonunda
$\forall a, b \in \mathbb{R}$ için $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$ ve $a \neq b \Rightarrow f(a) \neq f(b)$ ise f, bire bir fonksiyondur.

Gerçek sayılarda $f(x) = x$ şeklinde tanımlı f doğrusal referans fonksiyonunun bire birliği, Grafik 2.2'deki gibi gösterilebilir.



Grafik 2.2: *f fonksiyonunun bire bir olduğunun gösterimi*

Kontrol Noktası

$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x$ şeklinde tanımlı f doğrusal referans fonksiyonunun nitel özellikleri aşağıdaki gibidir.

- f fonksiyonunun **tanım ve görüntü kümeleri** gerçek sayılar kümesidir.
- f fonksiyonunun işareti, tablo ile aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

x	$-\infty$		0		∞
f(x)		$-$	0	$+$	

- f fonksiyonunda $x = 0$ için $f(0) = 0$ olduğundan $x = 0$ f fonksiyonunun **sıfırı**dır.
- f fonksiyonunun işareti $\forall x \in (-\infty, 0)$ için negatif, $\forall x \in (0, \infty)$ için pozitiftir.
- f fonksiyonunun **maksimum** ve **minimum** noktası yoktur.
- f fonksiyonu gerçek sayılarda **artan**dır.
- f fonksiyonu **bire bir**dir.

Gerçek Sayılarda $g(x)=a \cdot f(x \pm r) \pm k$ Şeklinde Tanımlı Doğrusal Fonksiyonlar

a, r, $k \in \mathbb{R}$ olmak üzere gerçek sayılarda $f(x) = x$ şeklinde tanımlı f doğrusal referans fonksiyonundan türetilen veya $g(x) = a \cdot f(x \pm r) \pm k$ şeklinde ifade edilen fonksiyonlara **doğrusal fonksiyon** denir.

m, $n \in \mathbb{R}$ olmak üzere $g: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = a \cdot f(x \pm r) \pm k$ şeklindeki g doğrusal fonksiyonu düzenlenerek $g(x) = mx + n$ biçiminde yazılabilir.

Doğrusal fonksiyonların grafikleri, bir doğru belirtir ve $f(x) = x$ şeklinde tanımlı doğrusal referans fonksiyondan türetilen fonksiyonlardan elde edilebilir.

2. Uygulama

Gerçek Sayılarda $g(x) = ax$ Şeklinde Tanımlı Doğrusal Fonksiyonların İncelenmesi


Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Tablo 1'de a gerçek sayısının bazı değerleri için oluşturulan, gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonlar verilmiştir. Bu fonksiyonların verilen x değerleri için aldığı değerleri bularak tabloda ilgili yere örnekteki gibi yazınız.

Tablo 1

Fonksiyon	$x = -2$	$x = -1$	$x = 0$	$x = 1$	$x = 2$
$f(x) = x$	$f(-2) = -2$	$f(-1) = -1$	$f(0) = 0$	$f(1) = 1$	$f(2) = 2$
$h(x) = 3x$					
$k(x) = \frac{x}{2}$					
$m(x) = -2x$					
$n(x) = -\frac{2x}{3}$					

2. Tablo 1'de elde ettiğiniz bilgilerden yararlanarak h, k, m ve n fonksiyonlarının grafiklerini aşağıdaki dik koordinat sisteminde çiziniz. f doğrusal referans fonksiyonunun eğimine göre h, k, m ve n fonksiyonlarının eğimlerinin nasıl değiştiğini cebirsel ifadeleri ile ilişkilendirerek açıklayınız.



3. a nın 0'dan farklı gerçek sayı değerleri için g: $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = ax$ şeklinde tanımlı doğrusal fonksiyonların grafiklerindeki dönüşümü f doğrusal referans fonksiyonunun grafiğinden hareketle genelleyiniz.

4. f doğrusal referans fonksiyonunun nitel özelliklerinden yararlanarak gerçek sayılarda $g(x) = ax$ şeklinde tanımlı fonksiyonların nitel özellikleri (tanım ve görüntü kümeleri, işareti, artanlığı-azalanlığı, maksimum-minimum noktaları, sıfırı ve bire birliği) ile ilgili varsayımlarınızı $a > 0$ ve $a < 0$ durumları için oluşturunuz.

5. a) 2. maddede çizdiğiniz grafiklerden yararlanarak h, k, m ve n fonksiyonlarının nitel özelliklerine ait Tablo 2'yi örnekteki gibi doldurunuz.

Tablo 2

Fonksiyon / Nitel Özellik		$f(x) = x$	$h(x) = 3x$	$k(x) = \frac{x}{2}$	$m(x) = -2x$	$n(x) = -\frac{2x}{3}$
Tanım Kümesi (Aralığı)		$\mathbb{R}$				
Görüntü Kümesi (Aralığı)		$\mathbb{R}$				
İşareti	−	$(-\infty, 0)$				
	+	$(0, \infty)$				
Sıfırı		0				
Artanlık-Azalanlık		Artan				
Maksimum Noktası		Yok				
Minimum Noktası		Yok				
Bire Birliği		Bire bir				


b) Tablo 2'de elde ettiğiniz sonuçlardan yararlanarak $a > 0$ ve $a < 0$ durumları için g doğrusal fonksiyonunun nitel özellikleri ile ilgili genellemelerinizi oluşturunuz.

6. Oluşturduğunuz genellemeler ile varsayımlarınızı karşılaştırarak $a > 0$ ve $a < 0$ durumları için gerçek sayılarda $g(x) = ax$ şeklinde tanımlı doğrusal fonksiyonların nitel özellikleri ile ilgili önermelerinizi yazınız.

7. Ulaştığınız önermelerin günlük hayattaki kullanışlılığını değerlendirebilmek için aşağıdaki soruyu cevaplayınız.

Kırmızı ışıkta duran A ve B araçları harekete başladıkları andan itibaren 20 saniye boyunca sabit ivme ile hızlanmıştır. A ve B araçlarının zamana (sn.) bağlı hızlarını (m/sn.) gösteren fonksiyonlar sırasıyla h ve k olmak üzere $h: [0, 20] \longrightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = \frac{x}{2}$, $k: [0, 20] \longrightarrow \mathbb{R}$, $k(x) = 2x$ şeklindedir.

Aşağıda h ve k fonksiyonlarına ait grafikler verilmiştir.



h ve k fonksiyonlarının minimum ve maksimum değerlerini bularak A ve B araçlarının başlangıçtaki ve bitişteki hızlarını yorumlayınız.

8. a) Aşağıda g: $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, g(x) = ax şeklinde tanımlı doğrusal fonksiyonun gerçek sayılarda artan ya da azalan olma durumu cebirsel olarak gösterilmiştir.

$\forall c, d \in \mathbb{R}$ ve c < d olmak üzere g: $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, g(x) = ax şeklinde tanımlı g fonksiyonunda a > 0 iken c < d eşitsizliğinin iki tarafı a ile çarpıldığında a · c < a · d olduğundan c < d için g(c) < g(d) olur. g fonksiyonunda bağımsız değişken artarken bağımlı değişken de artmaktadır. Bu durumda g, gerçek sayılarda artan fonksiyondur.


a < 0 iken c < d eşitsizliğinin iki tarafı a ile çarpıldığında a · c > a · d olduğundan c < d için g(c) > g(d) olur. g fonksiyonunda bağımsız değişken artarken bağımlı değişken azalmaktadır. Bu durumda g, gerçek sayılarda azalan fonksiyondur.

g doğrusal fonksiyonunun sıfırı ve bire birliği ile ilgili oluşturduğunuz önermelerin doğruluğunu cebirsel olarak gösteriniz.

b) Aşağıda g: $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, g(x) = ax şeklinde tanımlı doğrusal fonksiyonun gerçek sayılarda artan ya da azalan olduğu grafiksel olarak doğrulanmıştır.

Bilgisayar veya etkileşimli tahtada matematik yazılımı açılarak **Giriş** bölümüne g(x) = ax yazılır. **Enter** tuşuna basıldığında ekranda g fonksiyonunun grafiği ve a sürgüsü oluşur.


a sürgüsü sıfırdan büyük değerler aldığında g fonksiyonuna ait grafik Görsel 1'deki gibi oluşur.



Görsel 1

a > 0 için g fonksiyonunun grafiği incelendiğinde keyfî alınan c, d $\in \mathbb{R}$ değerleri için c < d iken f(c) < f(d) olduğu görülmektedir. Buradan a > 0 iken g: $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, g(x) = ax biçimindeki g fonksiyonunun artan olduğu sonucuna ulaşılır.

a sürgüsü sıfırdan küçük değerler aldığında g fonksiyonuna ait grafik Görsel 2'deki gibi oluşur.



Görsel 2

$a < 0$ için g fonksiyonunun grafiği incelendiğinde keyfî alınan $c, d \in \mathbb{R}$ değerleri için $c < d$ iken $f(c) > f(d)$ olduğu görülmektedir. Buradan $a < 0$ iken $g: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = ax$ biçimindeki g fonksiyonunun azalan olduğu sonucuna ulaşılır.

g fonksiyonunun sıfırı ve bire birliği ile ilgili oluşturduğunuz önermelerin doğruluğunu matematik yazılımı kullanarak gösteriniz.


Matematik yazılımı ile ilgili videoya ulaşmak için karekodu okutunuz.

9. g fonksiyonunun artan ya da azalan olma durumu gösterilirken kullanılan cebirsel ve grafiksel doğrulama yöntemleri aşağıda kullanışlılık açısından değerlendirilmiştir.

g doğrusal fonksiyonunun artan ya da azalan olma durumu cebirsel olarak ispatlandığında genel bir ifadeye ulaşılmış ve fonksiyonun hangi durumlarda artan, hangi durumlarda azalan olduğu tespit edilmiştir. Fonksiyonun artan ya da azalan olma durumu grafiksel olarak gösterildiğinde daha somut sonuçlara ulaşılmıştır. Bu açıdan grafiksel doğrulama yönteminin daha kullanışlı olduğu söylenebilir.

g fonksiyonunun sıfırı ve bire birliği ile ilgili oluşturduğunuz önermelerin doğruluğunu gösterirken kullandığınız yöntemlerin kullanışlılığını değerlendiriniz.


1. ÖRNEK



$g: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = 2x$ ve $h: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = -\frac{1}{2}x$ şeklinde tanımlı doğrusal fonksiyonların grafikleri, yandaki dik koordinat sisteminde verilmiştir.

Cebirsel temsillerini de dikkate alarak g ve h fonksiyonlarını temsil eden doğruların eğimlerini $f(x) = x$ şeklinde tanımlı f fonksiyonunu temsil eden doğrunun eğimi ve grafiği ile karşılaştırınız. Aralarındaki ilişkiyi yorumlayınız.

Çözüm



$g(x) = 2x$ şeklinde tanımlı g fonksiyonu tanım aralığındaki her elemanı 2 katı ile, $h(x) = -\frac{1}{2}x$ şeklinde tanımlı h fonksiyonu tanım aralığındaki her elemanı $-\frac{1}{2}$ katı ile eşlemektedir.

g fonksiyonunu temsil eden doğrunun eğimi 2 ve h fonksiyonunu temsil eden doğrunun eğimi $-\frac{1}{2}$'dir.

g fonksiyonunun grafiği, f fonksiyonunun grafiğine göre y eksenine daha yakındır.

h fonksiyonunun grafiği, f fonksiyonunun grafiğine göre x eksenine daha yakındır.

3. Uygulama

Gerçek Sayılarda $g(x) = ax + b$ Şeklinde Tanımlı Doğrusal Fonksiyonların İncelenmesi


Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Tablo 1'de a ve b gerçek sayılarının bazı değerleri için oluşturulan, gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonlar verilmiştir. Bu fonksiyonların verilen x değerleri için aldığı değerleri bularak tabloda ilgili yere örnekteki gibi yazınız.

Tablo 1

Fonksiyon	$x = -2$	$x = -1$	$x = 0$	$x = 1$	$x = 2$
$f(x) = x$	$f(-2) = -2$	$f(-1) = -1$	$f(0) = 0$	$f(1) = 1$	$f(2) = 2$
$h(x) = 2x - 5$					
$k(x) = \frac{x}{4} + 1$					
$m(x) = -x + \sqrt{3}$					
$n(x) = -3x - 4$					

2. Tablo 1'de elde ettiğiniz bilgilerden yararlanarak h, k, m ve n fonksiyonlarının grafiklerini aşağıdaki dik koordinat sisteminde çiziniz. b gerçek sayısının aldığı değerlerin h, k, m ve n fonksiyonlarına ait grafiklerin y eksenini kestiği noktayı nasıl değiştirdiğini açıklayınız.



3. a ve b nin 0'dan farklı gerçek sayı değerleri için g: $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = ax + b$ şeklinde tanımlı doğrusal fonksiyonların grafiklerindeki dönüşümü f doğrusal referans fonksiyonunun grafiğinden hareketle genelleyiniz.

4. f doğrusal referans fonksiyonunun nitel özelliklerinden yararlanarak gerçek sayılarda $g(x) = ax + b$ şeklinde tanımlı fonksiyonların nitel özellikleri (tanım ve görüntü kümeleri, işareti, artanlığı-azalanlığı, maksimum-minimum noktaları, sıfırı ve bire birliği) ile ilgili varsayımlarınızı oluşturunuz.

5. a) 2. maddede çizdiğiniz grafiklerden yararlanarak h, k, m ve n fonksiyonlarının nitel özelliklerine ait Tablo 2'yi örnekteki gibi doldurunuz.

Tablo 2


Nitel Özellik \ Fonksiyon		$f(x) = x$	$h(x) = 2x - 5$	$k(x) = \frac{x}{4} + 1$	$m(x) = -x + \sqrt{3}$	$n(x) = -3x - 4$
Tanım Kümesi		$\mathbb{R}$				
Görüntü Kümesi		$\mathbb{R}$				
İşareti	−	$(-\infty, 0)$				
	+	$(0, \infty)$				
Sıfırı		0				
Artanlık-Azalanlık		Artan				
Maksimum Noktası		Yok				
Minimum Noktası		Yok				
Bire Birliği		Bire bir				

b) Tablo 2'de elde ettiğiniz sonuçlardan yararlanarak g doğrusal fonksiyonunun nitel özellikleri ile ilgili genellemelerinizi oluşturunuz.

6. Oluşturduğunuz genellemeler ile varsayımlarınızı karşılaştırarak gerçek sayılarda $g(x) = ax + b$ şeklinde tanımlı doğrusal fonksiyonların nitel özellikleri ile ilgili önermelerinizi yazınız.

7. Ulaştığınız önermelerin günlük yaşamdaki kullanışlılığını değerlendirebilmek için aşağıdaki soruyu cevaplayınız.

Görselde bir koşu pistinde antrenman yapan 4 koşucu ve bir hakem verilmiştir.




Başlangıç çizgisi

Sabit hızla koşan sporculardan 1 ve 2.si başlangıç çizgisinde bulunduğu anda 3 ve 4.sü başlangıç çizgisine sırasıyla 2 metre ve 3 metre uzaklıkta bulunmaktadır. Hakem ise başlangıç çizgisinden 6 metre uzakta hareket etmeden beklemektedir. Koşucular 100 metre ilerideki bitiş çizgisine kadar koşmaya devam etmiştir.


1. koşucu saniyede 6 m, 2. koşucu saniyede 7,5 m, 3. koşucu saniyede 5 m, 4. koşucu saniyede 2,5 m koşmaktadır.

Koşucular görseldeki konumdayken başlatılan süre 100 metre sonunda durdurulmuştur. Koşucular ve hakemin zamana (sn.) bağlı başlangıç çizgisine göre aldıkları mesafeyi (m) gösteren fonksiyonlar sırasıyla g, h, k, m ve n olsun.


a) Aşağıda verilen grafiklerin hangi koşuculara ait olabileceğini ve hakeme ait olan grafiği belirleyerek grafiklerin altındaki boşluğa yazınız.




.....




.....



.....



.....



.....

b) Koşucuların ve hakemin zamana (sn.) bağlı konumlarındaki (m) değişimi gösteren fonksiyonları cebirsel olarak ifade ediniz.

c) Koşucuların ve hakemin zamana (sn.) bağlı konumlarındaki (m) değişimi gösteren fonksiyonların artanlığı veya azalanlığı ile ilgili ne söylenebilir? Hangi kanıtlara dayanarak sonuca ulaştığınızı yazınız.

8. a) g: $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, g(x) = ax + b şeklinde tanımlı doğrusal fonksiyonun nitel özellikleri ile ilgili oluşturduğunuz önermelerin doğruluğunu cebirsel olarak gösteriniz.

b) g: $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, g(x) = ax + b şeklinde tanımlı doğrusal fonksiyonun nitel özellikleri ile ilgili oluşturduğunuz önermelerin doğruluğunu matematik yazılımında aşağıdaki adımları uygulayarak gösteriniz.

1. adım: Bilgisayar veya etkileşimli tahtada matematik yazılımını açarak **Giriş** bölümüne **g(x) = ax + b** yazıp **Enter** tuşuna basınız. Ekranda g fonksiyonunun grafiği ile a ve b sürgüleri oluşacaktır.

2. adım: a ve b sürgülerini hareket ettirerek grafikteki değişimleri gözlemleyiniz.

3. adım: Gözlemlerinizden yararlanarak önermelerinizi doğrulayınız.

Matematik yazılımı ile ilgili videoya ulaşmak için karekodu okutunuz.

9. g fonksiyonunun nitel özellikleri ile ilgili oluşturduğunuz önermelerin doğruluğunu gösterirken kullandığınız yöntemlerin kullanışlılığını değerlendiriniz.

2. ÖRNEK

Bir taksinin A kentinden B kentine sabit hızla 1 saatte gittiği bilinmektedir. Bu taksinin aldığı mesafeye (km) bağlı olarak taksimetrenin gösterdiği ücreti (TL) ifade eden fonksiyon
$f:[0,100] \longrightarrow [30,1730]$, $f(x) = 17x + 30$ şeklinde tanımlanıyor.

Taksinin zamana (dk.) bağlı olarak deposunda kalan benzin miktarındaki (l) değişimi ifade eden fonksiyon $g(x) = -\frac{1}{10}x + 20$ şeklinde tanımlanıyor.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) f ve g fonksiyonlarının bağımsız ve bağımlı değişkenlerini belirleyiniz.

b) g fonksiyonunun tanım ve görüntü kümesini bulunuz.

c) f ve g fonksiyonlarının grafik temsillerini oluşturarak fonksiyonların eğimlerini yorumlayınız.

ç) Taksinin benzini bitene kadar kaç dakika yolculuk edeceğini bulunuz.

Çözüm

a) f fonksiyonuna göre taksinin aldığı yol (km) bağımsız, taksimetrenin gösterdiği ücret (TL) bağımlı değişkendir.


g fonksiyonuna göre taksinin hareket süresi (dk.) bağımsız, kalan benzin miktarı (l) bağımlı değişkendir.

b) Taksinin yolculuğu 60 dakika sürdüğünden g fonksiyonunun tanım kümesi $[0, 60]$ dır. Başlangıçta depodaki benzin miktarı $x = 0$ için $f(0) = -\frac{1}{10} \cdot 0 + 20 = 20$ litre bulunur.


60 dakikanın sonunda depodaki benzin miktarı $x = 60$ için $f(60) = -\frac{1}{10} \cdot 60 + 20 = -6 + 20 = 14$ litre bulunur.

Buradan g fonksiyonunun görüntü kümesi $[14, 20]$dır.

c) f fonksiyonunun grafiği $[0, 100]$nda Grafik 1'deki gibi, g fonksiyonunun grafiği $[0, 60]$nda Grafik 2'deki gibi çizilir.



Grafik 1



Grafik 2

f fonksiyonunu temsil eden doğrunun eğimi 17'dir ve taksimetrenin kilometre başına yazdığı ücreti ifade eder. Eğimin pozitif olması, f fonksiyonunun artanlığıyla ilişkilidir. Dolayısıyla alınan mesafe arttıkça ücret de artmaktadır. g fonksiyonuna ait grafiğin eğimi $-\frac{1}{10}$'dur ve 1 dakikada harcanan benzin miktarını ifade eder. Eğimin negatif olması, g fonksiyonunun azalanlığıyla ilişkilidir. Dolayısıyla benzin miktarı zamanla azalmaktadır.

ç) Taksinin benzini bitene kadar yolculuk edeceği süre g fonksiyonunun sıfırı ile ilişkilidir. Buradan


$$g(x) = -\frac{1}{10}x + 20 = 0 \Rightarrow -\frac{1}{10}x = -20 \Rightarrow x = \frac{-20}{-\frac{1}{10}} = 200 \text{ dakika olur.}$$

1. Sıra Sizde

$g: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x + 2$ ve $h: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = x - 2$ şeklinde tanımlı g ve h fonksiyonları veriliyor.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) f: $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x$ şeklinde tanımlı f doğrusal referans fonksiyonunun grafiğinden yararlanarak g ve h fonksiyonlarının grafiklerini çiziniz.



b) f, g ve h fonksiyonlarının grafiklerinden yararlanarak fonksiyonları temsil eden doğruların eğimlerini bulunuz ve karşılaştırınız.

c) g ve h fonksiyonlarının maksimum ve minimum noktalarını, sıfırlarını, fonksiyonları temsil eden grafiklerin y eksenini kestikleri noktaları bulunuz.

ç) g ve h fonksiyonlarının artan veya azalan olduğu aralıkları belirleyiniz.

d) g ve h fonksiyonlarının bire bir olup olmadıklarını inceleyiniz.

3. ÖRNEK

Aynı yerde bulunan iki araçtan biri olan B aracı, A aracı hareket ettikten bir süre sonra hareket etmiştir. Sabit hızla hareket eden A ve B araçlarının zamana (sa.) bağlı olarak aldıkları mesafeyi (km) gösteren, uygun aralıkta tanımlı f ve g fonksiyonlarının cebirsel temsilleri sırasıyla $f(x) = 70x$ ve $g(x) = 130x - 260$ şeklindedir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) f ve g fonksiyonlarının grafiklerini matematik yazılımı yardımıyla çiziniz.

b) f ve g fonksiyonlarını temsil eden doğruların eğimlerini bularak karşılaştırınız. Vardığınız sonuçtan yararlanarak A ve B araçlarının hızları ile ilgili ne söylenebileceğini fonksiyonların grafik temsillerini de dikkate alarak yorumlayınız.


c) Grafiklerden yararlanarak A ve B araçlarının hangi saatler arasında yan yana geldiğini tahmin ediniz. Tahmininizin doğruluğunu matematik yazılımı yardımıyla kontrol ediniz.

ç) f ve g fonksiyonlarının sıfırlarını cebirsel temsillerinden yararlanarak tahmin ediniz. f ve g fonksiyonlarının sıfırlarını matematik yazılımı yardımıyla belirleyerek bu noktaların araçların hareketi ile ilgili ne ifade ettiğini yorumlayınız.

d) A aracı hareket ettikten 6 saat sonra araçların aldıkları mesafeleri karşılaştırınız, hangi aracın daha fazla yol aldığını bulunuz.

Çözüm

a) Bilgisayar veya etkileşimli tahtada matematik yazılımı açılarak **Giriş** bölümüne $\mathbf{f(x) = 70x}$ yazılır ve **Enter** tuşuna basılır. Ardından **Giriş** bölümüne $\mathbf{g(x) = 130x - 260}$ yazılır ve **Enter** tuşuna basılır. Ekranda sırasıyla f ve g fonksiyonlarını temsil eden doğruların grafikleri çizilecektir (Görsel 1).




Görsel 1

b) B aracına ait g fonksiyonunu temsil eden grafiğin eğimi 130, A aracına ait f fonksiyonunu temsil eden grafiğin eğimi 70'tir. B aracına ait doğrunun eğimi daha büyüktür. Buradan B aracının A aracından daha hızlı olduğu söylenebilir.

c) Görsel 1 incelendiğinde f ve g fonksiyonlarının temsil ettiği doğruların kesişim noktasının apsis değerinin 4 ile 5 arasında bir değer aldığı görülür. Buradan A ve B araçları, 4 ile 5. saatler arasındaki bir zamanda yan yana gelir.

ç) f ve g fonksiyonlarının grafikleri matematik yazılımı ile çizildikten sonra **Kesiştir** aracı seçilip sırasıyla f doğrusu ve x ekseni işaretlenir. f fonksiyonunu temsil eden doğrunun x eksenini $A(0, 0)$ noktasında kestiği görülür. Benzer şekilde **Kesiştir** aracı seçilip sırasıyla g doğrusu ve x ekseni işaretlenir. g fonksiyonunu temsil eden doğrunun x eksenini $B(2, 0)$ noktasında kestiği görülür (Görsel 2).

Bu durum, B aracının A aracından 2 saat sonra yola çıktığı anlamına gelmektedir.



Görsel 2

d) f ve g fonksiyonlarında $x = 6$ için $f(6) = 70 \cdot 6 = 420$

$$\begin{aligned} g(6) &= 130 \cdot 6 - 260 \\ &= 780 - 260 \\ &= 520 \text{ olur.} \end{aligned}$$

Buradan 6. saatin sonunda A aracının 420 km, B aracının 520 km yol aldığı görülür. 6. saatin sonunda B aracı, A aracından 100 km daha fazla yol almıştır.

Konu ile ilgili çalışma kâğıdına ulaşmak için karekodu okutunuz.


2. Sıra Sizde

Bir ofiste çalışanlar, sıfır atık projesine destek vermek amacıyla plastik şişe kullanımının önüne geçmek için iki farklı musluğa su arıtma cihazı taktırmıştır. Su arıtma cihazlarından birim zamanda elde edilen su miktarları sabittir. Birinci musluktan dakikada 1 litre, ikinci musluktan dakikada 2 litre arıtılmış su akmaktadır.

Birinci musluk açılarak 19 litrelik bir kaba su doldurulmaya başlanmıştır. İkinci musluk açılarak aynı hacimde ve başlangıçta içinde 2 litre su bulunan başka bir kaba su doldurulmaya başlanmıştır.

1 ve 2. muslukların doldurduğu kaplardaki su miktarları sırasıyla f ve g fonksiyonlarıyla modellensin.

a) f ve g fonksiyonlarının grafiklerini çiziniz.



b) Gerçek sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonlarının cebirsel temsillerini oluşturunuz.

c) 2. musluğun doldurduğu kapta başlangıçta 2 litre su bulunmasının g fonksiyonuna etkisinin ne olduğunu fonksiyonların grafik ve cebirsel temsillerinden yararlanarak açıklayınız.

ç) f ve g fonksiyonlarının grafiklerinin eğimleri göz önüne alınırsa hangi kap daha çabuk dolar? Bu durum, fonksiyonların grafik ve cebirsel temsillerini nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.

d) f ve g fonksiyonlarının grafiklerinin y eksenini kestiği noktaları ve varsa sıfırlarını bulunuz. Bulduğunuz değerler zamana (dk.) bağlı kaplardaki su miktarı (l) ile ilişkilendirildiğinde ne ifade etmektedir? Açıklayınız.


4. Uygulama

Gerçek Sayılarda $k \in \mathbb{R}$ Olmak Üzere $g(x) = k$ Şeklinde Tanımlı Doğrusal Fonksiyonların İncelenmesi

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aşağıda dik koordinat sistemi üzerinde gerçek sayılarda $g(x) = -1$ ve $h(x) = \frac{5}{2}$ şeklinde tanımlı g ve h doğrusal fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.

Buna göre gerçek sayılarda $m(x) = \sqrt{2}$ ve $n(x) = -2$ şeklinde tanımlı m ve n doğrusal fonksiyonlarının grafiklerini aynı dik koordinat sistemi üzerinde çiziniz.



2. Gerçek sayılarda tanımlı g, h, m ve n doğrusal fonksiyonlarına ait grafiklerin eğimleri ile ilgili ne söylenebilir?


3. Gerçek sayılarda tanımlı g, h, m ve n doğrusal fonksiyonlarının nitel özellikleri ile ilgili neler söylenebilir?

$g: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = a \cdot f(x \pm r) \pm k$ ve $r, k \in \mathbb{R}$ olmak üzere $a = 0$ için $g(x) = k$ şeklinde tanımlı g fonksiyonuna **sabit fonksiyon** denir. Sabit fonksiyon da bir doğrusal fonksiyondur.

3. Sıra Sizde

$a \in \mathbb{R}$ olmak üzere $g: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = (a-4)x + \frac{a}{2}$ şeklinde tanımlı g fonksiyonu sabit fonksiyondur.

g doğrusal fonksiyonunun grafiğini çizerek nitel özelliklerini yorumlayınız.



Performans Görevi

Yakıt Tasarrufu

Bu görevde sizden üç farklı otomobil markasına ait birer araç belirlemeniz, araçların şehir içinde harcadığı ortalama yakıt miktarlarını bularak tablo ile ifade etmeniz, elde ettiğiniz verilerden yararlanarak bu üç aracın yolculuğa dolu bir depo ile başlayıp sabit hızla hareket ettikleri varsayıldığında aldıkları mesafeye (km) bağlı depolarında kalan yakıt miktarlarını (l) gösteren fonksiyonların cebirsel ifadesini yazmanız, cebirsel ifadesini yazdığınız fonksiyonların grafiklerini çizmeniz, elde ettiğiniz tablo ve grafikleri sınıfta sunarak hangi aracın şehir içinde daha ekonomik olduğunu açıklamanız istenmektedir.

Göreve başlamadan önce aşağıdaki hususa dikkat ediniz.

- Çalışmanın yapılış basamaklarını belirleyiniz.

Görev esnasında aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

- Belirlediğiniz araç markalarının şehir içi yakıt tüketim miktarlarını not ediniz.
- Belirlediğiniz araçların aldıkları mesafeye (km) bağlı depolarında kalan yakıt miktarlarını litre cinsinden ifade ediniz.
- Belirlediğiniz araçların aldıkları mesafeye (km) bağlı depolarında kalan yakıt miktarını (l) gösteren tabloyu oluşturunuz.
- Araçların aldıkları mesafeye bağlı (km) depolarında kalan yakıt miktarını (l) gösteren fonksiyonların cebirsel ifadelerini yazınız.
- Cebirsel olarak ifade ettiğiniz fonksiyonların grafiklerini aynı dik koordinat sisteminde $f(x) = x$ şeklinde tanımlı f doğrusal referans fonksiyonuna dönüşümler uygulayarak çiziniz.
- f doğrusal referans fonksiyonuna uyguladığınız her dönüşümden sonra cebirsel ifadesinde nasıl bir değişim olduğunu açıklayınız. Araçların aldıkları mesafeye (km) bağlı depolarında kalan yakıt miktarını (l) gösteren cebirsel temsil veya grafik temsillerine göre hangi aracın daha ekonomik olduğunu söyleyebilirsiniz? Açıklayınız.
- Yakıt tüketimi açısından ekonomik olan araçları tercih etmenin faydaları neler olabilir? Sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

Görev bitiminde aşağıdaki hususa dikkat ediniz.

- Sınıf içinde oluşturduğunuz tablo ve grafikleri arkadaşlarınıza sunarak paylaşınız.

Performans göreviniz analitik dereceli puanlama anahtarı ile öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir.

Analitik dereceli puanlama anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.


5. Uygulama

Fonksiyonların Parçalı Gösterimi

Verilen bilgileri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Aşağıda bir miktar buzun ısıtılarak buhar hâline getirilmesine ait, zamana (dk.) bağlı sıcaklığı (^{o}C) ifade eden f fonksiyonunun elektronik tablo yardımıyla elde edilen grafik temsili verilmiştir.

Zaman (dk.) t	Sıcaklık (^{o}C) f(t)
0	−20
1	−16
2	−12
⋮	⋮
5	0
6	0
7	0
⋮	⋮
20	0
21	5
22	10
⋮	⋮
40	100
41	100
42	100
⋮	⋮
60	100
61	101
62	102
⋮	⋮
80	120



1. f fonksiyonunun tablo ve grafik temsilinden yararlanarak cebirsel gösterimini nasıl elde edebilirsiniz? f fonksiyonu tek bir cebirsel temsille ifade edilebilir mi? Açıklayınız.

2. f fonksiyonunun tablo temsili yardımıyla suyun her bir hâl değişim evresinde dakika başına sıcaklıktaki değişim miktarlarını hesaplayınız. Grafik temsilinden yararlanarak zaman ve sıcaklık aralıklarını elde ediniz ve tabloyu örnekteki gibi doldurunuz.

Suyun Hâli	Dakika Başına Sıcaklıktaki (^{o}C) Değişim Miktarı	Zaman (dk.) Aralığı	Sıcaklık (^{o}C) Aralığı	Suyun Hâl Değişimini Temsil Eden Fonksiyonun Cebirsel Temsili
Buz	4	[0, 5)	[−20, 0)	$f(t) = 4(t - 5)$
Buz ve Su				
Su				
Su ve Buhar				
Buhar				

3. Elde ettiğiniz fonksiyonlar yardımıyla f fonksiyonunun tanım ve görüntü kümelerini bularak cebirsel temsillerle ifade ediniz. Oluşturduğunuz temsilleri f fonksiyonunun grafik temsili üzerinde gösteriniz.

Tanım kümesi: .....

Görüntü kümesi: .....

$$f(t) = \begin{cases} 4(t-5),\ 0 \le t < 5 \\ \text{.....} \\ \text{.....} \\ \text{.....} \\ \text{.....} \end{cases}$$


4. Parçalı gösterimli fonksiyonların cebirsel temsillerinin nasıl oluşturulabileceğini açıklayınız.

5. Parçalı gösterimli fonksiyonların hangi problem durumlarında ve nasıl kullanılabileceğini açıklayınız.

4. ÖRNEK

Bir genel ağ servis sağlayıcısının uyguladığı ücret tarifesi, kullanılan ilk 100 GB (cigabayt) veri için aylık 200 Türk lirası sabit ücret ve her 1 GB fazladan veri için 0,5 Türk lirası olarak düzenlenmiştir. Kullanılan veri miktarına (GB) bağlı aylık ücret (TL), aşağıda elektronik tablo ve fonksiyon grafiğiyle gösterilmiştir.

Kullanılan Veri Miktarı (GB)	Aylık Ücret (TL)
0	200
10	200
20	200
30	200
40	200
50	200
60	200
70	200
80	200
90	200
100	200
110	205
120	210
130	215
140	220
150	225
160	230
170	235
180	240
190	245



Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Fonksiyonun tablo ve grafik temsilini inceleyiniz. Kullanılan veri miktarı hangi değeri geçtiğinde fonksiyonun değişim gösterdiğini bulunuz.

b) Fonksiyonun hangi tanım aralıklarında kaç farklı cebirsel temsil ile ifade edilebileceğini açıklayınız.

c) Kullanılan veri miktarına (GB) bağlı olarak aylık ücreti (TL) veren fonksiyonun cebirsel temsilini parçalı gösterimli fonksiyon şeklinde ifade ediniz. Grafik üzerinde gösteriniz.

Çözüm

a) Tablo ve grafik temsiline göre kullanılan veri miktarı 100 GB'ı geçtiğinde fonksiyon, değişim göstermiştir.

b) Kullanılan veri miktarına (GB) bağlı olarak aylık ücreti (TL) ifade eden fonksiyon f olsun. Kullanılan veri miktarı 100 GB'ı geçtiğinde fonksiyon değişim gösterdiğinden f fonksiyonu, $[0,100]$ ve $(100,\infty)$'nda iki farklı cebirsel temsil ile ifade edilmelidir.


c) Tanım kümeleri $[0,100]$ ve $(100,\infty)$ olan fonksiyonlar sırasıyla g ve h olsun. $[0,100]$'nda aylık sabit ücret 200 Türk lirası olduğundan $g(x) = 200$ olur.

100 GB'ın üzerindeki kullanımlarda fazladan kullanılan verinin ücreti $0{,}5 \cdot (x - 100)$ Türk lirası olur. Bu durumda $h(x) = 200 + 0{,}5 \cdot (x - 100)$ bulunur.


Buradan f fonksiyonu, aşağıdaki gibi ifade edilir.

$$f:[0,\infty)\longrightarrow[200,\infty),\ f(x)=\begin{cases}200, & 0\le x\le 100\\ 200+0{,}5\cdot(x-100), & 100<x\end{cases}$$

- $200,\ 0\le x\le 100$: Sabit ücret için kullanılan veri miktarının alabileceği değerlerin kümesi
- 200: 100 GB veri için sabit ücret
- $0{,}5$: Her 1 GB fazladan veri için 0,5 TL
- $(x-100)$: Fazladan kullanılan veri miktarı
- $100<x$: Fazladan kullanılan veri miktarının alabileceği değerlerin kümesi



4. Sıra Sizde



Deposunda 200 ton buğday bulunan bir un fabrikası toplam 1800 ton buğdaya ulaştığında un üretmeye başlayacaktır. Fabrika bünyesinde çalışan mühendis Mehmet Bey, buğday alımı yaparak 12. günün sonunda hedeflediği buğday miktarına ulaşmayı ve üretime başlamayı planlamıştır. Mehmet Bey, zamana bağlı (gün) depodaki buğday miktarını (ton) gösteren f fonksiyonunun grafiğini yandaki gibi oluşturmuştur.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) f fonksiyonunun grafik temsilini inceleyiniz. Fonksiyon tek bir cebirsel gösterim ile ifade edilebilir mi? Açıklayınız.

b) f fonksiyonunun grafik temsili yardımıyla gün başına depodaki buğday miktarını hesaplayınız.

c) f fonksiyonunun cebirsel temsilini parçalı gösterimli fonksiyon biçiminde ifade ediniz. Grafik üzerinde gösteriniz.

Kontrol Noktası

a, b $\in \mathbb{R}$ ve a $\neq 0$ olmak üzere gerçek sayılarda g(x) = ax + b şeklinde tanımlı doğrusal fonksiyonların grafikleri çizilirken aşağıdaki adımlar izlenir.

f: $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, f(x) = x olsun.

- m(x) = ax şeklinde tanımlı m fonksiyonunun grafiği f fonksiyonunun tanım aralığındaki her elemanı a katı ile eşleyecek şekilde çizilir.
- g: $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, g(x) = ax + b şeklinde tanımlı fonksiyonun grafiği çizilirken

  b $\in \mathbb{R}^+$ ise m fonksiyonunun grafiği y ekseni boyunca pozitif yönde b birim ötelenir.

  b $\in \mathbb{R}^-$ ise m fonksiyonunun grafiği y ekseni boyunca negatif yönde |b| birim ötelenir.

a, b $\in \mathbb{R}$ ve a $\neq 0$ olmak üzere g: $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, g(x) = ax + b şeklinde tanımlı g doğrusal fonksiyonu için aşağıdaki sonuçlara varılır.

- a > 0 ise g fonksiyonunu temsil eden doğrunun eğimi pozitiftir.
- a < 0 ise g fonksiyonunu temsil eden doğrunun eğimi negatiftir.
- g fonksiyonunun en geniş tanım ve görüntü kümesi, gerçek sayılardır.
- n $\in \mathbb{R}$ olmak üzere g fonksiyonunun sıfırı n olsun $\big(g(n) = 0\big)$.
- a > 0 veya a < 0 olmak üzere f fonksiyonunun işaret incelemesi aşağıdaki gibi iki farklı şekilde yapılabilir.

a > 0 için

x	$-\infty$		n		∞
g(x)		−	0	+	

veya

a < 0 için

x	$-\infty$		n		∞
g(x)		+	0	−	

g fonksiyonunun işareti a > 0 için (n, ∞) nda pozitif, $(-\infty, n)$ nda negatif;

a < 0 için $(-\infty, n)$ nda pozitif, (n, ∞) nda negatiftir.

- a = 0 ise g(x) = b biçimindeki g sabit fonksiyonu elde edilir.
- a $\neq 0$ olduğunda g fonksiyonu bire birdir.
- a > 0 için g fonksiyonu artandır.
- a < 0 için g fonksiyonu azalandır.
- g fonksiyonunun maksimum ve minimum noktası yoktur.

Alıştırmalar

1. Aşağıda cebirsel gösterimi verilen, gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonların grafiklerini $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x$ şeklinde tanımlı f doğrusal referans fonksiyonunun grafiğine uygun dönüşümleri yaparak çiziniz.

a) $g(x) = -x$

b) $h(x) = 3x - 4$

c) $m(x) = 2x - \frac{2}{3}$

ç) $n(x) = -4x - \frac{11}{5}$

2. Bir basınç birimi olan psi, araç lastik basınçlarının ölçümünde sıklıkla kullanılmaktadır. Arzu Hanım, aracının lastiğini 32 psi basıncı seçerek şişirmiştir. Sonrasında lastik basıncının her gün 2 psi düştüğünü fark etmiştir. Basıncı 32 psi'den 14 psi'ye düşene kadar lastiğe müdahale etmemiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Zamana (gün) bağlı lastik basıncını (psi) ifade eden doğrusal fonksiyonun tanım ve görüntü kümelerini bularak cebirsel gösterimini yazınız.

b) Cebirsel gösterimini yazdığınız fonksiyonun grafiğini $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x$ şeklinde tanımlı f doğrusal referans fonksiyonunun grafiğine uygun dönüşümleri yaparak çiziniz.

3. Okul çantası üreten bir şirketin günlük sabit üretim maliyeti 40 000 Türk lirası, her bir okul çantasını üretme maliyeti ise 120 Türk lirasıdır. x adet okul çantası üretildiğinde günlük toplam maliyet, $[0, 50]$'nda tanımlı m doğrusal fonksiyonu ile ifade ediliyor.

Buna göre m fonksiyonunu cebirsel ve grafik temsiliyle ifade ediniz.

4. 20 cm boyundaki iki mum aynı anda yakılıyor. Mumlardan biri 6 saatte, diğeri 8 saatte tamamen eriyor.

Zamana (sa.) bağlı mumların boyunu (cm) veren f ve g doğrusal fonksiyonlarına göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) f ve g fonksiyonlarının cebirsel temsillerini oluşturunuz.

b) f ve g fonksiyonlarının grafik temsillerini aynı dik koordinat sisteminde gösteriniz.


c) Fonksiyonların eğimlerini bularak bağlamdaki anlamlarını açıklayınız.

ç) Fonksiyonların eksenleri kestiği noktaları bularak bağlamdaki anlamlarını açıklayınız.

5. m: $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $m(x) = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{3}$ ve n: $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $n(x) = 6x$ şeklinde tanımlı doğrusal fonksiyonlar veriliyor.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) f: $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x$ şeklinde tanımlı f doğrusal referans fonksiyonunun grafiğinden yararlanarak m ve n fonksiyonlarının grafiklerini aşağıda verilen dik koordinat sisteminde çiziniz.



b) Çizdiğiniz grafiklerden yararlanarak m ve n fonksiyonlarını temsil eden doğruların eğimini bulunuz. Bulduğunuz eğim değerlerini f fonksiyonuna ait grafiğin eğimi ile karşılaştırınız.

c) m ve n fonksiyonlarının grafiklerinin f doğrusal referans fonksiyonunun grafiğine hangi dönüşümler uygulanarak çizildiğini bulunuz.

ç) m ve n fonksiyonlarının varsa sıfırını, fonksiyonları temsil eden grafiklerin y eksenini kestikleri noktaları, maksimum ve minimum değerlerini bulunuz.

d) Fonksiyonların artanlık ve azalanlık durumlarını inceleyiniz.

e) Fonksiyonların bire bir olup olmadıklarını belirleyiniz.

f) Fonksiyonların artanlığı-azalanlığı ve bire birliği ile ilgili ulaştığınız sonuçları bire birlik ve artanlık-azalanlık tanımlarından yararlanarak cebirsel olarak doğrulayınız.

6. Bir çözeltide bulunan madde miktarının kütlesinin çözeltinin toplam kütlesine oranına derişim denir. Bir ilaç, vücutta belirli bir süre boyunca etkili olup zamanla derişimini kaybetmektedir. Zamana (dk.) bağlı olarak ilacın vücuttaki derişim miktarını (mol/kg) modelleyen fonksiyon $f:[0, 40] \to [0, 8]$, $f(x) = -0{,}2x + 8$ şeklindedir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) f fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

b) İlacın vücuttaki derişim miktarının (mol/kg) zamana (dk.) bağlı olarak nasıl değiştiğini f fonksiyonunun grafiği yardımıyla açıklayınız.

c) Vücuttaki derişim miktarı sıfıra eşit olduğunda ilacın etkisi tamamen kaybolmaktadır.

İlacın etkisinin tamamen kaybolması için gereken zamanın kaç dakika olduğunu bulunuz.

7. f doğrusal fonksiyonu ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.

- f fonksiyonunu temsil eden doğrunun grafiği y ekseni boyunca pozitif yönde 5 birim ötelendiğinde oluşan grafiği temsil eden fonksiyon g olsun. g fonksiyonunun cebirsel temsili $g(x) = ax + 3$ olarak ifade ediliyor $(a \in \mathbb{R})$.
- f fonksiyonunun sıfırının -3 olduğu biliniyor.
- f fonksiyonunun maksimum değeri 2, minimum değeri -4'tür.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.


a) f fonksiyonunun cebirsel temsilini bulunuz.

b) f fonksiyonunun grafik temsilini çiziniz.

c) f fonksiyonunun artan ya da azalanlığını inceleyiniz.

ç) f fonksiyonunun işaretini inceleyiniz.

8. Aşağıda bir hava aracının kalkış, seyir ve iniş süreçlerinde zamana (sn.) bağlı olarak yerden yüksekliğini (m) ifade eden f, g ve h doğrusal fonksiyonlarının grafik temsili verilmiştir.



Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Hava aracının yüksekliğindeki değişimin zamandaki değişime oranlarını kalkış, seyir ve iniş süreçleri için ayrı ayrı hesaplayınız.

b) İniş sürecinin kalkış sürecine göre daha uzun sürmesi f ve h fonksiyonlarının hangi nitel özellikleri ile açıklanabilir?

Konu ile ilgili daha fazla soru çözmek için karekodu okutunuz.

Konu ile ilgili etkileşimli içeriğe ulaşmak için karekodu okutunuz.

Konu ile ilgili çalışma kâğıdına ulaşmak için karekodu okutunuz.

2.2. GERÇEK SAYILARDA TANIMLI MUTLAK DEĞER FONKSİYONLARI VE NİTEL ÖZELLİKLERİ

Konuya Başlarken



Yüksek yapılarda bulunan evlere eşya taşımak veya evlerden eşya almak için yük asansörleri kullanılmaktadır. Görseldeki gibi yerden yaklaşık 30 metre yüksekliğe kurulan, sabit hızla aşağı ve yukarı yönde hareket eden bir yük asansörünün eşyayı evin balkonundan alıp aşağıya indirmesi 10 saniye sürmektedir.

Yük asansörünün zamana bağlı hareketine dair aşağıdaki sorularla ilgili fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. Yük asansörü aşağıdan harekete başlayıp, 30 metre yükseklikteki balkondan eşya alıp tekrar başladığı noktaya dönüyor. Yük asansörünün zamana bağlı yerden yüksekliği grafik temsili ile nasıl gösterilebilir? (Asansörün eşyayı yüklediği süreyi ihmal ediniz.)
2. Oluşturulan grafik temsili hangi tür fonksiyonların cebirsel temsili ile ifade edilebilir?
3. Yük asansörünün zamana bağlı yerden yüksekliği sadece bir cebirsel ifade ile gösterilebilir mi?


Bir sayının başlangıç noktasına olan uzaklığı mutlak değer kavramıyla ifade edilmektedir. Mutlak değer kavramının farklı kullanım alanları bulunmaktadır. Örneğin iki farklı niceliğin birbirine bağlı olarak değişimini içeren bazı gerçek yaşam durumu problemlerine çözüm üretirken mutlak değer fonksiyonlarından yararlanılır.

6. Uygulama

Gerçek Sayılarda $g(x) = \pm|x|$ Şeklinde Tanımlı Mutlak Değer Fonksiyonlarının Nitel Özellikleri

Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdaki görselde deniz seviyesinin altında ve üstünde yer alan A, B, C, D, E noktaları ile deniz seviyesine dik olarak modellenen bir k doğrusu verilmiştir.



a) Görselde verilen noktaların k doğrusunda karşılık geldiği sayı değerleri ile deniz seviyesine olan uzaklıklarını gösteren Tablo 1'i örnekteki gibi doldurunuz.


Tablo 1

Nokta	A	B	C	D	E
Noktanın Konumunun k Doğrusunda Karşılık Geldiği Sayı	−2				
Noktanın Deniz Seviyesine Olan Uzaklığı (birim)	2				


b) Noktanın konumunun k doğrusunda karşılık geldiği sayılar bağımsız değişken, aynı noktanın deniz seviyesine olan mesafesi bağımlı değişken olsun. Tablo 1'deki değerlerden yararlanarak görsel üzerinde alınan herhangi bir x değerine karşılık gelen bağımlı değişkenlerin cebirsel temsilini yazınız.

c) Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki bu ilişkiyi gerçek sayılarda tanımlı g fonksiyonu olarak ifade ediniz.

ç) Grafik 1 ve elde ettiğiniz sonuçlardan yararlanarak gerçek sayılarda $g(x) = |x|$ şeklinde tanımlı fonksiyonun grafiğini Grafik 2 üzerinde gösteriniz.



Grafik 1



Grafik 2

2. Oluşturduğunuz g fonksiyonuna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Bağımsız değişkenin hangi değeri için bağımlı değişkenin sıfıra eşit olduğunu bulunuz.

b) Bağımsız değişkenin hangi aralıktaki değerleri için bağımlı değişkenin aldığı değerlerin negatif veya pozitif olduğunu bulunuz.

c) Bağımlı değişkenin alabileceği en büyük veya en küçük değerin kaç olduğunu bulunuz.

ç) Bağımsız değişkenin aldığı değerler artarken g fonksiyonunun aldığı değerlerin nasıl değiştiğini belirleyiniz.

d) Bağımsız değişkenin aldığı iki farklı değer için g fonksiyonunun aldığı değerler birbirinden farklı mıdır? Bu durumun bağımsız değişkenin alabileceği tüm değerler için geçerli olup olmadığını açıklayınız.

e) f ve g fonksiyonlarının cebirsel ve grafiksel benzerliklerini, farklılıklarını gözlemleyiniz.

f) Gözlemlerinizden yola çıkarak g fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit ediniz ve Tablo 2'yi doldurunuz.

Tablo 2

Fonksiyonun Nitel Özellikleri	f(x) = x	g(x) = |x|
En Geniş Tanım Kümesi		
Görüntü Kümesi		
Fonksiyonun Sıfırı		
Fonksiyonun İşareti		
Maksimum Noktası		
Minimum Noktası		
Bire Birliği		
Artan veya Azalan Olduğu Aralıklar		

g) Elde ettiğiniz nitel özelliklerden yararlanarak g mutlak değer fonksiyonunun parçalı gösterimine dair çıkarımlarınızı açıklayınız.

3. $g: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = |x|$ şeklinde tanımlı fonksiyonda mutlak değerin katsayısı değiştirilerek gerçek sayılarda $h(x) = -|x|$ şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonu oluşturuluyor. h fonksiyonuna göre

a) Bağımsız değişkenin hangi değeri için bağımlı değişkenin sıfıra eşit olduğunu bulunuz.


b) Bağımsız değişkenin hangi aralıktaki değerleri için bağımlı değişkenin aldığı değerlerin negatif veya pozitif olduğunu bulunuz.

c) Bağımlı değişkenin alabileceği en büyük veya en küçük değerin kaç olduğunu bulunuz.

ç) Bağımsız değişkenin aldığı değerler artarken h fonksiyonunun aldığı değerlerin nasıl değiştiğini belirleyiniz.

d) Bağımsız değişkenin aldığı iki farklı değer için h fonksiyonunun aldığı değerler birbirinden farklı mıdır? Bu durumun bağımsız değişkenin alabileceği tüm değerler için geçerli olup olmadığını açıklayınız.

e) Grafik 1 ve elde ettiğiniz sonuçlardan yararlanarak gerçek sayılarda $h(x) = -|x|$ şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun grafiğini Grafik 3 üzerinde gösteriniz.



Grafik 3

f) f ve h fonksiyonlarının cebirsel ve grafiksel benzerliklerini, farklılıklarını gözlemleyiniz.

g) Gözlemlerinizden yola çıkarak h fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit ediniz ve Tablo 3'ü doldurunuz.

Tablo 3

Fonksiyonun Nitel Özellikleri	f(x) = x	h(x) = −|x|
En Geniş Tanım Kümesi		
Görüntü Kümesi		
Fonksiyonun Sıfırı		
Fonksiyonun İşareti		
Maksimum Noktası		
Minimum Noktası		
Bire Birliği		
Artan veya Azalan Olduğu Aralıklar		


ğ) Elde ettiğiniz nitel özelliklerden yararlanarak h mutlak değer fonksiyonunun parçalı gösterimine dair çıkarımlarınızı açıklayınız.

Matematik yazılımı ile ilgili videoya ulaşmak için karekodu okutunuz.


Kontrol Noktası

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = x$ şeklinde tanımlı f fonksiyonunun işareti $x < 0$ için negatif, $x > 0$ için pozitiftir. $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, g(x) = |x|$ şeklinde tanımlı g fonksiyonunun işareti $x < 0$ ve $x > 0$ için pozitif, $h: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, h(x) = -|x|$ şeklinde tanımlı h fonksiyonunun işareti $x < 0$ ve $x > 0$ için negatiftir. Buradan f fonksiyonunun işaret tablosundan yararlanılarak g ve h fonksiyonlarının işaret tablosu aşağıdaki gibi oluşturulur.

x	$-\infty$		0		∞
f(x) = x		−	0	+	
g(x) = |x|		+	0	+	
h(x) = −|x|		−	0	−	



Grafik 2.3: *g fonksiyonunun grafik temsili*



Grafik 2.4: *h fonksiyonunun grafik temsili*

Grafik 2.3 ve 2.4 incelendiğinde g ve h fonksiyonlarının parçalı gösterimli fonksiyonlar olduğu görülür. Buradan g ve h fonksiyonları iki farklı cebirsel temsil kullanılarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

$$g(x) = \begin{cases} -x, & x < 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases} \qquad h(x) = \begin{cases} x, & x < 0 \\ -x, & x \geq 0 \end{cases}$$

7. Uygulama

Gerçek Sayılarda $g(x) = \pm|ax + b|$ Şeklinde Tanımlı Mutlak Değer Fonksiyonlarının Cebirsel ve Grafiksel Temsili

Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre sağlıklı bir bireyin vücut sıcaklığı için ortalama değer 36,5 ^{o}C olup vücut sıcaklığı, 35,7 ^{o}C ile 37,5 ^{o}C arasında değerler alabilmektedir.

Aşağıdaki tabloda sağlıklı bir bireyin gün boyunca farklı zamanlarda ölçülen vücut sıcaklığı değerleri ve ölçülen vücut sıcaklığı değerlerinin ortalamadan sapma miktarları verilmiştir.


Ölçülen Vücut Sıcaklığı (^{o}C)	Ölçülen Vücut Sıcaklığının Ortalama Sıcaklıktan Sapma Miktarı (^{o}C)
36,2	$\lvert 36,2 - 36,5\rvert = \lvert -0,3\rvert = 0,3$
36,4	$\lvert 36,4 - 36,5\rvert = \lvert -0,1\rvert = 0,1$
37	$\lvert 37 - 36,5\rvert = \lvert 0,5\rvert = 0,5$
36,8	$\lvert 36,8 - 36,5\rvert = \lvert 0,3\rvert = 0,3$
36,5	$\lvert 36,5 - 36,5\rvert = \lvert 0\rvert = 0$

1. a) Ölçülen vücut sıcaklığına bağlı ortalamadan sapma miktarının bağımlı ve bağımsız değişkenlerini sözel olarak ifade ediniz.


b) Bağımlı ve bağımsız değişkenler hangi değerleri alabilir? Aralık şeklinde ifade ediniz.

c) Sağlıklı bir bireyin vücut sıcaklığına bağlı (x) ortalamadan sapma miktarını ifade eden g fonksiyonunun cebirsel temsilini yazınız.

ç) Elde ettiğiniz sonuçlardan yararlanarak g fonksiyonunun grafiğini çiziniz.



2. g fonksiyonunun cebirsel temsilinin -1 ile çarpılmasıyla elde edilen fonksiyon h olsun. Gerçek sayılarda tanımlı h fonksiyonunun cebirsel temsilini yazarak grafiğini çiziniz.




8. Uygulama


Gerçek Sayılarda $g(x) = \pm|ax + b|$ Şeklinde Tanımlı Mutlak Değer Fonksiyonlarının Nitel Özellikleri

Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.


$a, b \in \mathbb{R}^+$ olmak üzere gerçek sayılarda $f(x) = ax + b$, $g(x) = |ax + b|$ ve $h(x) = -|ax + b|$ şeklinde tanımlı fonksiyonların grafik temsilleri verilmiştir (Grafik 1, Grafik 2 ve Grafik 3).



Grafik 1



Grafik 2



Grafik 3

1. a) f ve g fonksiyonlarının cebirsel ve grafiksel benzerliklerini, farklılıklarını gözlemleyiniz.

b) f ve h fonksiyonlarının cebirsel ve grafiksel benzerliklerini, farklılıklarını gözlemleyiniz.

2. Gözlemlerinizden yola çıkarak f, g ve h fonksiyonlarının nitel özelliklerini tespit ediniz. Tabloyu doldurunuz.

Fonksiyonun Nitel Özellikleri	$f(x) = ax + b$	$g(x) = \lvert ax + b \rvert$	$h(x) = -\lvert ax + b \rvert$
En Geniş Tanım Kümesi			
Görüntü Kümesi			
Fonksiyonun Sıfırı			
Fonksiyonun İşareti			
Maksimum Noktası			
Minimum Noktası			
Bire Birliği			
Artan veya Azalan Olduğu Aralıklar			

3. Elde ettiğiniz nitel özelliklerden yararlanarak g ve h mutlak değer fonksiyonlarının parçalı gösterimine dair çıkarımlarınızı açıklayınız.

5. ÖRNEK

Bir bölgede nisan ayına ait sıcaklık değerleri araştırılmış ve aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır. Farklı günlerde sıcaklık ölçümü yapılarak tablodaki veriler elde edilmiştir.

- Aylık ortalama sıcaklık 20 °C'tur.
- Ölçülen sıcaklığın ortalama sıcaklıktan sapma miktarı en fazla 4 °C'tur.

Günler	Ölçülen Sıcaklık (°C)	Ölçülen Sıcaklıktan Ortalama Sıcaklığın Çıkarılmasıyla Elde Edilen Fark	Sapma Miktarı (°C)
1	16	$16 - 20 = -4$	4
2	18,2	$18{,}2 - 20 = -1{,}8$	1,8
3	19,5	$19{,}5 - 20 = -0{,}5$	0,5
4	20	$20 - 20 = 0$	0
5	21	$21 - 20 = 1$	1
6	21,8	$21{,}8 - 20 = 1{,}8$	1,8
7	23	$23 - 20 = 3$	3
8	24	$24 - 20 = 4$	4

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Ölçülen sıcaklığa (°C) bağlı sapma miktarını (°C) veren fonksiyon g olsun. g fonksiyonunu parçalı gösterimli fonksiyon biçiminde ifade ediniz.

b) Parçalı gösterimden yararlanarak g fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

c) Ölçülen sıcaklık değeri ile ortalama sıcaklık değerinin birbirine eşit olması f fonksiyonunun hangi nitel özelliği ile ilgilidir? Gerekçelerinizle açıklayınız.

ç) Sapma miktarları aynı olan farklı sıcaklık değerleri var mıdır? Oluşturulan fonksiyon yardımıyla açıklayınız.

d) Sapma miktarının en az ve en fazla olduğu anlarda hava sıcaklığının kaç °C ölçüldüğünü bularak bu durumun fonksiyonun hangi nitel özelliği ile ilgili olduğunu açıklayınız.

Çözüm


a) Ölçülen sıcaklık değerleri, g fonksiyonunun tanım kümesini temsil eder. x in alabileceği en küçük değer 20 °C − 4 °C = 16 °C, en büyük değer 20 °C + 4 °C = 24 °C olduğundan fonksiyonun tanım kümesi $[16, 24]$ olur. Sapma miktarının alabileceği değerler, g fonksiyonunun görüntü kümesini temsil eder. Sapma miktarı en fazla 4 °C olduğundan fonksiyonun görüntü kümesi $[0, 4]$ olur. Sapma miktarı, ölçülen ve ortalama sıcaklık değerleri arasındaki farkın mutlak değeri alınarak elde edilmiştir. Buradan g fonksiyonunun cebirsel temsili g: $[16, 24] \longrightarrow [0, 4]$, $g(x) = |x - 20|$ olarak bulunur.

$x \in [16, 20)$ için $g(x) = -x + 20$

$x \in [20, 24]$ için $g(x) = x - 20$ olduğundan g fonksiyonunun parçalı gösterimi aşağıdaki gibi olur.

$$g(x) = \begin{cases} -x + 20, & 16 \leq x < 20 \\ x - 20, & 20 \leq x \leq 24 \end{cases}$$

b) g fonksiyonunun grafiği aşağıdaki gibi çizilir.



c) Ölçülen sıcaklık ve ortalama sıcaklık değerleri aynı olduğunda sapma miktarı $|20 - 20| = 0$ bulunur. $g(x) = 0$ için $x = 20$ olduğundan ölçülen sıcaklık ve ortalama sıcaklık değerlerinin eşit olması fonksiyonun sıfırı ile ilgilidir.

ç) Sıcaklığın 18,2 °C ve 21,8 °C ölçüldüğü günlerde sapma miktarı sırasıyla $|18{,}2 - 20| = |-1{,}8| = 1{,}8$ °C ve $|21{,}8 - 20| = |1{,}8| = 1{,}8$ °C olur.
Ölçülen sıcaklığın farklı değerleri için sapma miktarları aynıdır. Buradan g fonksiyonunun bire bir olmadığı görülür.

d) Sapma miktarının en az ve en fazla olduğu anlarda ölçülen sıcaklık değerleri fonksiyonun maksimum ve minimum noktaları ile ilgilidir.

Grafik incelendiğinde g fonksiyonunun minimum değerinin 0, maksimum değerinin 4 olduğu görülmektedir. Buradan g fonksiyonunun minimum değerini 0, maksimum değerini 16 ve 24 noktalarında aldığı görülmektedir. Fonksiyonun maksimum değerini aldığı noktalar sapma miktarının en fazla olduğu anlarda ölçülen sıcaklık değerini temsil etmektedir.


Gerçek Sayılarda f(x)=±|ax + b|±c Şeklinde Tanımlı Mutlak Değer Fonksiyonlarının Grafikleri

9. Uygulama


Gerçek Sayılarda $f(x) = \pm|ax + b| \pm c\ (a \neq 0)$ Şeklinde Tanımlı Mutlak Değer Fonksiyonlarının Nitel Özellikleri

Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1. a, b, c $\in \mathbb{R}^+$ olmak üzere gerçek sayılarda f(x) = ax + b, g(x) = |ax + b| + c ve h(x) = |ax + b| – c şeklinde tanımlı fonksiyonların grafik temsilleri verilmiştir (Grafik 1, Grafik 2 ve Grafik 3).



Grafik 1



Grafik 2



Grafik 3

a) f, g ve h fonksiyonlarının cebirsel ve grafik gösterimlerini inceleyiniz. f ile g, f ile h fonksiyonları arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları gözlemleyiniz.


b) Gözlemlerinizden yola çıkarak f , g ve h fonksiyonlarının nitel özelliklerini tespit ediniz. Tablo 1'i doldurunuz.

Tablo 1


Fonksiyonun Nitel Özellikleri	f(x) = ax + b	g(x) = |ax + b| + c	h(x) = |ax + b| – c
En Geniş Tanım Kümesi			
Görüntü Kümesi			
Fonksiyonun Sıfırı			
Fonksiyonun İşareti			
Maksimum Noktası			
Minimum Noktası			
Bire Birliği			
Artan veya Azalan Olduğu Aralıklar			

c) Elde ettiğiniz nitel özelliklerden yararlanarak g ve h mutlak değer fonksiyonlarının parçalı gösterimine dair çıkarımlarınızı açıklayınız.


2. a, b, c $\in \mathbb{R}^+$ olmak üzere gerçek sayılarda $f(x) = ax + b$, $k(x) = -|ax + b| + c$ ve $t(x) = -|ax + b| - c$ şeklinde tanımlı fonksiyonların grafik temsilleri verilmiştir (Grafik 4, Grafik 5 ve Grafik 6).



Grafik 4



Grafik 5



Grafik 6

a) f, k ve t fonksiyonlarının cebirsel ve grafik gösterimlerini inceleyiniz. f ile k, f ile t fonksiyonları arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları gözlemleyiniz.

b) Gözlemlerinizden yola çıkarak f, k ve t fonksiyonlarının nitel özelliklerini tespit ediniz. Tablo 2'yi doldurunuz.


Tablo 2

Fonksiyonun Nitel Özellikleri	$f(x) = ax + b$	$k(x) = -\|ax + b\| + c$	$t(x) = -\|ax + b\| - c$
En Geniş Tanım Kümesi			
Görüntü Kümesi			
Fonksiyonun Sıfırı			
Fonksiyonun İşareti			
Maksimum Noktası			
Minimum Noktası			
Bire Birliği			
Artan veya Azalan Olduğu Aralıklar			


c) Elde ettiğiniz nitel özelliklerden yararlanarak k ve t mutlak değer fonksiyonlarının parçalı gösterimine dair çıkarımlarınızı açıklayınız.

Matematik yazılımı ile ilgili videoya ulaşmak için karekodu okutunuz.

Gerçek sayılarda $g(x) = |ax + b|$ ve $h(x) = -|ax + b|$ şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının grafikleri, gerçek sayılarda $f(x) = ax + b$ şeklinde tanımlı doğrusal fonksiyon grafiğinden yararlanılarak çizilebilir. Bunun için önce f fonksiyonunun grafiği çizilir (Grafik 2.5). Ardından f fonksiyonunun grafiği üzerinde f nin işaretinin negatif olduğu kısmın x eksenine göre yansımasının alınmasıyla g fonksiyonunun grafik temsili elde edilir (Grafik 2.6).




Grafik 2.5: *f fonksiyonunun grafik temsili*
(a, b $\in \mathbb{R}^+$)



Grafik 2.6: *g fonksiyonunun grafik temsili*
(a, b $\in \mathbb{R}^+$)


h fonksiyonunun grafiği, g fonksiyonunun grafiğinin x eksenine göre yansımasının alınmasıyla elde edilir (Grafik 2.7).




Grafik 2.7: *h fonksiyonunun grafik temsili*
(a, b ∈ ℝ⁺)

Gerçek sayılarda $t(x) = |ax + b| + c$ ve $r(x) = |ax + b| - c$ $(a, b, c \in \mathbb{R}^+)$ şeklinde tanımlı fonksiyonların grafikleri, gerçek sayılarda $g(x) = |ax + b|$ şeklinde tanımlı fonksiyonların grafiklerinden yararlanılarak çizilebilir.

t fonksiyonunun grafiği, g fonksiyonunun grafiği y ekseni boyunca pozitif yönde c birim ötelenerek elde edilir (Grafik 2.8). r fonksiyonunun grafiği, g fonksiyonunun grafiği y ekseni boyunca negatif yönde c birim ötelenerek elde edilir (Grafik 2.9). Grafik 2.9'da $b < c$ olduğundan r fonksiyonunun grafiğinin y eksenini kestiği noktanın ordinat değeri negatiftir. $b > c$ için r fonksiyonunun grafiğinin y eksenini kestiği noktanın ordinat değerinin pozitif olacağına dikkat ediniz.




Grafik 2.8: *t fonksiyonunun grafik temsili*
(a, b, c ∈ ℝ⁺)




Grafik 2.9: *r fonksiyonunun grafik temsili*
(a, b, c ∈ ℝ⁺)

Gerçek sayılarda $k(x) = -|ax + b| + c$ ve $m(x) = -|ax + b| - c$ $(c \in \mathbb{R}^+)$ şeklinde tanımlı fonksiyonların grafikleri, gerçek sayılarda $h(x) = -|ax + b|$ şeklinde tanımlı fonksiyonların grafiklerinden faydalanılarak çizilebilir.

k fonksiyonunun grafiği, h fonksiyonunun grafiği y ekseni boyunca pozitif yönde c birim ötelenerek elde edilir (Grafik 2.10). m fonksiyonunun grafiği, h fonksiyonunun grafiği y ekseni boyunca negatif yönde c birim ötelenerek elde edilir (Grafik 2.11).



Grafik 2.10: *k fonksiyonunun grafik temsili*
(a, b, c ∈ ℝ⁺)



Grafik 2.11: *m fonksiyonunun grafik temsili*
(a, b, c ∈ ℝ⁺)

6. ÖRNEK

Atatürk Lisesi Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübü öğrencileri bir proje kapsamında sokak hayvanları için gönüllü öğrencilerden kedi ve köpek maması toplamaktadır. Ellerinde x kg mama bulunan öğrencilerin 3 günlük çalışma sonucunda topladıkları mama miktarları ile ilgili bilgiler tabloda verilmiştir.

Günler	Toplanan Mama Miktarı (kg)
1. gün	Ellerinde bulunan mama miktarının 2 katı kadar
2. gün	1. gün toplanan mama miktarının 5 eksiğinin mutlak değeri kadar
3. gün	2. gün toplanan mama miktarının 3 kg fazlası kadar

Başlangıçta toplanan mama miktarının 8 kg'dan az olduğu bilinmektedir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Başlangıçta ellerinde bulunan mama miktarına bağlı 1, 2 ve 3. günler için toplanan mama miktarını veren fonksiyonların cebirsel temsillerini bulunuz.

b) 3. gün için oluşturulan fonksiyonun grafiğini çiziniz.

c) Başlangıçta ellerinde bulunan mama miktarının artmasıyla 3. gün toplanan mama miktarı azalmaktadır. Bu durumun başlangıçta toplanan mama miktarının hangi değerleri için sağlandığını fonksiyonlardan yararlanarak bulunuz.

ç) Başlangıçta ellerinde bulunan mama miktarının alacağı herhangi iki değer için 3. gün toplanan mama miktarının değerlerinin birbirinden farklı olduğu biliniyor. Bu şartı sağlayacak başlangıçta ellerinde bulunan mama miktarı değerlerine ait aralıkların ne olabileceğini bulunuz.

Çözüm

a) 1. gün toplanan mama miktarını veren fonksiyon f olmak üzere

$f: (0, 8) \longrightarrow (0, 16)$, $f(x) = 2x$,


2. gün toplanan mama miktarını veren fonksiyon g olmak üzere

$g: (0, 8) \longrightarrow [0, 11]$, $g(x) = |2x - 5|$,


3. gün toplanan mama miktarını veren fonksiyon h olmak üzere

$h: (0, 8) \longrightarrow [0, 14]$, $h(x) = |2x - 5| + 3$ olarak bulunur.

b) Önce $y = 2x - 5$ fonksiyonunun grafiği çizilir. Grafiğin negatif değer aldığı kısmın, x eksenine göre yansıması alınır (Grafik 1). Ardından y ekseni boyunca pozitif yönde 3 birim ötelenerek $h(x) = |2x - 5| + 3$ fonksiyonunun grafiği, tanım ve görüntü kümesine uygun olarak elde edilir (Grafik 2).



Grafik 1



Grafik 2

c) h fonksiyonunun grafiği incelendiğinde ellerinde bulunan mama miktarı $\left[0, \frac{5}{2}\right]$ nda olduğunda h fonksiyonunun azalan olduğu görülmektedir. Buradan ellerinde bulunan mama miktarının alacağı değerler kümesi $\left[0, \frac{5}{2}\right]$ olarak bulunur.

ç) Ellerinde bulunan mama miktarının alacağı herhangi iki değer için 3. gün toplanan mama miktarının aldığı değerlerin birbirinden farklı olması beklenmektedir. Bu durum, h fonksiyonunun bire bir olması ile mümkündür.

h fonksiyonunun grafiği incelendiğinde x in $\left(\frac{5}{2}, 8\right)$ ndaki herhangi iki değeri için $h(x)$in aldığı değerlerin birbirinden farklı olduğu görülür.

Benzer şekilde x in $\left(0, \frac{5}{2}\right)$ ndaki herhangi iki değeri için $h(x)$in aldığı değerler birbirinden farklıdır.

$\left(0, \frac{5}{2}\right)$ ve $\left(\frac{5}{2}, 8\right)$ için h fonksiyonu bire birdir ve istenen durum sağlanır.

5. Sıra Sizde

1. Gerçek sayılarda $f(x) = 4x - 3$ ve $g(x) = |f(x)| + 3$ şeklinde tanımlı f ve g fonksiyonları veriliyor.
g fonksiyonuna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Görüntü kümesini bulunuz.

b) Artan veya azalan olduğu aralıkları bulunuz.

c) Minimum ve maksimum değerlerini bulunuz.

2. Bir kurye, A noktasındaki dağıtım merkezinden yola çıkarak sabit hızla 5 km uzaklıkta bulunan B noktasındaki eve bir paket bırakıyor. Mola vermeden aynı sabit hızla A noktasına geri dönüyor. Kuryenin giderken ve dönerken aynı doğrusal yolu kullandığı ve gidiş süresinin 20 dakika olduğu biliniyor. Kuryenin zamana (dk.) bağlı olarak B noktasına mesafesini (km) ifade eden fonksiyon f olsun.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) f fonksiyonunun cebirsel temsilini bulunuz.

b) f fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

Derecelendirme ölçeğine ulaşmak için karekodu okutunuz.

Araştırma Ödevi

Aşağıda verilen adımları gerçekleştirerek araştırma ödevini zamanında ve eksiksiz olarak tamamlayınız.

- Farklı alanlarda mutlak değer fonksiyonu yardımıyla ifade edilebilen gerçek yaşam durumlarını araştırınız.
- Belirlediğiniz gerçek yaşam durumuna uygun bağımlı ve bağımsız değişkenleri içeren bir tablo oluşturunuz.
- Tablodaki veriler yardımıyla fonksiyonun cebirsel temsilini oluşturup grafiğini çiziniz.
- Gerçek yaşam durumunu yansıtması amacıyla oluşturduğunuz fonksiyonun cebirsel temsili için uygun tanım ve değer aralıkları belirleyiniz.
- Yaptığınız çalışmanın tüm aşamalarını içeren bir rapor hazırlayıp arkadaşlarınıza sununuz.

Çalışmanız derecelendirme ölçeği ile öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir.

Kontrol Noktası

1. $a \in \mathbb{R} - \{0\}$ ve $b \in \mathbb{R}$ olmak üzere $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |ax + b|$ fonksiyonu için aşağıdaki sonuçlara varılır.

- En geniş tanım kümesi, gerçek sayılardır.
- Görüntü kümesi, $[0, \infty)$ dır.
- f fonksiyonunun sıfırı, $f(x) = |ax + b| = 0$ ise $x = -\frac{b}{a}$ dır.

  $a > 0$ olmak üzere f fonksiyonunun parçalı gösterimi

$$f(x) = \begin{cases} -ax - b, & x < -\frac{b}{a} \\ ax + b, & x \geq -\frac{b}{a} \end{cases}$$ şeklindedir.

x	$-\infty$		$-\frac{b}{a}$		∞
$f(x) = \lvert ax + b \rvert$		$+$	0	$+$	

- $x < -\frac{b}{a}$ ve $x > -\frac{b}{a}$ için **f nin işareti pozitif**tir.
- f fonksiyonunun **maksimum değeri yoktur**. Fonksiyon **minimum değerini** $x = -\frac{b}{a}$ noktasında alır.
- f fonksiyonu **bire bir değildir**.
- f fonksiyonu; $x \in \left(-\infty, -\frac{b}{a}\right]$ için **azalan**, $x \in \left[-\frac{b}{a}, \infty\right)$ için **artan**dır.

2. $a \in \mathbb{R} - \{0\}$ ve $b \in \mathbb{R}$ olmak üzere $g: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = -|ax + b|$ fonksiyonu için aşağıdaki sonuçlara varılır.

- En geniş tanım kümesi, gerçek sayılardır.
- Görüntü kümesi, $(-\infty, 0]$ dır.
- g fonksiyonunun sıfırı, $g(x) = -|ax + b| = 0$ ise $x = -\frac{b}{a}$ dır.
- $a > 0$ olmak üzere g fonksiyonunun parçalı gösterimi

$$g(x) = \begin{cases} ax + b, & x < -\frac{b}{a} \\ -ax - b, & x \geq -\frac{b}{a} \end{cases}$$ şeklindedir.

x	$-\infty$		$-\frac{b}{a}$		∞
$g(x) = -\lvert ax + b \rvert$		$-$	0	$-$	

- $x < -\frac{b}{a}$ ve $x > -\frac{b}{a}$ için g nin işareti **negatif**tir.
- g fonksiyonunun **minimum değeri yoktur**. Fonksiyon **maksimum değerini** $x = -\frac{b}{a}$ noktasında alır.
- g fonksiyonu **bire bir değil**dir.
- g fonksiyonu; $x \in \left(-\infty, -\frac{b}{a}\right]$ için **artan**, $x \in \left[-\frac{b}{a}, \infty\right)$ için **azalan**dır.

Alıştırmalar

1. Elektrik devrelerinde kullanılan elemanlardan biri olan dirençler, farklı değerlerde üretilebilmektedir. Tam olarak istenen değerlerde direnç üretmek zor olduğundan dirençlerin değerlerinde belirli bir hata payı bulunur. Bu hata payı tolerans olarak isimlendirilir ve yüzde olarak ifade edilir. Örneğin 500 ohm $\pm$%2 değerinde üretilen dirençlerin hata payı %2 olduğundan hata miktarı $500 \cdot \frac{2}{100} = 10$ ohm olur. Üretilen dirençlerin gerçek değerinin $[500 - 10, 500 + 10]$nda olabileceği ifade edilebilir.

Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Elektrik devresi elemanları satışı yapan bir firma, 680 ohm $\pm$%5 değerinde dirençler üretmektedir. Üretilen dirençlerin gerçek değerine (ohm) bağlı hata miktarının (ohm) değişimini ifade eden f fonksiyonunun cebirsel temsilini bularak fonksiyonun grafiğini çiziniz.

b) Aşağıdaki tabloyu elde ettiğiniz f fonksiyonunun nitel özelliklerine göre uygun ifadelerle doldurunuz.

Fonksiyonun Nitel Özellikleri	f
Tanım Kümesi	
Görüntü Kümesi	
Fonksiyonun Sıfırı	
Fonksiyonun İşareti	
Maksimum Noktası	
Minimum Noktası	
Bire Birliği	
Artan veya Azalan Olduğu Aralıklar	

2. Gerçek sayılarda $f(x) = 1 - 2x$ ve $g(x) = |f(x)| - 3$ şeklinde tanımlı fonksiyonlar veriliyor.

g fonksiyonuna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Görüntü kümesini bulunuz.

b) Sıfırlarını bulunuz.


c) Artan veya azalan olduğu aralıkları bulunuz.

ç) Minimum ve maksimum değerlerini bulunuz.

Konu ile ilgili daha fazla soru çözmek için karekodu okutunuz.

2.3. DOĞRUSAL FONKSİYONLARLA İFADE EDİLEBİLEN DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER İÇEREN PROBLEMLER

Konuya Başlarken



Yanda verilen silindir şeklindeki deponun içinde 120 litre su bulunmaktadır. Deponun tabanında bir çatlak oluşmuştur. Oluşan çatlaktan birim zamanda sızan su miktarı sabittir. Zamana (dk.) bağlı olarak depoda kalan su miktarını (litre) gösteren fonksiyon f olmak üzere uygun aralıkta tanımlı f fonksiyonunun cebirsel temsili $f(t) = 120 - 0{,}8t$ şeklindedir.

Buna göre aşağıdaki sorularla ilgili fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. Belirli bir sürenin sonunda depoda kalan su miktarının kaç litre olduğu nasıl bulunabilir?
2. Depodaki suyun tamamının kaç dakika sonra tükeneceği nasıl bulunabilir?
3. Depoda kalan su miktarının kaçıncı dakikalar arasında 40 litre ile 80 litre arasında olduğunu hesaplamak için nasıl bir yol izlenebilir?

Doğrusal ilişki içeren problemlerin çözümünde doğrusal fonksiyonlar yardımıyla elde edilen denklem ve eşitsizlikler kullanılır.

10. Uygulama

Teknoloji Uygulaması


$\forall a,b \in \mathbb{R}$ olmak üzere matematik yazılımını açarak aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayınız.

1. **Giriş** bölümüne **f(x) = ax + b** yazıp **Enter** tuşuna basınız. Ekranda f fonksiyonunun grafiği ile a ve b sürgüleri oluşacaktır.

2. **Giriş** bölümüne **g(x) = 0** yazıp **Enter** tuşuna basınız. Ekranda g fonksiyonunun grafiği oluşacaktır. g doğrusunun x ekseni üzerinde olduğuna dikkat ediniz.


3. **Kesiştir** aracını seçip sırasıyla f ve g doğrularını işaretleyiniz. Ekranda f ve g doğrularının kesim noktası oluşacaktır.

4. **Giriş** bölümüne **ax + b = g(x)** yazıp **Enter** tuşuna basınız. Ekranda denk1 doğrusu oluşacaktır (Görsel 1).




Görsel 1

5. **Giriş** bölümüne **f(x) < g(x)** yazıp **Enter** tuşuna basınız. Ekranda f(x) < g(x) eşitsizliğinin çözüm aralığı oluşacaktır (Görsel 2).



Görsel 2

6. **Giriş** bölümüne **f(x) ≥ g(x)** yazıp **Enter** tuşuna basınız. Ardından f(x) < g(x) eşitsizliğinin solundaki daireye tıklayarak rengini kapatınız. Ekranda f(x) ≥ g(x) eşitsizliğinin çözüm aralığı oluşacaktır (Görsel 3).



Görsel 3

7. a ve b sürgülerini hareket ettirerek değişimleri gözlemleyiniz.

Gözlemlerinizden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) g(x) = 0 olduğundan ax + b = g(x) eşitliği ax + b = 0 şeklinde yazılabilir. ax + b = 0 denkleminin kökü ile f fonksiyonunun sıfırı arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.

b) g(x) = 0 olduğundan f(x) < g(x) eşitsizliği f(x) < 0 şeklinde yazılabilir. Görsel 2'de f(x) < 0 eşitsizliğini sağlayan değerler ile ax + b = 0 denkleminin kökü arasında nasıl bir ilişki olduğunu aşağıda verilen işaret tablosunu doldurarak açıklayınız.

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	∞
f(x)		0	

c) g(x) = 0 olduğundan f(x) ≥ g(x) eşitsizliği f(x) ≥ 0 şeklinde yazılabilir. Görsel 3'te f(x) ≥ 0 eşitsizliğini sağlayan değerler ile ax + b = 0 denkleminin kökü arasında nasıl bir ilişki olduğunu aşağıda verilen işaret tablosunu doldurarak açıklayınız.

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	∞
f(x)		0	

ç) f(x) = 0 denkleminin çözüm kümesini ve f(x) < 0, f(x) ≥ 0 eşitsizliklerinin çözüm aralıklarını bulmak için f fonksiyonunun grafik veya cebirsel temsilini kullanarak çözüm stratejileri oluşturunuz.

Matematik yazılımı ile ilgili videoya ulaşmak için karekodu okutunuz.

f ve g doğrusal fonksiyonlar olmak üzere $f(x) = g(x)$, $f(x) < g(x)$, $f(x) \leq g(x)$, $f(x) > g(x)$, $f(x) \geq g(x)$ benzeri ifadeler yardımıyla çözüme ulaşılabilir.

Özel olarak $g(x) = 0$ olduğunda $f(x) < g(x)$ eşitsizliği $f(x) < 0$, $f(x) = g(x)$ denklemi $f(x) = 0$ biçimine dönüşür.

a, b, c, d $\in \mathbb{R}$, a $\neq$ c, a ve c gerçek sayılarından en az biri sıfırdan farklıdır. Gerçek sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonlarının cebirsel temsilleri $f(x) = ax + b$ ve $g(x) = cx + d$ olsun.

Buradan elde edilen $f(x) = g(x)$ ifadesine **birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem**; $f(x) < g(x)$, $f(x) \leq g(x)$, $f(x) > g(x)$, $f(x) \geq g(x)$ ifadelerine **birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik** denir.

m, n $\in \mathbb{R}$ ve m $\neq 0$ olmak üzere $f(x) = g(x)$ denkleminden $ax + b = cx + d \Rightarrow (a - c)x + b - d = 0$ elde edilir. $a - c = m$ ve $b - d = n$ olmak üzere $mx + n = 0$ elde edilir.

Kontrol Noktası

f ve g gerçek sayılarda tanımlı doğrusal fonksiyonlar olsun.

$f(x) < g(x)$, $f(x) \leq g(x)$, $f(x) > g(x)$, $f(x) \geq g(x)$ eşitsizlikleri düzenlenerek $mx + n < 0$, $mx + n \leq 0$, $mx + n > 0$, $mx + n \geq 0$ şeklinde yazılabilir. m, n $\in$ R ve m $\neq 0$ olmak üzere $mx + n = 0$ denkleminin çözüm kümesi $\left\{-\frac{n}{m}\right\}$ dir. Eşitsizliklerin çözüm aralıkları Tablo 2.2'deki gibidir.

Tablo 2.2: *Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Çözüm Aralıkları*

Eşitsizlik	Eşitsizliğin Düzenlenmiş Hâli	m > 0 İçin Çözüm Aralığı	m < 0 İçin Çözüm Aralığı
$f(x) < g(x)$	$mx + n < 0$	$\left(-\infty, -\frac{n}{m}\right)$	$\left(-\frac{n}{m}, \infty\right)$
$f(x) \leq g(x)$	$mx + n \leq 0$	$\left(-\infty, -\frac{n}{m}\right]$	$\left[-\frac{n}{m}, \infty\right)$
$f(x) > g(x)$	$mx + n > 0$	$\left(-\frac{n}{m}, \infty\right)$	$\left(-\infty, -\frac{n}{m}\right)$
$f(x) \geq g(x)$	$mx + n \geq 0$	$\left[-\frac{n}{m}, \infty\right)$	$\left(-\infty, -\frac{n}{m}\right]$

7. ÖRNEK

Dikildiğinde boyu 22 cm olan bir bitkinin boyu, ayda 6 cm uzamaktadır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Bitkinin zamana (ay) bağlı boyunu (cm) ifade eden fonksiyonun cebirsel temsilini oluşturunuz.

b) Bitkinin boyunun kaçıncı ayda 40 cm olduğunu elde etmeye yarayan denklemi oluşturarak denklemin kökünü bulunuz.

c) Bitkinin boyunun 52 cm'nin altında olduğu zaman aralığını bulunuz.

Çözüm

a) Bitkinin zamana (ay) bağlı boyunu (cm) gösteren fonksiyon f olsun. Uygun aralıkta tanımlı f fonksiyonu doğrusal bir fonksiyon olup cebirsel temsili, $f(x) = 22 + 6x$ olur.

b) $22 + 6x = 40 \Rightarrow 6x - 18 = 0$ denklemi çözülerek bitkinin boyunun kaçıncı ayda 40 cm olduğu bulunabilir.
Denklemin kökü $6x - 18 = 0 \Rightarrow 6x = 18 \Rightarrow x = 3$ bulunur.

c) $f(x) < 52$ eşitsizliğini sağlayan değerler için bitkinin boyu 52 cm'nin altındadır.
Buradan $22 + 6x < 52 \Rightarrow 6x < 52 - 22 \Rightarrow 6x < 30 \Rightarrow x < 5$ bulunur.
Bitkinin boyu $[0,5)$ zaman aralığında 52 cm'nin altındadır. Eşitsizliğin çözüm aralığı $[0,5)$ dır.

8. ÖRNEK

$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 3\left(\frac{x}{2} - 1\right)$ olmak üzere $f(x) < 0$ eşitsizliğinin çözüm aralığını

a) f fonksiyonunun cebirsel temsilinden yararlanarak bulunuz.

b) f fonksiyonunun grafiğinden yararlanarak bulunuz.

c) İşaret tablosu kullanarak gösteriniz.

Çözüm

a) $f(x) < 0$ olmak üzere $3\left(\frac{x}{2} - 1\right) < 0 \Rightarrow \frac{3x}{2} - 3 < 0$

$\Rightarrow \frac{3x}{2} < 3$

$\Rightarrow 3x < 6$

$\Rightarrow \frac{\cancel{3}x}{\cancel{3}} < \frac{6}{3}$


$\Rightarrow x < 2$ olur.

Buradan $f(x) < 0$ eşitsizliğinin çözüm aralığı $(-\infty, 2)$ olur.

b) f fonksiyonunun cebirsel temsili, $f(x) = 3\left(\frac{x}{2} - 1\right) \Rightarrow f(x) = \frac{3x}{2} - 3$ şeklinde düzenlenebilir.

Buradan g: $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x$ şeklinde tanımlı g fonksiyonunun tanım aralığındaki değerleri $\frac{3}{2}$ katı

ile eşleyen fonksiyonun grafiği y ekseni boyunca negatif yönde 3 birim ötelenerek f fonksiyonunun grafiği aşağıdaki gibi oluşturulur.



$f(x) = \frac{3x}{2} - 3 = 0 \Rightarrow \frac{3x}{2} = 3 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2$ bulunur.

Bu değer, f fonksiyonunun sıfırıdır. Grafik incelendiğinde f fonksiyonunun grafiğinin x eksenini $(2, 0)$ noktasında kestiği ve fonksiyonun $(-\infty, 2)$ nda negatif değerler aldığı görülür.

c)

x	$-\infty$		2		∞
f(x)		$-$	0	$+$	

Oluşturulan işaret tablosunda $f(x) < 0$ eşitsizliğinin çözüm aralığının $(-\infty, 2)$ olduğu görülür.

11. Uygulama

Denklem ve Eşitsizliklerin Çözümünde Kullanılan Stratejiler

Aşağıda verilen problemleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Yağmur suları, iki farklı parkta bulunan A ve B depolarında toplanarak güneşli havalarda çimlerin sulanması amacıyla kullanılmaktadır. A ve B depoları tamamen dolu iken sulama sistemi çalıştırılmış ve depolardaki su tükenene kadar sulamaya devam edilmiştir. Sulama sırasında birim zamanda kullanılan su miktarları sabittir. A ve B depolarında kalan su miktarları (l), zamana (sa.) bağlı olarak sırasıyla uygun aralıklarda tanımlı f ve g fonksiyonları ile ifade edilmiştir.

f ve g fonksiyonlarının cebirsel temsilleri, $f(x) = 38{,}4 - 1{,}2x$ ve $g(x) = 30{,}4 - 0{,}8x$ biçimindedir.

1. Problem: A ve B depolarında başlangıçta kaç litre su olduğunu ve depolardaki suyun tükendiği zamanı (sa.) bulunuz.

2. Problem: Depolarda kalan su miktarları birbirine eşit olduğunda kalan su miktarını ve eşitlenme zamanını bulunuz.

3. Problem: A deposunda kalan suyun B deposunda kalan sudan daha az olduğu zaman aralığını bulunuz.

1. Matematik yazılımı yardımıyla f ve g fonksiyonlarının gerçek sayılarda grafik temsillerini aşağıdaki adımları izleyerek oluşturunuz.

a) **Giriş** bölümüne **f(x) = 38,4 − 1,2x** yazıp **Enter** tuşuna basınız.

b) **Giriş** bölümüne **g(x) = 30,4 − 0,8x** yazıp **Enter** tuşuna basınız.

2. f ve g fonksiyonlarının grafikleri, 1. problemin çözümü için nasıl kullanılabilir? Fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. 1. problemi fonksiyonların cebirsel temsillerinden yararlanarak nasıl çözebilirsiniz? Çözüm stratejinizi açıklayarak problemi çözünüz.

4. Matematik yazılımı yardımıyla f ve g fonksiyonlarına ait grafiklerin eksenleri kestiği noktaları aşağıdaki adımları izleyerek bulunuz.

a) Kesiştir aracını seçip sırasıyla f doğrusunu ve x eksenini işaretleyiniz.

b) Kesiştir aracını seçip sırasıyla g doğrusunu ve x eksenini işaretleyiniz.

c) Kesiştir aracını seçip sırasıyla f doğrusunu ve y eksenini işaretleyiniz.

ç) Kesiştir aracını seçip sırasıyla g doğrusunu ve y eksenini işaretleyiniz.

5. f ve g fonksiyonlarına ait grafiklerin eksenleri kestiği noktalardan yararlanarak 1. problemi nasıl çözebilirsiniz? Çözüm stratejinizi açıklayarak problemi çözünüz.

6. 1. problemin çözümünde kullandığınız yöntemleri karşılaştırarak çözümlerinizi doğrulayınız.

7. 1. problemin çözümünde kullandığınız yöntemleri doğrusal fonksiyon içeren farklı problem durumları için nasıl kullanabilirsiniz? Genellemenizi oluşturunuz.

8. Oluşturduğunuz genellemeyi sözel, cebirsel ve grafiksel olarak değerlendiriniz.

9. 2 ve 3. problemleri fonksiyonların cebirsel temsillerinden yararlanarak nasıl çözebilirsiniz? Çözüm stratejinizi açıklayarak problemleri çözünüz.

10. Matematik yazılımı yardımıyla f ve g fonksiyonlarına ait grafiklerin kesim noktasını aşağıdaki adımları izleyerek bulunuz.

a) Kesiştir aracını seçiniz.

b) Sırasıyla f ve g doğrularını işaretleyiniz.

11. f ve g fonksiyonlarına ait grafiklerin kesim noktasından yararlanarak 2 ve 3. problemleri nasıl çözebilirsiniz? Çözüm stratejinizi açıklayarak problemleri çözünüz.

12. 2 ve 3. problemin çözümünde kullandığınız yöntemleri karşılaştırarak çözümlerinizi doğrulayınız.

13. 2 ve 3. problemlerin çözümünde kullandığınız yöntemleri doğrusal fonksiyon içeren farklı problem durumları için nasıl kullanabilirsiniz? Genellemenizi oluşturunuz.

14. Oluşturduğunuz genellemeyi sözel, cebirsel ve grafiksel olarak değerlendiriniz.

12. Uygulama

Denklem ve Eşitsizlik İçeren Problemlerin Çözümü

Aşağıda verilen problemleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Arkeologlar, kişilerin boyunu tahmin etmek için kazı sırasında buldukları uyluk kemiklerinin (dizden kalça yuvasına kadar olan kemik) uzunluğundan yararlanmaktadır. Buna göre bir erkeğin boyu, uyluk kemiğinin uzunluğunun 2,2 katına 69 eklenerek; bir kadının boyu, uyluk kemiğinin uzunluğunun 2,3 katına 61,4 eklenerek cm cinsinden yaklaşık olarak elde edilebilmektedir.

1. Problem: Erkek ve kadınların uyluk kemiği uzunluğuna (x) bağlı boyu (y) veren denklemler nasıl bulunabilir?

2. Problem: Bir arkeolojik kazı sırasında bulunan bazı uyluk kemiklerinin ve kişilerin boylarının yaklaşık değerleri tabloda verilmiştir. Tabloda verilmeyen değerleri bulunuz.

	Erkek			Kadın		
Uyluk Kemiğinin Uzunluğu (cm)	45		50		25	30
Kişinin Boyunun Yaklaşık Değeri (cm)		175		150		

1. 1. problemde istenen denklemlerin nasıl elde edilebileceğiyle ilgili stratejinizi belirleyerek denklemleri yazınız.

2. 2. problemde tabloda verilmeyen değerleri nasıl bulabilirsiniz? Çözüm stratejinizi belirleyerek tabloyu doldurunuz.

3. Matematik yazılımı yardımıyla 1. soruda elde ettiğiniz denklemlere ait grafikleri aşağıdaki adımları izleyerek çiziniz.

1. adım: **Giriş** bölümüne erkeklerin boyunu uyluk kemiği uzunluğuna bağlı olarak veren denklemi yazıp **Enter** tuşuna basınız. Yazılan denkleme ait grafik, cebir ve grafik ekranında oluşacaktır.

2. adım: **Giriş** bölümüne kadınların boyunu uyluk kemiği uzunluğuna bağlı olarak veren denklemi yazıp **Enter** tuşuna basınız. Yazılan denkleme ait grafik, cebir ve grafik ekranında oluşacaktır.

Grafiklerden yararlanarak 2. problemde tablodaki verilmeyen değerleri nasıl bulabilirsiniz? Çözüm stratejinizi açıklayarak tabloda verilmeyen değerleri bulunuz.

4. 2. problemin çözümünde kullandığınız yöntemleri karşılaştırarak çözümlerinizi doğrulayınız. Hangi yöntemin daha kullanışlı olduğunu açıklayınız.

5. 1 ve 2. problemlerin çözümünde kullandığınız yöntemleri doğrusal ilişki içeren başka problemlerin çözümünde nasıl kullanabilirsiniz? Genellemelerinizi oluşturunuz.

6. Oluşturduğunuz genellemeleri sözel, cebirsel veya grafiksel olarak değerlendiriniz.

9. ÖRNEK

Güneş ve elektrik enerjisi olmak üzere iki tip ısıtma sisteminin kurulum ve işletme maliyetlerine ilişkin bilgiler Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1

Isıtma Sisteminin Türü	Yıllık İşletme Maliyeti (TL)	Kurulum Maliyeti (TL)
Güneş Enerjisi	1600	57 000
Elektrik Enerjisi	5200	21 000

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Tablo 1'deki verileri kullanarak güneş ve elektrik enerjisi ısıtma sistemlerinin kullanım süresine (yıl) bağlı toplam maliyetini (TL) veren fonksiyonları yazınız.

b) Elde ettiğiniz fonksiyonlar yardımıyla Tablo 2'de verilen kullanım sürelerine göre güneş ve elektrik enerjisi sistemlerinin toplam maliyetlerini bularak tabloyu uygun şekilde doldurunuz.

Tablo 2

Kullanım Süresi (Yıl)	0	5	10	15
Güneş Enerjisi Isıtma Sisteminin Toplam Maliyeti (TL)				
Elektrik Enerjisi Isıtma Sisteminin Toplam Maliyeti (TL)				

c) Matematik yazılımı yardımıyla a maddesinde elde ettiğiniz fonksiyonlara ait grafikleri aşağıdaki adımları izleyerek çiziniz.

1. adım: Giriş bölümüne güneş enerjisi ısıtma sisteminin maliyet fonksiyonunu yazıp **Enter** tuşuna basınız. Cebir ve grafik ekranında fonksiyonun grafiği oluşacaktır.

2. adım: Giriş bölümüne elektrik enerjisi ısıtma sisteminin maliyet fonksiyonunu yazıp **Enter** tuşuna basınız. Cebir ve grafik ekranında fonksiyonun grafiği oluşacaktır.

3. adım: Kesiştir aracını seçip sırasıyla 1 ve 2. adımlarda oluşturduğunuz fonksiyonları işaretleyiniz.

Güneş ve elektrik enerjisi ısıtma sistemlerinin toplam maliyetlerinin kaç yıllık kullanım süresi sonunda ve kaç Türk lirasında eşitleneceğini maliyet fonksiyonlarının grafiklerinin kesim noktasından yararlanarak nasıl bulabilirsiniz? Stratejilerinizi açıklayınız.

ç) Güneş ve elektrik enerjisi ısıtma sistemlerinin toplam maliyetlerinin kaç yıllık kullanım süresi sonunda ve kaç Türk lirasında eşitleneceğini cebirsel çözüm yaparak nasıl bulabilirsiniz? Stratejinizi açıklayarak istenen değeri bulunuz.

d) c ve ç maddelerinde problemin çözümünde kullandığınız yöntemleri karşılaştırarak çözümlerinizi doğrulayınız. Hangi yöntemin daha kullanışlı olduğunu açıklayınız.

e) b maddesinde elde ettiğiniz değerleri fonksiyonların grafiğinden yararlanarak doğrulayınız.

f) c ve ç maddelerinde problemin çözümünde kullandığınız yöntemleri doğrusal ilişki içeren başka problemlerin çözümünde nasıl kullanabilirsiniz? Genellemelerinizi oluşturunuz.

g) Güneş ve elektrik enerjisi sistemlerine ait 5, 10 ve 15. yılların sonundaki toplam maliyetleri karşılaştırarak hangi enerji sisteminin daha ekonomik olduğunu belirleyiniz.

Çözüm

a) Güneş enerjisi ısıtma sisteminin toplam maliyetini hesaplamak amacıyla 57 000 Türk lirası kurulum maliyetine her yıl için 1600 Türk lirası eklenmelidir. Buradan x yıl için güneş enerjisi ısıtma sisteminin toplam maliyetini (TL) veren fonksiyon, $g(x) = 57\,000 + 1600x$ olur.

Elektrik enerjisi ısıtma sisteminin toplam maliyetini hesaplamak amacıyla 21 000 Türk lirası kurulum maliyetine her yıl için 5200 Türk lirası eklenmelidir. Buradan x yıl için elektrik enerjisi ısıtma sisteminin toplam maliyetini (TL) veren fonksiyon, $e(x) = 21\,000 + 5200x$ olur.

b) Güneş enerjisi ısıtma sisteminin toplam maliyeti;

$x = 0$ için $g(0) = 0 \cdot 1600 + 57\,000 = 57\,000$ TL,

$x = 5$ için $g(5) = 5 \cdot 1600 + 57\,000 = 65\,000$ TL,

$x = 10$ için $g(10) = 10 \cdot 1600 + 57\,000 = 73\,000$ TL,

$x = 15$ için $g(15) = 15 \cdot 1600 + 57\,000 = 81\,000$ TL olur.

Elektrik enerjisi ısıtma sisteminin toplam maliyeti;

$x = 0$ için $e(0) = 5200 \cdot 0 + 21\,000 = 21\,000$ TL,

$x = 5$ için $e(5) = 5200 \cdot 5 + 21\,000 = 47\,000$ TL,


$x = 10$ için $e(10) = 5200 \cdot 10 + 21\,000 = 73\,000$ TL,

$x = 15$ için $e(15) = 5200 \cdot 15 + 21\,000 = 99\,000$ TL olur. Buradan Tablo 2 aşağıdaki gibi oluşturulur.

Tablo 2

Kullanım Süresi (Yıl)	0	5	10	15
Güneş Enerjisinin Toplam Maliyeti (TL)	57 000	65 000	73 000	81 000
Elektrik Enerjisinin Toplam Maliyeti (TL)	21 000	47 000	73 000	99 000

c)



g ve e fonksiyonlarının grafikleri (10, 73 000) noktasında kesişmektedir. Buna göre iki ısıtma sisteminin toplam maliyeti, 10. yılın sonunda eşitlenerek 73 000 Türk lirası olmaktadır.

ç) Güneş ve elektrik enerjisi ısıtma sistemlerinin toplam maliyetlerinin kaçıncı yılda eşitlendiğini bulmak için $g(x) = 57\,000 + 1600x$ ve $e(x) = 21\,000 + 5200x$ ifadeleri birbirine eşitlenerek elde edilen denklem çözülmelidir.

$$g(x) = e(x) \Rightarrow 57\,000 + 1600x = 21\,000 + 5200x \Rightarrow 57\,000 - 21\,000 = 5200x - 1600x$$

$$36\,000 = 3600x$$

$$x = \frac{36\,000}{3600} = 10 \text{ yıl bulunur.}$$


$x = 10$ için $g(10) = e(10)$


$$57\,000 + 1600 \cdot 10 = 21\,000 + 5200 \cdot 10$$

$73\,000 = 73\,000$ Türk lirası olur.

d) c ve ç maddelerinde bulunan $x = 10$ değeri ve bu değere karşılık gelen $g(10) = e(10) = 73\,000$ değeri, hem grafikte hem de cebirsel çözümde aynı çıkmıştır. İstenen değerler, matematik yazılımı kullanıldığında cebirsel çözüm yapılmadan doğrudan bulunabilmektedir. Böylece zamandan tasarruf edilmiş ve işlem hatası yapmak gibi istenmeyen durumların önüne geçilmiş olur. Matematik yazılımını kullanma imkânının olmadığı durumlarda cebirsel çözüm yapılarak da istenen değerler elde edilebilir.

e) Matematik yazılımında **Giriş** bölümüne sırasıyla $g(0)$, $e(0)$, $g(5)$, $e(5)$, $g(10)$, $e(10)$, $g(15)$ ve $e(15)$ yazılıp **Enter** tuşuna basılır. **Giriş** bölümünde 0, 5, 10 ve 15 değerlerine karşılık gelen değerler yazacaktır. Bu değerler b maddesinde bulunan değerlerle aynıdır.





f) Doğrusal ilişki içeren problemlerde doğrusal ilişki, bir doğrusal fonksiyonun cebirsel temsili olarak ifade edilir. Elde edilen fonksiyonların cebirsel temsilinden yararlanılarak grafiği çizilir ve grafik yardımıyla problem çözülebilir.

Grafik çizilmeden cebirsel işlemler yapılarak problem çözülebilir. İki doğrusal fonksiyon birbirine eşitlenerek çözümünden elde edilen x ve y değerleri, bu fonksiyonların grafiklerinin kesim noktasının koordinatlarıdır.

g) 0-10 yıllık zaman dilimindeki kullanımda elektrik enerjisi ısıtma sistemi, güneş enerjisi ısıtma sistemine göre daha ekonomiktir. Isıtma sistemlerinin toplam maliyetleri 10. yılda eşitlenmektedir. İlk 10 yıllık kullanım süresi sonunda elektrik enerjisi ısıtma sistemi daha ekonomiktir, 10 yıldan sonraki kullanımlarda güneş enerjisi ısıtma sistemi daha ekonomiktir. 15 yıllık kullanım sonunda güneş enerjisi ısıtma sisteminin toplam maliyeti 81 000 Türk lirası, elektrik enerjisi ısıtma sisteminin toplam maliyeti 99 000 Türk lirasıdır. Buna göre 15 yıllık kullanım sonunda güneş enerjisi ısıtma sisteminin daha ekonomik olduğu söylenebilir.

13. Uygulama

Ekonomik Aracı Seçme

İkişer kişilik gruplara ayrılarak aşağıda verilenleri inceleyiniz.

Yeni bir araba satın almak isteyen Kerem Bey, araştırmaları sonucunda seçenekleri A ve B markaları olarak ikiye indirmiştir. Arabalar zamanla değer kaybettiği için iki araba arasında bazı karşılaştırmalar yapmak istemektedir. Arabaların satış fiyatını ve yıllık değer kaybını gösteren bilgiler Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1

Araba Markası	Satış Fiyatı (TL)	Yıllık Değer Kaybı (TL)
A	1 200 000	12 000
B	1 320 000	20 000

Sizden Kerem Bey'in uygun arabayı seçmesine yardımcı olmanız beklenmektedir. Grup içinde her bir kişinin birer araba seçmesi koşuluyla A ve B arabalarını paylaşarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. A ve B marka arabaların kullanım süresine (yıl) bağlı olarak değerlerindeki değişimi veren fonksiyonları yazınız.

2. 1. maddede elde ettiğiniz fonksiyonlardan yararlanarak arabaların kullanım sürelerine göre değerlerini bulunuz ve Tablo 2'de ilgili yere yazınız.

Tablo 2

Kullanım Süresi (Yıl)	A Marka Arabanın Değeri (TL)	B Marka Arabanın Değeri (TL)
5		
10		
15		
20		

3. A ve B marka arabaların kullanım süresine (yıl) bağlı olarak değerlerini (TL) gösteren grafikleri aşağıdaki dik koordinat sisteminde çiziniz.





4. A ve B marka arabaların değerinin kaç yıl sonra eşit olacağını çizdiğiniz grafiklerden yararlanarak bulunuz.

5. A ve B marka arabaların değerinin kaç yıl sonra eşit olacağını cebirsel çözüm yaparak bulunuz.

6. Kerem Bey'e hangi arabayı almasının daha avantajlı olacağı söylenebilir? Nedenleri ile açıklayınız.

10. ÖRNEK





Yukarıdaki görselde masaya tutturulmuş bir yayın ucuna asılı bir kap verilmiştir. Başlangıçta boş olan kaba boya ilave edilerek masanın alt kısmı ile kabın üst kısmı arasındaki mesafe ölçülmüştür. Kabın içine eklenen boya miktarına (dl) bağlı olarak ölçülen mesafenin (cm) değişim grafiği yukarıda verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Kabın hacmi 50 dl'den az olduğuna göre kap tam dolu iken ölçülen mesafenin kaç cm'den az olacağını bulunuz.

b) Masanın alt kısmı ile zemin arasındaki mesafenin 102 cm'den az olduğu bilindiğine göre 15 cm uzunluğundaki kabın yere değmemesi için kaba ilave edilebilecek boya miktarının (dl) alabileceği değer aralığını bulunuz.

Çözüm

a) Kaba ilave edilen boya miktarı x dl olmak üzere kap tam dolu iken $x < 50$ olur. Masanın alt kısmı ile kovanın üst kısmı arasındaki ölçülen mesafeyi ifade eden eşitlik $y = 10,2 + 2x$ olduğundan $x < 50 \Rightarrow 2x < 100 \Rightarrow 2x + 10,2 < 110,2$ bulunur.

Buna göre kap tamamen dolu iken ölçülen mesafe 110,2 cm'den azdır.

b) Masanın alt kısmı ile kabın üst kısmı arasındaki ölçülen mesafe (cm) y olmak üzere kabın zemine değmemesi için $y < 102 - 15 \Rightarrow y < 87$ olmalıdır. Buradan $10,2 + 2x < 87 \Rightarrow 2x < 87 - 10,2$

$\Rightarrow 2x < 76,8$

$\Rightarrow x < 38,4$ olur.

Kabın yere değmemesi için kaba ilave edilebilecek boya miktarının (dl) alabileceği değerlerin aralığı $[0, 38,4)$ olur.

Proje Ödevi

Doğrusal Fonksiyonlarla İfade Edilebilen Denklem ve Eşitsizlikler

Bu projede sizden doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen bir gerçek yaşam problemi belirlemeniz, belirlediğiniz problem için kullanılabilecek denklem veya eşitsizlikleri oluşturarak problemi çözmeniz, kullandığınız denklem ve eşitsizliklerin farklı problem durumlarında nasıl kullanılabileceğini belirlemeniz ve ödevinizi sınıfta sunmanız beklenmektedir.

Projeye başlamadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

- Doğrusal fonksiyonlar ile ifade edilebilen gerçek yaşam durumları belirleyiniz.
- Çözümünde doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen bir denklem veya eşitsizlik kullanılan bir problem oluşturunuz.

Projeyi yaparken aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

- Oluşturduğunuz problem durumunun çözümünde kullanacağınız denklem veya eşitsizlikleri belirleyiniz.
- Belirlediğiniz denklem veya eşitsizliklerden yararlanarak probleminizi çözünüz.
- Probleminizin çözümünde denklem veya eşitsizlikleri ifade eden doğrusal fonksiyon grafiklerinden nasıl yararlanabileceğinizi belirleyiniz.
- Problemin çözümünde kullandığınız denklem veya eşitsizliklerin başka hangi problem durumlarında kullanılabileceğini belirleyerek projenizi raporlayınız.

Proje raporunun aşağıdaki alt başlıkları içermesine dikkat ediniz.

- Projenin amacı
- Kullanılan yöntem

Projenizi sunmak için hazırlayacağınız modelde aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

- Gerçekleştirdiğiniz adımları sırasıyla anlatınız.
- Anlatımınızı ilgili görsellerle destekleyiniz.
- Türkçenin düzgün ve etkili biçimde kullanılmasına özen gösteriniz.

Çalışmanız proje değerlendirme formu ile öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir.

Proje değerlendirme formuna ulaşmak için karekodu okutunuz.

11. ÖRNEK

Şişme bot üreten bir fabrikanın kurulum maliyeti 300 000 Türk lirasıdır. Üretilen bir şişme botun maliyeti 1300 Türk lirası, satış fiyatı 2500 Türk lirasıdır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) x adet şişme bot üretmenin maliyetini modelleyen fonksiyonu yazınız.

b) x adet şişme bot satışından elde edilen geliri modelleyen fonksiyonu yazınız.

c) Fabrikanın maliyet ve gelirinin eşit olması için kaç adet şişme bot satması gerektiğini bulunuz.

ç) Fabrikanın kâr edebilmesi için en az kaç adet şişme bot satması gerektiğini bulunuz.

Çözüm

a) Maliyet fonksiyonu $m(x) = 300\,000 + 1300x$ olur.

b) Gelir fonksiyonu $g(x) = 2500x$ olur.

c) Maliyet ve gelir fonksiyonları birbirine eşitlenerek x değeri bulunur.

$m(x) = g(x)$

$\Rightarrow$ $300\,000 + 1300x = 2500x \Rightarrow 300\,000 = 2500x - 1300x \Rightarrow 300\,000 = 1200x$

$\Rightarrow x = \dfrac{300\,000}{1200} = 250$ adet şişme bot satıldığında gelir ve maliyet değerleri eşit olur.

ç) $x > 250$ için $g(x) > m(x)$ olur ve buna göre fabrikanın kâr etmesi için en az 251 adet şişme bot satması gerekir.

6. Sıra Sizde

Spor ayakkabı üreten bir firmanın kurulum maliyeti 200 000 TL'dir. Bir çift spor ayakkabının üretim maliyeti 1400 TL'dir. Firma, spor ayakkabıların çiftini 1800 TL'den satmaktadır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) x çift spor ayakkabı üretmenin maliyetini modelleyen fonksiyonu yazınız.

b) x çift spor ayakkabı satışından elde edilen geliri modelleyen fonksiyonu yazınız.

c) Kaç çift spor ayakkabı sattıktan sonra firma gelirinin toplam maliyete eşit olacağını bulunuz.

ç) Firmanın kâr edebilmesi için en az kaç çift spor ayakkabı satması gerektiğini bulunuz.

Mutlak Değerli Denklemler ve Eşitsizlikler İçeren Problemler

14. Uygulama


Teknoloji Uygulaması

Matematik yazılımını açarak aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayınız ve gözlemlerinizden yararlanarak aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

1. adım: **Giriş** bölümüne $\mathbf{f(x) = |ax + b|}$ yazıp **Enter** tuşuna basınız. Ekranda f fonksiyonunun grafiği ile a ve b sürgüleri oluşacaktır.


2. adım: **Kesiştir** aracını seçip sırasıyla f doğrusunu ve x eksenini işaretleyiniz. Ekranda f doğrusunun x eksenini kestiği nokta oluşacaktır.

3. adım: **Giriş** bölümüne $\mathbf{|ax + b| = 0}$ yazıp **Enter** tuşuna basınız. Ekranda denk1 doğrusu oluşacaktır (Görsel 1).




Görsel 1

4. adım: **Giriş** bölümüne **f(x) ≥ 0** yazıp **Enter** tuşuna basınız. Ekranda f(x) ≥ 0 eşitsizliğinin çözüm aralığı oluşacaktır (Görsel 2).



Görsel 2

5. adım: **Giriş** bölümüne **f(x) < 0** yazıp **Enter** tuşuna basınız. Ekranda f(x) < 0 eşitsizliğinin çözüm aralığı oluşacaktır (Görsel 3).



Görsel 3

1. a ve b sürgülerini hareket ettirerek değişimleri gözlemleyiniz. $|ax + b| = 0$ denkleminin kökü ile f fonksiyonunun sıfırı arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.

2. f fonksiyonunun işaret tablosunu doldurunuz. İşaret tablosu ile Görsel 2 ve Görsel 3'te $f(x) > 0$, $f(x) < 0$ eşitsizliklerinin çözüm aralıkları ile ilgili çıkarımlarınız ne olur? Gerekçelerinizle açıklayınız.

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	∞
f(x)		0	

3. $f(x) = 0$ denkleminin çözüm kümesini ve $f(x) < 0$, $f(x) \geq 0$ eşitsizliklerinin çözüm aralıklarını bulmak için f fonksiyonunun grafik veya cebirsel temsilini kullanarak çözüm stratejileri oluşturunuz.

15. Uygulama

$|f(x)| = k, |f(x)| \geq k, |f(x)| > k, |f(x)| \leq k, |f(x)| < k$ $(k \in \mathbb{R})$ Şeklinde Tanımlı Denklem ve Eşitsizlikler

Aşağıda verilenlere göre soruları cevaplayınız.

Neslihan ve Mustafa herhangi bir nesnenin kütlesini tahmin ettikleri bir oyun oynamaktadır. Tahmin eden kişinin söyleyeceği sayı nesnenin gerçek kütlesinden en çok 50 gram eksik ya da 50 gram fazla olursa o kişi oyunu kazanmaktadır. Neslihan Mustafa'ya bir nesne göstererek bu nesnenin kütlesini tahmin etmesini istiyor. Nesnenin kütlesinin 1350 gram olduğu biliniyor.

1. Problem: Oyunu Mustafa kazandığına göre Mustafa hangi sayıları söylemiş olabilir?

a) Mutlak değer fonksiyonlarını kullanarak yukarıdaki problem durumunu cebirsel temsillerle nasıl ifade edersiniz? Bulduğunuz cebirsel temsillerin problem bağlamındaki anlamını ifade ediniz.

b) Bulduğunuz cebirsel temsillerin problemin çözümünde nasıl kullanılabileceğini sınıf arkadaşlarınızla tartışınız. Strateji oluşturarak problemi çözünüz.

c) Mutlak değerli fonksiyonları kullanarak yukarıdaki problem durumunu grafik temsiliyle nasıl ifade edersiniz? Bulduğunuz grafik temsilinin problem bağlamındaki anlamını ifade ediniz.

ç) Bulduğunuz grafik temsilinin problemin çözümünde nasıl kullanılabileceğini sınıf arkadaşlarınızla tartışınız. Strateji oluşturarak problemi çözünüz.

d) 1. problemin çözümünde kullandığınız yöntemleri karşılaştırarak çözümlerinizi doğrulayınız.

e) 1. problemin çözümünde kullandığınız yöntemleri mutlak değer fonksiyonu içeren farklı problem durumları için nasıl kullanabilirsiniz? Genellemenizi oluşturunuz.

f) Oluşturduğunuz genellemeyi sözel, cebirsel ve grafiksel olarak değerlendiriniz.

g) 1. problem için verilen adımları 2 ve 3. problemler için uygulayınız.

2. Problem: Oyunu Mustafa kaybettiğine göre Mustafa hangi sayıları söylemiş olabilir?

3. Problem: Mustafa'nın oyunu kazanması için söyleyebileceği en küçük sayı ile en büyük sayı kaçtır?

12. ÖRNEK



Mühendislikte yapıların bileşenlerinin kabul edilebilir ölçülerinin aralığı için tolerans terimi kullanılır. Tolerans, üretilen parçaların üretilmesi gereken değerden sapma miktarı (hata payı) olarak da ifade edilmektedir.

Mil, rulman, dişli gibi makine parçaları büyüklüklerine göre farklı tolerans ile üretilir. Görseldeki rulmanlar, çap uzunluğu 60 mm $\pm$ 0,05 mm olacak şekilde üretilmektedir.

Verilenlere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Üretilecek bir rulmanın çap uzunluğuna bağlı hata miktarını veren fonksiyonu cebirsel ve grafik temsiliyle ifade ediniz.

b) Üretilen bir rulmanın çap uzunluğunun istenen ölçüde üretilip üretilmediğini, uygun ölçülerde üretilen bir rulmanın çap uzunluğunun alabileceği en büyük ve en küçük değeri belirleyecek çözüm stratejileri oluşturunuz.


c) Belirlediğiniz stratejileri kullanarak problemleri çözünüz.

ç) Elde ettiğiniz çözümleri farklı yöntemlerle doğrulayınız.

d) Problemin farklı çözüm yöntemlerini ilişkilendirerek elde ettiğiniz çıkarımları değerlendiriniz.

Çözüm

a)



Üretilen bir rulmanın çap uzunluğu x mm olsun. x, fonksiyonun bağımsız değişkeni olur. Hata miktarı, x e bağlı olarak değiştiğinden fonksiyonun bağımlı değişkenidir. x e bağlı hata miktarını veren fonksiyonun kuralı $f(x) = |60 - x|$ olur.

f fonksiyonunun grafik temsili yandaki şekilde çizilir.

b)

- Üretilen bir rulmanın çap uzunluğunun istenilen ölçüde olması için hata miktarının en fazla 0,05 olması gerekmektedir. Uygun rulmanların çap uzunluğunun alabileceği değerler, $f(x) \leq 0,05 \Rightarrow |60 - x| \leq 0,05$ eşitsizliğini sağlar.
- Çap uzunluğu $|60 - x| > 0,05$ aralığını sağlayan değerler için de üretilen rulmanlar uygun ölçüde değildir.
- Ölçüsü uygun olarak üretilen bir rulmanın çap uzunluğunun alabileceği en büyük ve en küçük değerler için hata miktarı en fazladır. Böylece en büyük ve en küçük değerler için $|60 - x| = 0,05$ denklemini sağlayan değerler bulunabilir.

c)

- $|60 - x| \leq 0,05$ eşitsizliğinin cebirsel çözümü için f fonksiyonu, parçalı gösterimli fonksiyon olarak yazılır.

$$f(x) = \begin{cases} 60 - x, & x < 60 \\ x - 60, & x \geq 60 \end{cases}$$

Parçalı olarak yazılan cebirsel temsiller için ayrı ayrı eşitsizlikler çözüldüğünde

$60 - x \leq 0,05 \Rightarrow 60 - 0,05 \leq x \Rightarrow 59,95 \leq x$

$x - 60 \leq 0,05 \Rightarrow x \leq 0,05 + 60 \Rightarrow x \leq 60,05$ bulunur.

İki eşitsizlik birlikte yazılarak x in alacağı değerlerin kümesi $59,95 \leq x \leq 60,05$ olur. Bulunan çözüm kümesi $[59,95; 60,05]$ olarak da gösterilebilir.

[59,95 , 60,05] dışındaki değerler için rulmanların çap uzunluğunun uygun ölçüde olmadığı söylenebilir. Buradan $|60 - x| > 0,05$ eşitsizliğinin çözüm kümesi $\mathbb{R} - [59,95; 60,05]$ olur.

- Ölçüsü uygun olarak üretilen bir rulmanın çap uzunluğunun alacağı en büyük değer ve en küçük değer için $|60 - x| = 0,05$ denklemini çözmek için parçalı gösterimli fonksiyonun cebirsel temsilleri sırasıyla 0,05'e eşitlendiğinde

$60 - x = 0,05 \Rightarrow x = 60 - 0,05 \Rightarrow x = 59,95$ en küçük değer,

$x - 60 = 0,05 \Rightarrow x = 60 + 0,05 \Rightarrow x = 60,05$ en büyük değer olur.


ç) Mutlak değerli denklem ve eşitsizliklerin cebirsel çözümleri grafik çözümleriyle doğrulanabilir.

- $|60 - x| \leq 0,05$ ve $|60 - x| > 0,05$ grafik çözümü için matematik yazılımından faydalanılabilir. Bunun için

i) Giriş bölümüne $f(x) = |60 - x|$ yazılıp **Enter** tuşuna basılır.

ii) Giriş bölümüne $f(x) \leq 0,05$ yazılıp **Enter** tuşuna basılır.

iii) Giriş bölümüne $f(x) > 0,05$ yazılıp **Enter** tuşuna basılır.



Görsel 1

Görsel 1'de mavi renkli bölümdeki x değerleri [59,95 , 60,05] nda bulunmaktadır. Bu aralığın $|60 - x| \leq 0,05$ eşitsizliğinin çözüm kümesine eşit olduğu sonucuna varılır.


Turuncu renkli bölümdeki x değerleri $(-\infty , 59,95) \cup (60,05 , \infty)$ nda bulunmaktadır. Bu aralığın $|60 - x| > 0,05$ eşitsizliğinin çözüm kümesine eşit olduğu sonucuna varılır.

- $|60 - x| = 0,05$ denkleminin grafik çözümü için matematik yazılımından faydalanılabilir. Bunun için

  i) Giriş bölümüne $f(x) = |60 - x|$ yazılıp **Enter** tuşuna basılır.

  ii) Giriş bölümüne $g(x) = 0,05$ yazılıp **Enter** tuşuna basılır.

  iii) Kesiştir aracı seçilerek f ve g fonksiyonlarının grafikleri üzerine tıklanır.



Görsel 2

Görsel 2 incelendiğinde f ve g fonksiyonların grafiklerinin kesim noktalarının $A(60,05 , 0,05)$ ve $B(59,95 , 0,05)$ olduğu görülmektedir. A ve B noktalarının apsis değerleri,
$f(x) = g(x) \Rightarrow |60 - x| = 0,05$ denkleminin köklerini ifade eder. Cebirsel çözümdekine benzer şekilde bu denklemin iki tane kökü bulunmaktadır.

d) Mutlak değerli fonksiyon içeren denklem ve eşitsizlikler, cebirsel veya grafiksel temsiller yardımıyla çözülebilir. Mutlak değerli fonksiyon parçalı olarak iki farklı cebirsel temsille ifade edildiğinden her temsil için bir çözüm yapılır. f ve g fonksiyonlarının kesim noktalarının apsis değerleri, cebirsel çözümde elde edilen denklemin kökünü ifade eder.

16. Uygulama

$|f(x)| = g(x), |f(x)| \geq g(x), |f(x)| > g(x), |f(x)| \leq g(x), |f(x)| < g(x)$ Biçimindeki Denklem ve Eşitsizlikler

Aşağıda verilenlere göre soruları cevaplayınız.

Tabloda gerçek sayılarda tanımlı f, g ve h fonksiyonları verilmiştir.

Fonksiyon	Cebirsel Temsil
f	$f(x) = x$
g	$g(x) = 3x - 5$
h	$h(x) = \|g(x) - 4\|$

1. Problem: $g(x) = h(x)$ eşitliğini sağlayan x gerçek sayı değerleri nelerdir?

a) Mutlak değer fonksiyonlarını kullanarak 1. problemi cebirsel temsillerle nasıl ifade edersiniz? Bulduğunuz cebirsel temsillerin problem bağlamındaki anlamını ifade ediniz.

b) Elde ettiğiniz cebirsel temsillerin 1. problemin çözümünde nasıl kullanılabileceğini sınıf arkadaşlarınızla tartışınız. Strateji oluşturarak problemi çözünüz.

c) Mutlak değer fonksiyonlarını kullanarak 1. problemi grafik temsiliyle nasıl ifade edersiniz? Bulduğunuz grafik temsilinin problem bağlamındaki anlamını ifade ediniz.

ç) Elde ettiğiniz grafik temsilinin 1. problemin çözümünde nasıl kullanılabileceğini sınıf arkadaşlarınızla tartışınız. Strateji oluşturarak problemi çözünüz.

d) 1. problemin çözümünde kullandığınız yöntemleri karşılaştırarak çözümlerinizi doğrulayınız.

e) 1. problemin çözümünde kullandığınız yöntemleri mutlak değer fonksiyonu içeren farklı problem durumları için nasıl kullanabilirsiniz? Genellemenizi oluşturunuz.

f) Oluşturduğunuz genellemeyi sözel, cebirsel ve grafiksel olarak değerlendiriniz.

2. Problem: $g(x) < h(x)$ eşitsizliğini sağlayan gerçek sayı değerleri kaçtır?

1. problem için verilen adımları 2. problem için uygulayınız.

Mutlak değer içeren problemlerin çözümünde mutlak değer fonksiyonları yardımıyla elde edilen denklem ve eşitsizlikler kullanılır. f ve g doğrusal fonksiyonlar olmak üzere $|f(x)| = g(x), |f(x)| \geq g(x), |f(x)| > g(x), |f(x)| \leq g(x)$ ve $|f(x)| < g(x)$ gibi ifadeler yardımıyla problem çözümüne ulaşılabilir.

$g(x) = k$ $(k \in \mathbb{R},\ k \neq 0)$ şeklinde sabit fonksiyon olduğunda yukarıdaki denklem ve eşitsizlikler $|f(x)| = k, |f(x)| \geq k, |f(x)| > k, |f(x)| \leq k$ ve $|f(x)| < k$ biçimine dönüşür.

Özel olarak $g(x) = 0$ olduğunda

$|f(x)| = 0, |f(x)| \geq 0, |f(x)| > 0, |f(x)| \leq 0$ ve $|f(x)| < 0$ biçimindeki denklem ve eşitsizlikler elde edilir.

13. ÖRNEK

$x > \frac{1}{3}$ olmak üzere alanı $(4x^2 + 12x + 9)$ cm^2 olan karenin bir kenar uzunluğu, $(3x - 1)$ cm olarak veriliyor.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Karenin bir kenar uzunluğunu mutlak değerli denklemler yardımıyla belirleyiniz.

b) Bulduğunuz sonucu grafik temsilleriyle doğrulayınız.

c) Problemin farklı çözüm yöntemlerini ilişkilendirerek elde ettiğiniz çıkarımları değerlendiriniz.

Çözüm

a) Alanı $(4x^2 + 12x + 9)$ cm^2 olan karenin bir kenar uzunluğu,

$\sqrt{4x^2 + 12x + 9} = \sqrt{(2x + 3)^2} = |2x + 3|$ cm olur. Karenin kenar uzunluklarını ifade eden cebirsel ifadeler birbirine eşitlendiğinde $|2x + 3| = 3x - 1$ denklemi elde edilir.

Elde edilen denklemin sol tarafı parçalı hâle getirilerek her cebirsel temsil için denklemler ayrı ayrı çözülür.

$2x+3=0 \Rightarrow x=-\frac{3}{2}$ olmak üzere $x<-\frac{3}{2}$ için $-2x-3=3x-1 \Rightarrow 5x=-2 \Rightarrow x=-\frac{2}{5}$,

$x \geq -\frac{3}{2}$ için $2x+3=3x-1 \Rightarrow x=4$ bulunur.

Bulunan $x=-\frac{2}{5}$ değeri, $x<-\frac{3}{2}$ şartını sağlamaz. Bu nedenle çözüme alınmaz.


$x=4$ değeri, $x \geq -\frac{3}{2}$ şartını sağlar. Buradan çözüm kümesi $\{4\}$ olur. Karenin bir kenar uzunluğu, $3x-1=3\cdot 4-1=11\,\text{cm}$ bulunur.

b) $|2x+3|=3x-1$ denkleminin grafik çözümü için matematik yazılımından faydalanılabilir. Bunun için

i) Giriş bölümüne $f(x)=|2x+3|$ yazılıp **Enter** tuşuna basılır.

ii) Giriş bölümüne $g(x)=3x-1$ yazılıp **Enter** tuşuna basılır.

iii) Kesiştir aracı seçilerek f ve g fonksiyonlarının grafikleri üzerine tıklanır.



Görsel incelendiğinde fonksiyonların grafiklerinin kesim noktasının $A(4, 11)$ olduğu görülür. A noktasının apsis değeri, $f(x)=g(x) \Rightarrow |2x+3|=3x-1$ denkleminin kökünü ifade eder. Cebirsel çözümdekine benzer şekilde bu denklemin bir tane kökü bulunmaktadır.

c) Cebirsel temsille iki farklı kök elde edilmiştir. x için belirlenen aralıkları sağlayıp sağlamadığı kontrol edildikten sonra bulunan değerlerden biri çözüm kümesine alınmıştır. Grafik çözümünde f ve g fonksiyonlarının tek noktada kesişmesi, denklemin bir kökü olduğunu doğrulamıştır. Mutlak değerli denklemler cebirsel temsillerle çözüldüğünde bu denklemlerin x için belirlenen aralığı sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmelidir.

Alıştırmalar

1-4. soruları aşağıdaki bilgilerden yararlanarak cevaplayınız.

Bir firma, veri güvenliğini sağlamak amacıyla virüs koruma programı satın almak istemektedir. Firmanın incelediği M ve N programları için kurulum ve aylık kullanım ücretleri (TL) aşağıdaki tabloda verilmiştir.

	M	N
Kurulum Ücreti (TL)	1500	600
Aylık Ücret (TL)	200	250

M programı için kullanım süresine bağlı (ay) ödenecek ücreti (TL) gösteren fonksiyon f, N programı için kullanım süresine bağlı (ay) ödenecek ücreti (TL) gösteren fonksiyon g olsun.

1. **Tanım ve görüntü kümelerini belirleyerek f ve g fonksiyonlarının cebirsel temsilini bulunuz.**

2. Firma, satın aldığı virüs koruma programını 1 yıl kullanacaktır.

   Firmanın hangi programı seçmesinin daha ekonomik olacağını belirleyiniz.

3. **Matematik yazılımı yardımıyla f ve g fonksiyonlarının grafiklerini çizerek iki program için ödenecek ücretin kaç Türk lirasında eşitlendiğini bulunuz.**

4. **İki programa ödenecek ücretin kaç aylık kullanım sonunda birbirine eşit olacağını bulunuz.**

5-6. soruları aşağıdaki bilgilerden yararlanarak cevaplayınız.

Bir ilkokuldaki asansörün yük taşıma kapasitesi 720 kg'dır ve asansörde çocuklara refakat eden bir yetişkinin bulunması zorunludur. Bir çocuğun ortalama kütlesi 30 kg ve asansörde çocuklara refakat eden yetişkinin kütlesi 80 kg'dır.

5. **Asansörün aşırı yüklenmesini önlemek amacıyla bir uyarı yazısı hazırlanacaktır. x asansöre binen kişilerin toplam kütlesini (kg) göstermek üzere aşırı yükleme durumunu ifade eden eşitsizliği yazınız.**

6. **Asansörün refakatçi ile birlikte en fazla kaç çocuğu taşıyabileceğini bulunuz.**

7. Doruk saat 08.00'de evden çıkıp evine 1,2 km uzaklıkta bulunan okuluna sabit hızla 16 dakikada yürümüştür. Okula gittikten hemen sonra cüzdanını unuttuğunu fark edip aynı sabit hızla eve geri dönmüş ve cüzdanını almıştır.

Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Doruk'un zamana (dk.) bağlı okula olan mesafesini (km) modelleyen fonksiyonu cebirsel ve grafik temsiliyle ifade ediniz.

b) Doruk'un okula olan mesafesinin 400metreden az olduğu saat aralığını belirleyecek çözüm stratejileri oluşturunuz.

c) Belirlediğiniz stratejileri kullanarak problemi çözünüz.

ç) Elde ettiğiniz çözümü farklı yöntemlerle doğrulayınız.

d) Problemin farklı çözüm yöntemlerini ilişkilendirerek elde ettiğiniz çıkarımları değerlendiriniz.

Konu ile ilgili daha fazla soru çözmek için karekodu okutunuz.

Farklı Kaydet

Bu temada öğrendiğiniz bilgileri kendi hatırlayacağınız şekilde bu alana kısaca not edebilirsiniz.

Ölçme ve Değerlendirme

Bu bölümde cevaplamanız için farklı soru tiplerinde 19 adet soru bulunmaktadır.
Ölçme ve değerlendirme bölümünün sonunda verilen karekodu okutarak ek sorulara ulaşabilirsiniz.

1. Yüksekliği 200 cm olan dik dairesel silindir şeklindeki boş bir su tankına su doldurulmaktadır. 1 dakika boyunca sabit hızla su doldurulduğunda tanktaki suyun yüksekliği 1 cm olmaktadır. Tanka su doldurulmaya başlandığı andan itibaren zamana (dk.) bağlı olarak tanktaki suyun yüksekliğinin (cm) değişimini gösteren fonksiyon f olsun.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) f fonksiyonunun tanım ve görüntü kümelerini bulunuz.

b) f fonksiyonunun cebirsel temsilini bulunuz.

c) f fonksiyonunun grafik temsilini oluşturunuz.

ç) Tanımlı olduğu aralıkta f fonksiyonunun bire bir olup olmadığını bulunuz.


d) f fonksiyonunun sıfırını ve işaretini belirleyiniz.

2. Kenar uzunlukları 4 cm ve x cm olan bir dikdörtgen veriliyor. $x \geq 1$ olmak üzere x e (cm) bağlı olarak dikdörtgenin çevre uzunluğunun (cm) değişimini gösteren fonksiyon f olsun.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) f fonksiyonunun tanım ve görüntü kümelerini bularak fonksiyonun cebirsel temsilini yazınız.

b) f fonksiyonunun grafik temsilini oluşturunuz.




c) f fonksiyonunun işaretini inceleyiniz.

ç) f fonksiyonunun artan veya azalan olduğu aralıkları belirleyiniz.

d) f fonksiyonunun bire bir olup olmadığını bulunuz.

3. Gerçek sayılarda tanımlı f fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir.



Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.


a) f fonksiyonunun cebirsel temsilini yazınız.

b) f fonksiyonunun grafiğinin eğimini bulunuz.

c) f fonksiyonunun sıfırını bulunuz.

ç) f fonksiyonunun işaretini bulunuz.

4. Bir barajın su depolama kapasitesi, o barajda depolanabilecek maksimum su miktarını ifade eder. Bu kapasite erozyon, kirlilik gibi etkenlerden dolayı zamanla azalmaktadır.



Yandaki grafikte bir barajın zamana (yıl) bağlı su depolama kapasitesinin (m^3) değişimi;

$b \in \mathbb{R}$, $f: [0, 20] \longrightarrow [0, b]$, $f(x) = -10\,000x + b$ şeklinde tanımlı f doğrusal fonksiyonu ile ifade edilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Barajın su depolama kapasitesinin en fazla kaç m^3 olduğunu hesaplayınız.

b) Hangi yılın sonunda barajın su depolama kapasitesinin en az olduğunu bulunuz.

c) Barajın zamana (yıl) bağlı su depolama kapasitesinin (m^3) değişim oranını bulunuz.


5. Bir boyacı, mavi ve beyaz renkleri belirli oranlarda karıştırarak K, L ve M renklerini elde ediyor. K, L ve M renklerini elde etmek için kullanılan mavi ve beyaz boyaların miktarları arasındaki ilişki; a, b, $c \in \mathbb{R}^+$ olmak üzere sırasıyla uygun aralıkta $f(x) = ax$, $g(x) = bx$ ve $h(x) = cx$ şeklinde tanımlı doğrusal fonksiyonlar ile ifade ediliyor.

K, L ve M renklerini elde etmek için kullanılan mavi ve beyaz boya miktarları arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir.

- K rengini elde etmek için kullanılan mavi boya miktarı, beyaz boya miktarından azdır.
- L rengini elde etmek için kullanılan mavi boya miktarı, beyaz boya miktarına eşittir.
- M rengini elde etmek için kullanılan mavi boya miktarı, beyaz boya miktarından fazladır.

Mavi boya miktarı bağımsız ve beyaz boya miktarı bağımlı değişken olmak üzere aşağıdaki soruları cevaplayınız.


a) Aşağıdaki dik koordinat sisteminde f, g ve h fonksiyonlarının grafik temsilleri verilmiştir. Verilen grafiklerin hangi fonksiyona ait olduğunu bulunuz.



b) b katsayısının alacağı değeri bulunuz.

c) a ve c katsayılarının alabileceği değerlerin aralıklarını bulunuz.

6. Aşağıdaki grafikte bir güneş enerjisi panelinin zamana (ay) bağlı enerji (kWh) üretim miktarı uygun aralıkta tanımlı f, g, h ve k doğrusal fonksiyonlarıyla ifade edilmiştir.



Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Hangi aylar arasında enerji üretim miktarının arttığını bulunuz.

b) Hangi aylar arasında enerji üretim miktarının azaldığını bulunuz.

c) 7 ve 8. ay ile 8 ve 9. ay arasındaki enerji üretim miktarlarını karşılaştırınız.

ç) 3. aydan 9. aya kadar zamana (ay) bağlı enerji üretim miktarını (kWh) temsil eden parçalı gösterimli fonksiyonun cebirsel temsilini ifade ediniz.

7. Bir fabrikada yaklaşık 180 ml olarak dolum yapılan kutu sütlerin gerçek hacimlerinde belirli bir hata payı olabileceği öngörülmektedir. Bu hata payının en fazla 5 ml olduğu bilindiğinden bir kutu sütün gerçek hacminin $[175, 185]$nda olduğu ifade edilmektedir. Bir kutu sütün gerçek hacmine (ml) bağlı hata payını (ml) ifade eden fonksiyon f olsun.


Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) f fonksiyonunun tanım ve görüntü kümelerini belirleyiniz.

b) f mutlak değer fonksiyonunu cebirsel olarak ifade ediniz.


c) f fonksiyonunun sıfırını bulup parçalı gösterimini yazınız.

ç) f fonksiyonunun grafiğini çiziniz.



d) f fonksiyonunun bire bir olup olmadığını bulunuz.

8. Görseldeki gibi aralarında 36 m bulunan Ayhan ve Bilge, saat 12.05'te aynı anda harekete başlayarak aynı yönde 24 dakika boyunca sabit hızla bisiklet sürmüştür. A noktasından hareket başlayan Ayhan'ın dakikada 30 m, B noktasından harekete başlayan Bilge'nin dakikada 27 m yol aldığı bilinmektedir.



Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Ayhan ve Bilge'nin zamana bağlı aralarındaki mesafeyi modelleyen fonksiyonu farklı temsillerle gösteriniz.

b) Fonksiyonun maksimum ve minimum değerlerini, fonksiyonun sıfırını belirleyerek problem bağlamındaki anlamını ifade ediniz.

c) Ayhan ve Bilge'nin aralarındaki mesafe 12 metre olduğunda saatin kaçı göstereceğini bulunuz.

ç) Ayhan ve Bilge'nin aralarındaki mesafenin 6 metre ve 6 metreden daha fazla olduğu anlarda saatin gösterdiği değerlerin aralığını bulunuz.

9. $b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{R}$ olmak üzere gerçek sayılarda tanımlı, cebirsel temsilleri $g(x) = |-3x + b_1|$, $h(x) = |-3x + b_2|$ ve $k(x) = |-3x + b_3|$ olan g, h ve k fonksiyonları veriliyor. g, h ve k fonksiyonlarının sıfırları sırasıyla x_1, x_2, x_3 olmak üzere $x_2 < x_1 < x_3$ şeklindedir.

Buna göre b_1, b_2 ve b_3 değerlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

10. Tereyağı ve etten oluşan bir öğünde kolesterol hastası Semih Bey'in 320 miligramdan fazla kolesterol almasına izin verilmemektedir.

100 gram tereyağında ortalama 215 miligram, 100 gram kırmızı ette ortalama 65 miligram kolesterol vardır.


Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Semih Bey'in bir öğünde tüketeceği 200 gram et ve x gram tereyağı için kolesterol kısıtlamasını ifade eden eşitsizliği yazınız.

b) Semih Bey'in kolesterol kısıtlamasına uyması için bir öğünde yiyeceği 390 gram etle birlikte tüketeceği tereyağı miktarının en fazla kaç gram olabileceğini yaklaşık olarak bulunuz (Yaklaşık değer için virgülden sonra iki basamak alınız.).

11. Ekonomide bir ürünün piyasa fiyatı belirlenirken arz ve talep fonksiyonlarından yararlanılır. Fonksiyonların kesim noktası, denge noktası olarak ifade edilir.

Polar kumaş üretimi yapmak isteyen bir fabrika, kumaşın üretim miktarını ve fiyatını belirlemek istemektedir. Kumaş fiyatına (TL) bağlı üretim miktarını (ton) ifade eden arz ve talep, sırasıyla uygun aralıkta $f(x) = \frac{x}{2} - 3$ ve $g(x) = 21 - x$ şeklinde tanımlı f ve g doğrusal fonksiyonları ile modellenmiştir. Aşağıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.



Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Kumaş üretimi için arz ve talebin denge-de olduğu durumda kaç ton kumaş üretilmesi gerektiğini ve üretilen kumaş fiyatının kaç Türk lirası olması gerektiğini bulunuz.

b) Arzı modelleyen f fonksiyonunun grafiği y ekseni boyunca pozitif yönde 3 birim ötelendiğinde elde edilecek yeni denge noktasına göre kumaşın üretim miktarındaki ve 1 ton kumaşın fiyatındaki değişimi bulunuz.

12. Araç kiralamak isteyen Hatice Hanım, iki şirketle iletişime geçmiştir. 1. şirket 2000 Türk lirası sabit ücret ve kilometre başına 3 Türk lirası, 2. şirket 1500 Türk lirası sabit ücret ve kilometre başına 5 Türk lirası almaktadır.

a) x kilometre kullanılan bir aracın toplam kiralama maliyetini (TL) 1 ve 2. şirket için ifade eden maliyet fonksiyonlarını yazınız.

b) 1 ve 2. şirket için toplam kiralama maliyetini ifade eden maliyet fonksiyonlarının grafiklerini dik koordinat sisteminde çiziniz.

c) Kaç kilometrelik kullanımda 1 ve 2. şirketin aldıkları araç kiralama ücretlerinin eşit olduğunu cebirsel olarak hesaplayıp grafik üzerinde gösteriniz.

ç) En az kaç kilometrelik kullanımda 1. şirketin araç kiralama maliyetinin 2. şirketin araç kiralama maliyetinden daha ekonomik olduğunu bulunuz.

13. Orhan Bey, yaz tatilinde bir tatil köyünde konaklamayı planlamıştır. Tatil köyünde bir gecelik kişi başı ücret 8000 Türk lirası ve yolculuğun sabit gideri 2000 Türk lirasıdır. Orhan Bey, bu tatil için 35 000 Türk liralık bütçe belirlemiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Orhan Bey'in bütçesini aşmayacak şekilde oluşturacağı tatil planını ifade eden eşitsizliği tatil köyünde kalacağı gece sayısına bağlı olarak oluşturunuz.

b) Bütçesini aşmadan tatil köyünde Orhan Bey'in en fazla kaç gece konaklayabileceğini bulunuz.

14. Bir kırtasiye, fotokopi makinesi kiralayacaktır. 2 tane fotokopi makinesi, istediği ölçütlere uygundur. Bu makinelerin çalışma süresine (dk.) bağlı olarak elektrik maliyeti ve sabit depozito bedeli (TL) bilgileri Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1

Fotokopi Makinesinin Markası	Sabit Kiralama Depozito Bedeli (TL)	Çalışma Süresine (dk.) Bağlı Olarak Elektrik Maliyeti (TL)
A	5000	0,25
B	4000	0,65

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) A ve B makinelerinin çalışma süresine (dk.) bağlı toplam maliyetlerini (TL) ifade eden fonksiyonları yazınız.

b) Elde ettiğiniz fonksiyonlardan yararlanarak Tablo 2'de verilen çalışma sürelerine göre A ve B fotokopi makinelerinin toplam maliyetlerini bularak Tablo 2'yi uygun şekilde doldurunuz.

Tablo 2

Çalışma Süresi (dk.)	1000	1500	2000	2500	3000
A Makinesinin Toplam Maliyeti (TL)					
B Makinesinin Toplam Maliyeti (TL)					


c) A ve B makinelerine ait toplam maliyet fonksiyonlarının grafiklerini dik koordinat sisteminde çiziniz.

ç) A ve B makinelerinin toplam maliyetlerinin kaç dakikalık çalışma süresi sonunda ve kaç Türk lirasında eşitleneceğini grafik gösteriminden yararlanarak bulunuz.

d) A ve B makinelerinin toplam maliyetlerinin kaç dakikalık çalışma süresi sonunda eşitleneceğini cebirsel çözüm yaparak bulunuz.

e) A ve B makinelerine ait 1000, 1500, 2000, 2500 ve 3000 dakikalık çalışma süresi sonundaki toplam maliyetleri karşılaştırarak hangi makinenin daha ekonomik olduğunu belirleyiniz.

15. Aşağıdaki görselde su sebilleri üzerinde duran dik dairesel silindir kaplar verilmiştir.



I ve II numaralı dik dairesel silindir şeklindeki kaplar su ile dolu iken sabit hızda su akıtan musluklar açılmıştır. I ve II numaralı kapların içindeki su yüksekliğinin (cm) zamana (dk.) bağlı değişimi sırasıyla Tablo 1 ve Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 1

Kaptaki Suyun Yüksekliği (cm)	Musluğun Açık Kaldığı Süre (dk.)
40	0
36	1
32	2
28	3
24	4

Tablo 2

Kaptaki Suyun Yüksekliği (cm)	Musluğun Açık Kaldığı Süre (dk.)
30	0
28	1
26	2
24	3
22	4

Tablo 1 ve Tablo 2'de verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) I ve II numaralı kaplara ait zamana (dk.) bağlı su yüksekliğini ifade eden fonksiyonun cebirsel temsilini yazınız.

b) Cebirsel temsilini yazdığınız fonksiyonların grafiklerini $f(x) = x$ şeklinde tanımlı f doğrusal referans fonksiyonunun grafiğine uygun dönüşümleri yaparak çiziniz.

c) Hangi kaptaki suyun daha çabuk tükeneceğini kaplara ait fonksiyonların grafiklerinden yararlanarak bulunuz.


ç) Kaplardaki suların yüksekliklerinin kaçıncı dakikada eşit olduğunu bulunuz.


16-19. çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


16. Bir kayak merkezinde kayakçıların kullanması için yürüyen bant yer almaktadır. Üç kayakçı, yürüyen bandın başladığı yerden yola çıkmıştır. 1. kayakçı, bandın yanındaki zeminde sabit hızla yürümektedir. 2. kayakçı; 1. kayakçı ile aynı sabit hızla ve bandın ilerleme yönünde, bant üzerinde yürümektedir. 3. kayakçı, yürüyen bant üzerinde durarak pistin diğer ucuna gitmektedir. Yürüyen bandın hızı, zeminde sabit hızla yürüyen kayakçının hızının 2 katıdır.


1. kayakçıya ait grafik f, 2. kayakçıya ait grafik g ve 3. kayakçıya ait grafik n fonksiyonu ile gösterilmiştir.


Buna göre zamana (dk.) bağlı olarak bandın başlangıcından pistin diğer ucuna kadar bu kayakçıların aldıkları mesafeyi (m) gösteren fonksiyonların grafik temsilleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)



B)


C)


D)


E)


17. İç mekânları belirli sıcaklık, nem ve hava kalitesi seviyelerine getirme işlemine iklimlendirme denir. İklimlendirilen bir odada yapılan hava sıcaklığı ölçümlerinde zamana (sa.) bağlı sıcaklık (^oC) değerlerindeki değişimi gösteren, uygun aralıkta tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri aşağıda verilmiştir.



Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hava sıcaklığı, 7 saat boyunca 0 ^oC'un altındadır.

B) Hava sıcaklığı, 18 saat boyunca 0 ^oC'un üzerindedir.

C) Hava sıcaklığı, 11 saat boyunca azalmıştır.

D) Hava sıcaklığı, 12 saat boyunca artmıştır.

E) Yapılan ilk ölçüm ile son ölçüm arasındaki sıcaklık farkı 10 ^oC'tur.

18. Görselde verilen haritada doğrusal bir yol üzerinde gerçek sayı doğrusu modellenmiştir. Sayı doğrusu üzerinde Can'ın evinin konumu O noktasıyla, kütüphane ve marketin konumları sırasıyla $K(-5)$ ve $M(3)$ noktalarıyla gösterilmiştir.



Sayı doğrusunda 1 birimlik uzaklık, 100 metreye karşılık gelmektedir. Can'ın kütüphane ve market arasındaki yol üzerinde herhangi bir konumu x, konumuna bağlı bulunduğu noktanın evine olan mesafesini (m) ifade eden fonksiyon f dir.

$a, b, c, d, k, n \in \mathbb{R}$ ve $k \neq 0$ olmak üzere f fonksiyonu $f: (a, b) \longrightarrow [c, d)$, $f(x) = |kx + n|$ **şeklinde tanımlı olduğuna göre** $a + b - c - n + \frac{d}{k}$ **ifadesinin değeri kaçtır?**

A) -8 B) -2 C) 0 D) 3 E) 13

19. Fadime Hanım, evden ofisine doğru sabit hızla yürümeye başlamıştır. Fadime Hanım'ın telefonunu evde unuttuğunu fark eden kızı Derya da bir süre sonra evden çıkmış ve sabit hızla annesi ile aynı yoldan ilerlemeye başlayarak annesi ofise varmadan ona yetişmiştir. Aynı noktadan harekete başlayan Fadime Hanım ve Derya'nın zamana (dk.) bağlı aldıkları mesafeyi (m) gösteren fonksiyonlar sırasıyla f ve d fonksiyonları olsun. Uygun aralıkta tanımlı f ve d fonksiyonlarının cebirsel temsilleri $f(t) = 70t$ ve $d(t) = 90t - 360$ biçimindedir.

Buna göre

I. Derya, Fadime Hanım'dan 4 dakika sonra yola çıkmıştır.

II. Derya, Fadime Hanım'a evden 1260 m uzakta yetişir.

III. Fadime Hanım evden çıktıktan 12 dk. sonra Derya ona yetişmiştir.

ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

Tema ile ilgili daha fazla soru çözmek için karekodu okutunuz.

3. TEMA

Geometrik Şekiller

3.1. Üçgende Açı ve Kenarlarla İlgili Özellikler

▶ Anahtar Kavramlar

- açı
- dış açı
- iç açı
- kenar
- üçgen
- üçgen eşitsizliği

▶ Sembol ve Gösterimler

- $m(\widehat{BAC})$
- $[AB]$
- $|AB|$
- $\perp$
- $//$
- $\overset{\frown}{ABC}$

▶ Bu temada sizden

- üçgende açı ve kenarlarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilmeniz veya ispatlayabilmeniz

beklenmektedir.

Tema boyunca sizden çalışma kâğıtlarındaki soruları çözmeniz, performans görevlerini yerine getirmeniz, ölçme ve değerlendirme sorularını çözmeniz beklenmektedir.



Tema karekodu










Tema sunusuna ulaşmak için karekodu okutunuz.

Başlarken

Mimarlar ve mühendisler, yapıların dayanıklılığını ve kararlılığını artırmak için genellikle üçgen şeklini tercih ederler. Üçgenin özel yapısal özelliklere sahip olması bu tercihin temel nedenlerinden biridir. Üçgen, kenarlarından birinin uzunluğu değiştirilmeden veya eklemlerinden biri kırılmadan deforme olmayan bir geometrik şekildir. Bu nedenle özellikle dikdörtgen yapıları güçlendirmenin etkili yollarından biri, dikdörtgenin köşegen uzunluğu boyunca üçgenler oluşturarak dikdörtgene destekler eklemektir. Bu çapraz destekler, yapıya dayanıklılık ve direnç katmanın yanı sıra yapının kararlı hâle gelmesini sağlar. İki çapraz köşe arasındaki tek bir destek, bir dikdörtgeni iki üçgene dönüştürerek yapıya uygulanan yanal hareketi engeller; deprem veya diğer dış kuvvetlere karşı direnci artırır ve yapıyı güçlendirir. Bu özelliklerinden ötürü üçgenlerden köprülerin ve bina çatılarının yapımında; mobilya, iç mekân tasarımı gibi alanlarda yararlanılır.

Ön Değerlendirme

1. Aşağıdaki tabloda harfler ile verilen geometrik şekilleri numaralandırılmış kavramlarla eşleştirerek doğru harfi kavramın altındaki boşluğa yazınız.

a) 	**b)** 	**c)** 	**ç)** 	**d)** 
e) 	**f)** 	**g)** 	**ğ)** 	**h)** 
1. Dar açı	2. Geniş açı	3. Dik açı	4. Doğru açı	
5. Tam açı	6. İkizkenar üçgen	7. Eşkenar üçgen	8. Dik üçgen	

2. Aşağıda verilen işlem basamaklarını takip ederek boş bırakılan alana uygun çizimi yapınız.

I. $d_1 \mathbin{/\!/} d_2$ olacak şekilde iki doğru çiziniz.

II. Bu doğrulara dik olacak şekilde d_3 doğrusunu çiziniz.


III. $d_1 \cap d_3 = \{A\}$ ve $d_2 \cap d_3 = \{B\}$ olacak şekilde A ve B noktalarını doğrular üzerine yerleştiriniz.

3. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

I. Düzlemde bir d doğrusuna bu doğru üzerinde olmayan bir A noktasından kaç farklı paralel doğru çizilebilir?

II. Bir d doğrusu verilmiş olsun. Bu doğru üzerinde olmayan bir A noktasından doğruya paralel olmayan iki farklı doğru çizildiğinde oluşan şekil hakkında ne söylenebilir? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.

4.




Yandaki şekilde $d_1 \,//\, d_2$ olmak üzere d_1, d_2, k doğruları ve bu doğruların oluşturduğu açılar verilmiştir.

Şekildeki açılar için "ters", "iç ters", "dış ters", "yöndeş", "karşı durumlu" ifadelerinden uygun olanları kullanarak aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

a ile c açıları ..... açılardır.	d ile f açıları ..... açılardır.	a ile e açıları ..... açılardır.
b ile d açıları ..... açılardır.	c ile e açıları ..... açılardır.	b ile f açıları ..... açılardır.
e ile g açıları ..... açılardır.	b ile h açıları ..... açılardır.	c ile g açıları ..... açılardır.
f ile h açıları ..... açılardır.	a ile g açıları ..... açılardır.	c ile f açıları ..... açılardır.


5.



Yandaki şekilde AB // CD, AC // BD, $m(\widehat{EAB}) = 3x - 25^o$ ve $m(\widehat{ABD}) = x + 17^o$ dir.

Buna göre $m(\widehat{BDF}) = \alpha$ nın derece cinsinden değerini bulunuz.

6.



Matematik dersinde öğretmen tahtaya yandaki soruyu çizmiş ve Beren'den soruyu çözmesini istemiştir. Beren, üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının kaç derece olduğunu unuttuğunu söylemiştir. Öğretmen, Beren'e iki paralelin bir kesenle oluşturduğu açılardan faydalanarak soruyu çözebileceği bilgisini vermiştir.

Bunun üzerine Beren görselde gösterildiği gibi AC kenarına paralel ve B noktasından geçen ED doğrusunu çizerek soruyu çözmüştür.

Beren x ile gösterilen açının ölçüsünü kaç derece bulmuştur?

7. Bir ABC üçgeni ve bu üçgenin kenarlarına ait yükseklikleri çiziniz. Çizdiğiniz yüksekliklerin kesişim noktasının

I. ABC üçgeninin iç bölgesinde,

II. ABC üçgeninin bir köşesi üzerinde,


III. ABC üçgeninin dış bölgesinde

olması durumunda ABC üçgeninin açıları bakımından hangi tür üçgen sınıfına gireceğini açıklayınız.

3.1. ÜÇGENDE AÇI VE KENARLARLA İLGİLİ ÖZELLİKLER

Konuya Başlarken

Görselde yandan görünümü üçgen şeklinde olan destek üzerindeki bir tahta parçasının konumunun düzlemsel modellemesi verilmiştir. Desteğin ABC üçgeni, yer düzleminin [KL] ve tahta parçasının [DE] ile ifade edildiği görselde [DE] // [KL] dır. Görseldeki A noktası tahta parçasının desteğe değme noktasıdır. Tahta parçasının üçgenle yaptığı açıların ölçüleri d ve e, üçgenin iç açılarının ölçüleri a, b ve c olarak gösterilmiştir.



Buna göre aşağıdaki sorularla ilgili fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. Hangi açıların ölçülerinin eşit olduğunu gerekçeleriyle belirtiniz.
2. Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı ile doğru açı arasındaki ilişkiden hareketle ulaştığınız sonucu açıklayınız.
3. İkinci soruda ulaştığınız sonucun tüm üçgenlere genellenip genellenemeyeceğini açıklayınız.

Üçgenlerde yer alan açılar ve bu açıların karşılarındaki kenarların uzunlukları arasındaki ilişki, açı-kenar bağıntısı ile tanımlanır. Bu bağıntıya göre bir üçgende büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar bulunur. Bu ilişki, Öklid geometrisinin temel aksiyomları ve trigonometrik teoremler aracılığıyla matematiksel olarak ispatlanabilir. Ayrıca bir üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olması, düzlemsel geometrinin temel özelliklerinden biridir. Bu özellikler, üçgenlerin yapısal tutarlılığını ve evrensel geçerliliğini ortaya koyar.

Üçgende Açılar

Üçgen, geometrinin temel kavramlarından biridir. Bu nedenle üçgenin açılarına ilişkin önermelerin ispatları geometrik teoremler kullanılarak yapılır. Bununla birlikte diğer matematiksel yöntemler de bu ispatlarda sıklıkla kullanılır.


1. Uygulama

Üçgenin İç Açılarının Ölçüleri Toplamı

Aşağıda verilen teoremin ispatına yönelik adımları uygulayınız.

1. Teoremi inceleyiniz.

Teorem: Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180° dir.



Verilenler: ABC üçgeni

İspatlanacak ifade: $m(\widehat{A}) + m(\widehat{B}) + m(\widehat{C}) = 180^o$

2. Teoremin iki paralel doğrunun bir kesenle yaptığı açılar kullanılarak nasıl ispatlanabileceğine ilişkin fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. İkinci adımda karar verdiğiniz ispat yöntemine uygun olarak gerekli çizimleri yapınız ve çiziminizle ilgili açıklamaları yazınız.


4. Yaptığınız çizim sonucunda oluşan açılar ile bu açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız ve matematiksel olarak ifade ediniz.

5. Yaptığınız çizim sonucunda oluşan açılar ile üçgenin iç açıları arasındaki ilişkiyi açıklayınız ve matematiksel olarak ifade ediniz.

6. Dördüncü ve beşinci adımda elde ettiğiniz ilişkileri kullanarak üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamına ilişkin ulaştığınız sonucu yazınız.

7. Teoremin ispatının tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin fikrinizi ispat sürecinde takip ettiğiniz adımlardan hareketle gerekçelendirerek açıklayınız. Ulaştığınız sonuçları arkadaşlarınızla tartışınız.


1. ÖRNEK



Dünya üzerindeki bir yerin Ekvator'a uzaklığının derece, dakika ve saniye cinsinden açısal değeri enlemdir. Kuzey yarım kürede Kutup Yıldızı'nın görünüm açısının ölçüsü, bulunulan enlem derecesini verir.

Yandaki görselde Kutup Yıldızı'nın bulunduğu yer A noktası ile modellenmiştir. $[OA \parallel [PC$ ve yıldızın İstanbul'dan görünüm açısının ölçüsü 41^o dir.

Buna göre İstanbul'un yer aldığı kuzey enleminin alfa açı değerinin kaç derece olduğunu bulunuz.



Çözüm

$[OA \parallel [PC$ olduğundan $m(\widehat{OAP}) = m(\widehat{APC}) = 41^o$ olur.

AOP dik üçgeninde $m(\widehat{A}) + m(\widehat{O}) + m(\widehat{P}) = 180^o$ olduğuna göre $41^o + 90^o + m(\widehat{O}) = 180^o$ ve $m(\widehat{O}) = 49^o$ olur.


$[OA \perp [OB$ olduğundan $\alpha + 49^o = 90^o$ ve $\alpha = 41^o$ olur.

Buna göre İstanbul'un yer aldığı kuzey enleminin alfa açı değeri 41^o olarak bulunur.

1. Sıra Sizde

Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Çözümlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.


1.



Güneş panellerinin güneşten azami verim alabilmesi için güneş ışınlarının panele dik açıyla gelmesi gerekir. Görseldeki güneş paneli, yer düzlemi ile yaptığı açıyı güneş ışınlarının geliş açısına göre ayarlayabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Panelin bulunduğu bölgede güneş ışınlarının yer düzlemine 42^o lik açı ile gelmesi durumunda panelin yer düzlemi ile yaptığı açının ölçüsünün kaç derece olacağını bulunuz.

2.



Yanda verilen ABC üçgeni şeklindeki kâğıt, AB kenarı AC kenarı ile çakışacak şekilde katlandığında B noktası B' noktasına gelmektedir.


$D \in [BC]$, $m(\widehat{ABC}) = 76^o$, $m(\widehat{ACB}) = 40^o$ **ve** $m(\widehat{ADB'}) = x$ **olduğuna göre x değerinin kaç derece olacağını bulunuz.**

2. Uygulama

Üçgenin Dış Açılarının Ölçüleri Toplamı

Aşağıda verilen teoremin ispatına yönelik adımları uygulayınız.

1. Teoremi inceleyiniz.



Teorem: Üçgenin dış açılarının ölçüleri toplamı 360° dir.

Verilenler: ABC üçgeni, ABC üçgeninin dış açılarının ölçüleri x, y, z

İspatlanacak ifade: $x + y + z = 360^o$

2. Teoremin ispatının üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kullanılarak nasıl yapılabileceğine ilişkin fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. Teoremin ispat adımlarının yer aldığı tabloda boş bırakılan alanları aşağıdaki soruları cevaplayarak doldurunuz.

a) Üçgenin aynı köşesine ait iç açı ve dış açılar arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Bu ilişkiye dayanarak tablonun I. adımının gerekçe kısmını doldurunuz. Gerekçenizden hareketle I. adımın ifadeler kısmında üçgenin her bir iç açısının ölçüsünü o açıya komşu olan dış açının ölçüsü türünden matematiksel olarak ifade ediniz.

b) İspatın II. adımında verilen gerekçeden hareketle bu adımda yer alması gereken matematiksel ifadeye ilişkin fikirlerinizi açıklayarak II. adımın ifadeler bölümünü doldurunuz.

c) Tablonun II. adımında yer alan matematiksel ifadeyi üçgenin dış açılarının ölçüleri toplamını ifade edecek şekilde düzenleyerek III. adımın ifadeler bölümünü doldurunuz.

Adım	İfadeler	Gerekçe
I.	ABC üçgeninin iç açılarının ölçüleri $m(\widehat{A}) =$ ..... $m(\widehat{B}) =$ ..... $m(\widehat{C}) =$ ..... bulunur.	
II.		Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180^o dir.
III.		II. adımda elde edilen eşitlik


Siz de farklı doğrulama ve ispat yöntemleri bulmaya çalışarak bulduğunuz yöntemleri sınıfça tartışınız.

2. ÖRNEK

Bir usta iş aletlerini asmak için üç parça çubuğu duvara D, B, C ve E noktalarından vidalamıştır. Zaman içinde D ve E noktalarındaki vidalar yerlerinden çıkmıştır. I ve III numaralı çubuklar sırasıyla B ve C noktaları etrafında döndüğünden D ve E noktaları Şekil 2'de pembe çizgiyle gösterilen yolları izleyerek P noktasında çakışmıştır.



Şekil 1



Şekil 2

Çubukların çakıştığı andaki konumda $2 \cdot m(\widehat{PCE}) = 3 \cdot m(\widehat{PBD})$ ve $m(\widehat{BPC}) = 60^o$ olduğuna göre I numaralı çubuk ok yönünde kaç derece dönmüştür? (Çubuk kalınlıkları dikkate alınmayacaktır.)

Çözüm

I ve III numaralı çubuklar P noktasında çakıştıkları anda PBC üçgeni oluşur. $2 \cdot m(\widehat{PCE}) = 3 \cdot m(\widehat{PBD})$ eşitliğinden $m(\widehat{PCE}) = 3x$ ve $m(\widehat{PBD}) = 2x$ elde edilir. Üçgenin P köşesine ait dış açısının ölçüsü ise $180^o - 60^o = 120^o$ olur. Üçgenin dış açılarının ölçüleri toplamı 360^o olduğundan

$3x + 2x + 120^o = 360^o$

$5x + 120^o = 360^o$


$5x = 240^o$

$x = 48^o$ elde edilir.

$m(\widehat{PBD}) = 2x$ olduğundan

$= 2 \cdot 48^o$

$= 96^o$ bulunur.



Konu ile ilgili etkileşimli içeriğe ulaşmak için karekodu okutunuz.

Konu ile ilgili çalışma kâğıdına ulaşmak için karekodu okutunuz.


3. Uygulama

Üçgenin İç ve Dış Açılarının Ölçüleri Arasındaki İlişki

Aşağıda verilen teoremin ispatına yönelik adımları uygulayınız.

1. Teoremi inceleyiniz.

Teorem: Bir üçgende bir dış açının ölçüsü, kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüleri toplamına eşittir.



Verilenler: ABC üçgeni, ACD dış açısı


İspatlanacak ifade: $m(\widehat{ACD}) = m(\widehat{ABC}) + m(\widehat{BAC})$

2. Teoremin doğrulamasının veya ispatının nasıl yapılabileceğine ilişkin fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşarak tartışınız.

3. Aşağıdaki tablonun boş alanlarına uygun ifadeleri ve gerekçeleri yazarak teoremin ispatını tamamlayınız.

Adım	İfadeler	Gerekçe
I.		ABC üçgeninin iç açılarının ölçüleri toplamı
II.	$m(\widehat{ACD}) + m(\widehat{ACB}) = 180^o$	
III.	$m(\widehat{ACD}) + m(\widehat{ACB}) = m(\widehat{BAC}) + m(\widehat{ABC}) + m(\widehat{ACB})$	
IV.		Sadeleştirme

3. ÖRNEK




21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde gerçekleştirilecek uçurtma şenliği için görseldeki uçurtmayı tasarlayan Mahmut, uçurtmanın köşelerindeki açı ölçülerini aşağıdaki gibi belirliyor.

$m(\widehat{BAC}) = x + 10^o$
$m(\widehat{ABD}) = 3x - 20^o$
$m(\widehat{BDC}) = 5x + 10^o$
$m(\widehat{DCA}) = 80^o - 2x$

Buna göre BDC açısının kaç derece olacağını bulunuz.

Çözüm




Şekildeki $[BD]$, D noktasından $[AC]$na kadar uzatılsın. Uzatılan doğru parçası $[AC]$ ile E noktası üzerinde kesişsin.

$m(\widehat{DEC}) = m(\widehat{BAC}) + m(\widehat{ABD})$
$m(\widehat{DEC}) = x + 10^o + 3x - 20^o$
$m(\widehat{DEC}) = 4x - 10^o$ elde edilir.

$m(\widehat{BDC}) = m(\widehat{DEC}) + m(\widehat{DCA})$
$5x + 10^o = 4x - 10^o + 80^o - 2x$
$5x + 10^o = 2x + 70^o$
$3x = 60^o$
$x = 20^o$ elde edilir. Buradan
$m(\widehat{BDC}) = 5x + 10^o$
$5 \cdot 20^o + 10^o = 110^o$ bulunur.

2. Sıra Sizde



Yandaki şekilde kenarları birbirine paralel olan doğrusal yollar ve bu yolların kesişmesiyle oluşan açı ölçüleri x, y, z, t, w olarak verilmiştir.


Buna göre tabloda verilen ifadelerden doğru olanın karşısına "D", yanlış olanın karşısına "Y" yazınız.

İfadeler	D/Y
$y + w = z$	
$x + y + w = t$	
$x + z = w + y$	


3. Sıra Sizde

Aşağıdaki önermeyi inceleyiniz. Önermenin ispat adımlarının yer aldığı tablonun boş kısımlarına uygun ifade ve gerekçeleri yazarak ispatı tamamlayınız.


Önerme




Şekildeki ABDC dörtgeninde $m(\widehat{BDC}) = x$, $m(\widehat{BAC}) = a$, $m(\widehat{ABD}) = b$ ve $m(\widehat{ACD}) = c$ ise $x = a + b + c$ olur.

Adım	İfadeler	Gerekçe
I.	 $BD \cap [AC] = \{E\}$ olmak üzere B ve D noktalarından geçen doğru çizilsin.	İki üçgen oluşturma
II.		ABE üçgeninde BEC dış açısının ölçüsü, kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüleri toplamına eşittir.
III.	$m(\widehat{BDC}) = x = a + b + c$	

4. ÖRNEK



Şekil 1



Şekil 2


Ayak uzunlukları eşit bir merdivenin Şekil 1 ve Şekil 2'de verilen iki farklı konumu ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. (Merdiven kalınlığı dikkate alınmayacaktır.)


a) Merdiven Şekil 1'deki gibi 40^o açılırsa merdivenin ayaklarından birinin yer düzlemi ile yaptığı geniş açının ölçüsünün kaç derece olacağını bulunuz.

b) Merdiven bir miktar daha açılarak yer düzlemine dik olan duvara Şekil 2'deki gibi dayanıyor. Merdiven ayağının duvar ile yaptığı dar açının ölçüsü 28^o olduğuna göre merdivenin kaç derece daha açıldığını bulunuz.

Çözüm


a) [CP çizildiğinde oluşan ABC üçgeninde $m(\widehat{ABP}) = x$ alınırsa $|AB| = |AC|$ olduğundan $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{ACB}) = 180^o - x$ olur.
Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamından $180^o - x + 180^o - x + 40^o = 180^o$ olur.
Buradan $x = 110^o$ bulunur.






İkizkenar üçgenin taban açılarının ölçüleri birbirine eşittir.

b) [EF] çizildiğinde [EF] ⊥ [FK olduğundan $m(\widehat{DFE}) = 90^o - 28^o = 62^o$ dir. $|DE| = |DF|$ olduğundan $m(\widehat{DFE}) = m(\widehat{DEF}) = 62^o$ dir. Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamından $m(\widehat{EDF}) + 62^o + 62^o = 180^o$ olur. $m(\widehat{EDF}) = 56^o$ olduğu için buradan merdivenin $56^o - 40^o = 16^o$ daha açıldığı bulunur.



5. ÖRNEK




Yandaki şekilde $|AB| = |AC|$, $|BD| = |BC|$ ve $m(\widehat{BAC}) = 50^o$ dir. A, D, C noktaları doğrusal olduğuna göre $m(\widehat{ABD}) = x$ değerini bulunuz.

Çözüm

ABC üçgeninde $|AB| = |AC|$ olduğundan
$m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{ACB})$ dür.


Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı
$m(\widehat{ABC}) + m(\widehat{ACB}) + 50^o = 180^o$ olduğundan
$m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{ACB}) = 65^o$ olur.

BDC üçgeninde $|BD| = |BC|$ olduğundan
$m(\widehat{BCD}) = m(\widehat{BDC}) = 65^o$ dir.



Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı $65^o + 65^o + m(\widehat{DBC}) = 180^o$ olduğundan $m(\widehat{DBC}) = 50^o$ olur. Buradan $x = 65^o - 50^o = 15^o$ bulunur.


4. Sıra Sizde



Yandaki şekilde [CD], $\widehat{BCA}$ nın açıortayı ve $m(\widehat{BAC}) = 36^o$, $m(\widehat{BDC}) = 72^o$, $|BD| = x$ birim, $|AC| = y$ birim, $|BC| = 4$ birimdir.


A, D ve B noktaları doğrusal olduğuna göre $y - x$ **değerini bulunuz.**

6. ÖRNEK




Yandaki şekilde FBD üçgen, ABC eşkenar üçgen, $\{E\} = [FD] \cap [AC]$ ve $|EC| = |CD|$ olduğuna göre $m(\widehat{AFE}) = x$ değerinin kaç derece olduğunu bulunuz.

Çözüm




Eşkenar üçgenin iç açılarının ölçüsü birbirine eşit ve 60^o dir.


ABC eşkenar üçgeninde
$m(\widehat{A}) = m(\widehat{B}) = m(\widehat{C}) = 60^o$ dir.
ECD ikizkenar üçgeninde
$m(\widehat{ECD}) = 180^o - 60^o = 120^o$ ve
$m(\widehat{CDE}) = m(\widehat{CED}) = 30^o$ olur.
FBD üçgeninde
$x = m(\widehat{FBD}) + m(\widehat{FDB})$
$x = 60^o + 30^o = 90^o$ bulunur.





7. ÖRNEK



Şekilde A, B ve C ile gösterilen üç farklı yerleşim yerinin kuş bakışı görünüşü ile bir uçağın uçuş rotası verilmektedir. A, B ve C noktaları bir üçgenin köşelerini belirtmektedir. PR doğrusu ise uçağın uçuş rotasını temsil etmektedir. Uçak rotasında ilerlerken üç yerleşim yerine de eşit uzaklıktaki bir T noktasına geldiğinde pilot, uçağın rotası ile yerleşim yerlerinin konumlarını karşılaştıran ekranda aşağıdaki bilgileri gözlemlemiştir.








Buna göre AB ve AC doğru parçaları arasındaki açının ölçüsünün kaç derece olduğunu bulunuz.


Çözüm

A, B, C noktaları T ile birleştirilirse $|AT| = |BT| = |CT|$ olur.



$m(\widehat{BTR}) = 20^o$, $m(\widehat{ATR}) = 80^o$ ve $m(\widehat{CTR}) = 130^o$ dir.
$m(\widehat{CTA}) = 130^o - 80^o = 50^o$ ve $|AT| = |CT|$ olduğundan $m(\widehat{TAC}) = m(\widehat{TCA}) = 65^o$ olur.
$m(\widehat{ATB}) = 80^o - 20^o = 60^o$ ve $|AT| = |BT|$ olduğundan $m(\widehat{TAB}) = m(\widehat{TBA}) = 60^o$ olur.
AB ve AC doğru parçaları arasındaki açının ölçüsü $m(\widehat{BAC}) = 60^o + 65^o = 125^o$ bulunur.


5. Sıra Sizde



Yandaki şekilde ABC eşkenar üçgen, $|DH| = |FH|$, $[AH] \perp [BC]$, $D \in [AB]$, $E \in [AC]$, $H \in [BC]$ ve $m(\widehat{ADE}) = 35^\circ$ olduğuna göre $m(\widehat{BHD}) = x$ değerinin kaç derece olduğunu bulunuz.

Matematik Tarihinden Notlar

Geometriye Katkıda Bulunan Bilim İnsanları



Pisagor (Temsilî) *Sabit bin Kurra (Temsilî)* *Öklid (Temsilî)* *Platon (Temsilî)* *Tales (Temsilî)*

Geometri, matematik öğretim programlarında genellikle muhakeme yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz ve matematiğin aksiyomatik yapısını keşfedebileceğiniz bir alan olarak önemli yer tutar. Geometri alanı size tanımlar ve aksiyomlar kullanarak muhakeme etme, gerekçelendirme ve ispat becerilerinizi geliştirme fırsatı sunar.

Geometrinin tarihçesi Babillilere kadar uzanmaktadır. Özellikle arazi ölçümleriyle ilgilenen Babillilerde geometri alanına ilişkin en eski kayıtlar, belirli dörtgenlerin ölçümüne odaklanmaktadır. Benzer şekilde eski Mısır'da da topraklar, eşit büyüklükte kare parsellere bölünerek halk arasında paylaştırılmış ve halktan paylarına düşen toprak miktarı kadar vergi alınmıştır. Görüldüğü üzere Babilliler ve Mısırlılar, belirli durumları çözmek için belli kurallar aramış; detaylı doğrulama yapma ihtiyacı duymamış ve mükemmel doğruluğa odaklanmamışlardır. Matematiği hem pratikte uygulanabilir bir alan hem de özel bir bilgi alanı olarak görmüşlerdir.

Yunan filozofları Babilliler ve Mısırlılardan farklı olarak matematiği pratik bir uygulama alanı olarak görmemiş, pratikteki uygulamaların mutlak gerçekle ilişkisine odaklanmışlardır. Bu filozofların en önemlilerinden biri olan Miletli Tales, Yunan geometrisinin öncüsü kabul edilir. Tales, geometrinin basitleştirilmesine ve daha anlaşılır hâle getirilmesine büyük katkı sağlamıştır.

Yunan geometrisinde soyut düşüncenin gelişimi "Pisagor Okulu"nun kurulmasıyla hız kazanmıştır. Pisagor'un öğrencileri kendilerine Pisagorcular adını vermiştir. Platon, matematiği Pisagorculardan öğrenmiştir. Matematiğin sistematik bir dil olduğuna ve doğru düşünme için hayati önem arz ettiğine inanan Platon, matematik akademisini kurmuştur. Platon'un akademisinde yetişen ilk önemli matematikçi Öklid'dir. Öklid, çok sayıda eser kaleme almıştır ancak bu eserlerin en önemlisi *Elemanlar* adlı kitap serisidir. On üç ciltten oluşan *Elemanlar*, yüzyıllar boyunca geometrinin temel kaynaklarından biri olarak kabul edilmiştir. Kitabın İslam dünyasında yapılan çevirileri büyük ilgi görmüştür.

Döneminin önde gelen matematikçilerinden biri olan Sabit bin Kurra (836-901), Arapların Öklid'i olarak anılmış ve Öklid'in paralel postulatı üzerine yapılan tartışmalara katılmıştır. Sabit bin Kurra'nın bu konudaki çalışmalarının izleri genellikle 18. yüzyıl matematikçileri Lambert (Lembırt) ve Saccheri'nin (Sakheri) çalışmalarında görülmektedir.

Siz de geometrinin tarihî gelişim sürecine Türk kültür ve medeniyeti dairesinde katkı sağlamış bilim insanlarını (Ebülvefa Buzcani, Kuşyar bin Lebban, Kadızade-i Rumi, Nasirüddin Tusi) ve çalışmalarını araştırınız.

Kontrol Noktası

- Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 180^o olduğuna ilişkin teorem, paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar kullanılarak ispatlanabilir.
- Üçgenin dış açılarının ölçüleri toplamının 360^o olduğuna ilişkin teorem, üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamından yararlanılarak ispatlanabilir.
- "Üçgende bir dış açının ölçüsü, kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüleri toplamına eşittir." teoremi, paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar kullanılarak veya üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamından yararlanılarak ispatlanabilir.

Konu ile ilgili animasyona ulaşmak için karekodu okutunuz.


Üçgende Açı ve Kenar İlişkileri

Bir üçgenin açı ölçülerinin sıralaması biliniyorsa kenar uzunluklarının sıralaması da bilinir. Ayrıca üçgenin kenar uzunlukları arasındaki ilişki, üçgen eşitsizliği olarak ifade edilir. Üçgenin açı ölçüleri ile kenar uzunlukları arasındaki ilişki ve üçgen eşitsizliği, farklı üçgen örnekleri üzerinden ölçümler yapılarak doğrulanabilir.

4. Uygulama

Üçgenin Açı Ölçüleri ve Kenar Uzunlukları Arasındaki İlişki

Aşağıdaki üçgenleri inceleyiniz. Verilen adımları takip ederek soruları cevaplayınız.



1. Her bir üçgenin açıölçer kullanarak açı ölçülerini, cetvel kullanarak kenar uzunluklarını bulunuz ve tabloyu doldurunuz.

ABC Üçgeni		DEF Üçgeni		KMN Üçgeni	
Açı Ölçüleri	Kenar Uzunlukları	Açı Ölçüleri	Kenar Uzunlukları	Açı Ölçüleri	Kenar Uzunlukları
$m(\widehat{A}) =$	a = ...	$m(\widehat{D}) =$	d = ...	$m(\widehat{K}) =$	k = ...
$m(\widehat{B}) =$	b = ...	$m(\widehat{E}) =$	e = ...	$m(\widehat{M}) =$	m = ...
$m(\widehat{C}) =$	c = ...	$m(\widehat{F}) =$	f = ...	$m(\widehat{N}) =$	n = ...

2. Her bir üçgenin iç açı ölçüleri ile bu açıların karşısındaki kenar uzunlukları arasındaki ilişkileri inceleyiniz. Aşağıda verilen genellemelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

a) Bir üçgende iç açı ölçüsü en büyük olan açının karşısında ..... bulunur.


b) Bir üçgende en kısa kenar karşısında ..... bulunur.

c) Bir üçgende iç açı ölçüleri eşit açılar karşısında birbirine ..... bulunur.

3. Ulaştığınız genellemelerin farklı şekilde nasıl doğrulanabileceğine ilişkin fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. Elde ettiğiniz önermelerin matematik yazılımı kullanılarak farklı üçgenler üzerinden doğrulanıp doğrulanamadığını test ediniz.

8. ÖRNEK



Yandaki ABC üçgeninde $|AB| = 5$ cm, $|AC| = 8$ cm ve $|BC| = 4\sqrt{2}$ cm olduğuna göre $m(\widehat{A})$, $m(\widehat{B})$ ve $m(\widehat{C})$ değerlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

Çözüm


$4\sqrt{2} = \sqrt{32}$ ve $\sqrt{64} > \sqrt{32} > \sqrt{25}$

$8 > \sqrt{32} > 5$ olduğundan $|AC| > |BC| > |AB|$ dur.

Uzun kenar karşısında ölçüsü en büyük olan açı bulunduğundan

$m(\widehat{B}) > m(\widehat{A}) > m(\widehat{C})$ olur.

9. ÖRNEK



Yandaki şekilde verilenlere göre a, b, c ve n kenar uzunluklarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

Çözüm

ABC üçgeninde iç açıların ölçüleri toplamı $100^o + 40^o + m(\widehat{ABC}) = 180^o$ olduğundan $m(\widehat{ABC}) = 40^o$ olur.

$m(\widehat{BAC}) > m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{ACB})$ olduğundan $a > b = c$ ..... (1) olur.


BDC üçgeninde iç açıların ölçüleri toplamı $66^o + 46^o + m(\widehat{DBC}) = 180^o$ olduğundan $m(\widehat{DBC}) = 68^o$ olur.

$m(\widehat{DBC}) > m(\widehat{BDC}) > m(\widehat{DCB})$ olduğundan $n > a > m$ ..... (2) olur.


(1) ve (2) den $b = c < a < n$ bulunur.

6. Sıra Sizde

Şekil 1'de verilen üçgen biçimindeki tarlanın sınırlarını belirlemek için önce köşelerine birer direk dikilmiş ve direklerin dikildiği noktalar A, B ve C olarak isimlendirilmiştir. Daha sonra bu direkler arasına gergin tel çekilmiştir. Gergin tellerin ikişerli olarak uç uca eklenmesiyle elde edilen toplam uzunlukların uzundan kısaya doğru sıralanışı Şekil 2'de verilmiştir.



Şekil 1



Şekil 2


Buna göre ABC üçgeninin iç açılarının ölçülerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

5. Uygulama

Üçgen Eşitsizliği

Aşağıda verilen adımları takip ederek soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdaki görselde pembe, yeşil, mavi, sarı renkli çubuklar ve çubukların cm cinsinden uzunlukları verilmiştir.



Buna göre

a) Yukarıdaki çubukların üç tanesi ile uç noktaları birbirine değecek şekilde birleştirilerek kaç farklı üçgen oluşturulabileceğini bulunuz.

b) Hangi renk çubuklar ile üçgen oluşturulamadığını nedenleri ile birlikte yazınız. Cevaplarınızı arkadaşlarınızın cevapları ile karşılaştırınız.

c) Üçgen oluşturabilmek için kullanılacak çubukların uzunlukları arasında nasıl bir ilişki olması gerektiğine dair fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız ve ulaştığınız sonuçları yazınız.

2. Bir üçgenin çizilebilmesi için kenar uzunlukları arasında nasıl bir ilişki olması gerektiğine dair çıkarımlarınızdan hareketle matematik yazılımı kullanarak farklı üçgenler çiziniz. Çizdiğiniz üçgenlerin kenar uzunluklarını ölçerek çıkarımlarınızı doğrulayınız.

10. ÖRNEK


Aşağıda Büşra, Ahmet ve Ceylin'in evlerinin konumlarıyla ilgili bilgiler verilmiştir.

- Büşra, Ahmet ve Ceylin'in evlerinin konumları doğrusal değildir.
- Büşra'nın evinin Ahmet'in evine uzaklığı 7 km'dir.
- Büşra'nın evinin Ceylin'in evine uzaklığı 11 km'dir.

Buna göre Ahmet ile Ceylin'in evleri arasındaki uzaklığın hangi tam sayı değerleri arasında olabileceğini bulunuz.

Çözüm

Ahmet, Büşra ve Ceylin'in evleri arasındaki mesafeler ABC üçgeni olarak modellenirse $|AB| = 7$ km, $|BC| = 11$ km olur. Ahmet ile Ceylin'in evleri arasındaki en kısa mesafe AC kenarının uzunluğudur. Dolayısıyla $|AB| + |BC| > |AC|$ olmalıdır.



ABC üçgeninde iki kenar uzunluğunun toplamı üçüncü kenardan büyüktür. Bu durum, üç farklı şekilde uygulanabilir.

a) $7 + 11 > x$

b) $7 + x > 11$

$x > 11 - 7$


$x > 4$

c) $x + 11 > 7$

$x > -4$

a ve b den $11 - 7 < x < 7 + 11$

$4 < x < 18$ olur.



ABC üçgeninde a, b, c kenar uzunlukları olmak üzere

$|b - c| < a < b + c$

$|a - c| < b < a + c$


$|a - b| < c < a + b$

eşitsizlikleri sağlanır. Bu eşitsizlikler üçgen eşitsizliği olarak adlandırılır.

7. Sıra Sizde



Şekil 1




Şekil 2

Zeynep Şekil 1'de üstten görünümü verilen mutfak masasının bir kenarına paralel olacak şekilde duran çubuk makarnayı masadan almaya çalışmıştır. Bu esnada çubuk makarna kırılarak iki parçaya ayrılmıştır. Bu parçaların birer uçları C ve D noktalarına değmekte, diğer uçları ise E noktasında birleşmektedir. $\frac{|CE|}{|ED|} = \frac{3}{5}$ ve $|CD| = 16$ cm'dir.

Buna göre $|ED|$ nun cm cinsinden cm cinsinden alabileceği kaç farklı tam sayı değeri olduğunu bulunuz.

11. ÖRNEK



Yandaki şekilde ABC ve ACD üçgendir. $|AB| = 6$ cm, $|BC| = |AD| = 8$ cm ve $|CD| = 13$ cm olduğuna göre $|AC|$ nun alabileceği tam sayı değerlerinin aralığını bulunuz.


Çözüm

ABC üçgeninde üçgen eşitsizliği nedeniyle $|8 - 6| < x < 8 + 6$ olduğundan $2 < x < 14$ olur.

ADC üçgeninde üçgen eşitsizliği nedeniyle $|13 - 8| < x < 13 + 8$ olduğundan $5 < x < 21$ elde edilir.


$|AC|$ her iki üçgende üçgen eşitsizliğini sağlayacağı için bulunan aralıkların kesişiminden x in değer aralığı $5 < x < 14$ bulunur.

8. Sıra Sizde

1. 

Yandaki şekilde ABC ve BCD üçgen, $|AB| = 3$ birim, $|AC| = 10$ birim, $|BD| = 7$ birim ve $|DC| = 4$ birim olduğuna göre $|BC|$ nun cm cinsinden alabileceği tam sayı değerlerinin toplamını bulunuz.

2.



Bilal, uzunlukları birbirinden farklı olan mavi, pembe ve sarı renkli üç çıta ile ABC üçgeni oluşturmuştur. Bu üçgenin kenar uzunluklarını karşılaştırmak için evde bulduğu, ölçüleri silinmiş, eski bir cetveli kullanmıştır. D, E ve F noktaları çıtaların orta noktaları olmak üzere cetveli her bir çıtanın üzerine yerleştirdiğinde yandaki şekil ortaya çıkmıştır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. (Çıta kalınlıkları dikkate alınmayacaktır.)

a) Üçgenin iç açılarının ölçülerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

b) En kısa çıtanın uzunluğunun 60 cm, cetvelin uzunluğunun 40 cm olduğu durumda üçgenin çevre uzunluğunun cm cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değerini bulunuz.

6. Uygulama


Teknoloji Uygulaması

Aşağıda verilen önermeyi inceleyiniz. Verilen adımları sırasıyla uygulayarak soruları cevaplayınız.

Önerme


ABC bir üçgen ve D üçgenin iç bölgesinde bir nokta ise

$|DB| + |DC| < |AB| + |AC|$ dur.



Matematik yazılımı ile ilgili videoya ulaşmak için karekodu okutunuz.

1. Bilgisayar veya etkileşimli tahtada matematik yazılımını açınız.
2. **Araçlar** bölümünden **Çokgen** aracını seçiniz ve ABC üçgenini oluşturunuz.
3. **Araçlar** bölümünden **Nokta** aracını seçerek ABC üçgeninin iç bölgesinde bir D noktası belirleyiniz.
4. **Araçlar** bölümünden **Doğru Parçası** aracını seçerek $[DB]$ ve $[DC]$ nı çiziniz.
5. **Ölçüm** bölümünden **Uzaklık veya Uzunluk** aracını seçerek sırasıyla $[DB]$, $[DC]$, $[AB]$, $[AC]$ nın uzunluklarını belirleyiniz.



6 ve 7. soruların cevaplarını tabloda uygun yere yazınız.

$\|DB\|$	$\|DC\|$	$\|AB\|$	$\|AC\|$	$\|DB\|+\|DC\|$	$\|AB\|+\|AC\|$

6. 5. adımda elde ettiğiniz uzunluk değerlerini yukarıdaki tablonun ilk satırına yazınız. Bu değerleri kullanarak $|DB|+|DC|$ ve $|AB|+|AC|$ toplamlarını hesaplayınız. Elde ettiğiniz değerleri tabloya yazınız.

7. D noktasını üçgenin iç bölgesinde kalacak şekilde hareket ettirerek [DB], [DC], [AB], [AC] nın uzunluklarındaki değişimi gözlemleyiniz. Elde ettiğiniz değerleri tabloya yazınız.

8. Tabloyu inceleyerek yukarıdaki önermede verilen $|DB|+|DC|$ ve $|AB|+|AC|$ arasındaki ilişkinin doğru olup olmadığına ilişkin fikrinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. D noktası A noktası ile çakışırsa nasıl bir sonuç elde edileceğini açıklayınız.

9. Önerme başka bir yol kullanılarak nasıl doğrulanabilir? Açıklayınız.


9. Sıra Sizde

Aşağıda verilen önermenin doğrulamasını matematik yazılımı kullanarak yapınız.

Önerme: Bir üçgenin içinde alınan bir noktanın üçgenin köşelerine uzaklıkları toplamı üçgenin çevresinin uzunluğundan küçük, çevresinin uzunluğunun yarısından büyüktür.

Konu ile ilgili animasyona ulaşmak için karekodu okutunuz.

Kontrol Noktası



Bir üçgende en uzun kenar karşısında ölçüsü en büyük açı, en kısa kenar karşısında ölçüsü en küçük açı bulunur. Bu ifadenin tersi de doğrudur.

Yandaki şekilde $a > b > c$ ise $m(\widehat{A}) > m(\widehat{B}) > m(\widehat{C})$ dür.

Bir ABC üçgeninde a, b, c kenar uzunlukları olmak üzere

$|b-c| < a < b+c$

$|a-c| < b < a+c$

$|a-b| < c < a+b$

eşitsizliklerinin her üçü de sağlanır.

Performans Görevi

Üçgenlerin Gerçek Hayat ve Geometrik Problemlerde Kullanımı

Bu görevde sizden üçgenlerin açı ve kenar özelliklerini kullanarak gerçek hayat problemlerini çözmeniz, geometrik ispatlar yapmanız ve görsel sanatlar, mimari veya mühendislik gibi alanlarda üçgenlerin kullanımını analiz etme becerilerinizi geliştirmeniz beklenmektedir. Üçgenlerle ilgili önermeleri doğrulamanız, bu önermeleri kullanarak yeni problemler oluşturmanız ve oluşturduğunuz problemlere çözümler sunmanız istenmektedir.

Göreve başlamadan önce aşağıdaki hususa dikkat ediniz.

Üçgenlerin açı ve kenar özellikleriyle ilgili en az iki önerme belirleyiniz.

Görev esnasında aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

1. Önermelerin Belirlenmesi ve Doğrulanması

- Belirlediğiniz önermeleri geometrik ispatlarla veya somut örneklerle doğrulayınız.
- Görsel materyaller (çizimler, diyagramlar) kullanarak doğrulama sürecinizi adım adım açıklayınız.

2. Gerçek Hayat Problemlerinin Analizi

- Görsel sanatlar, mimari veya mühendislik gibi alanlarda genlerin kullanımına ilişkin en az iki örnek bulunuz.
- Bulduğunuz örnek yapılarda üçgenlerin kullanım amacını açıklayınız.
- Üçgenlerin açı ve kenar özelliklerinin bu yapılara nasıl katkı sağladığını analiz ediniz.
- Analizlerinizi desteklemek için görseller (fotoğraflar, çizimler) kullanınız.

3. Yeni Problem Durumları Oluşturma ve Çözme

- Üçgenlerin açı ve kenar özelliklerini kullanarak gerçek hayat veya geometrik problemlerle ilgili iki yeni problem durumu oluşturunuz.
- Bu problemleri adım adım çözünüz. Çözümlerinizde üçgenlerin özelliklerinden nasıl yararlandığınızı açıklayınız.
- Problemlerinizi çözerken görsel materyaller kullanınız.

4. Eleştirel Düşünme ve Yorumlama

- Yaptığınız çalışmaları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendiriniz.
- Üçgenlerin farklı alanlarda kullanımına ilişkin kişisel yorumlarınızı görev sonunda hazırlayacağınız rapora ekleyiniz.

Görev bitiminde aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.


- Tüm çalışmalarınızı bir rapor hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Performans göreviniz aşağıdaki karekodda verilen analitik dereceli puanlama anahtarı ile öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir.

Analitik dereceli puanlama anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

Matematik Tarihinden Notlar

Atatürk ve Geometri




Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı *Geometri* adlı kitap, Türkiye'deki geometri öğretiminin kilometre taşlarından biridir. 3 bölümden oluşan 44 sayfalık bu kitapta birçok geometrik kavram tanıtılmıştır. Atatürk, bu önemli eserinde Arapça ve Farsça kökenli geometri terimleri yerine çoğu günümüzde kullanılmaya devam eden Türkçe geometri terimleri üretmiştir. Bu terimlerin bazıları içinse günümüzde farklı kullanımlar söz konusudur [zâviyetân-ı mütevâfıkatân yerine yöndeş açı, re'sen mütekabil zâviye yerine ters açı, kaim zaviyeli müselles yerine dikey üçgen (günümüzde dik üçgen), müselles-i mütesâviyü'l-adlâ yerine eşkenar üçgen, müselles-i mütesâviyü'ssâkeyn yerine ikizkenar üçgen gibi]. Türk milletini muasır medeniyet seviyesine ulaştırmayı temel gayesi edinen Mustafa Kemal Atatürk, bu çalışmasıyla zaviyetan-ı mütekabiletan-ı dahiletan (iç ters açılar) gibi terimlere dönülmemesini ve dünyada kabul gören çağdaş eğitim literatürüyle uyumlu bir eğitim sisteminin hayata geçirilmesini hedeflemiştir.

Konu ile ilgili etkileşimli içeriğe ulaşmak için karekodu okutunuz.

Alıştırmalar


1. Aşağıdaki şekilde ABC üçgen, MLC eşkenar üçgen, $[KL] \parallel [BC]$ olarak veriliyor.

$m(\widehat{AKL}) = m(\widehat{KAM}) = m(\widehat{LAM})$ ve K, L, M noktaları ABC üçgeninin kenarları üzerindedir.




Buna göre $m(\widehat{LMA})$ nün kaç derece olduğunu bulunuz.

2. Aşağıdaki şekilde ECF üçgen, $E, C \in [AB]$, $F \in [CD]$, $m(\widehat{EFD}) = 160^o$ ve $5m(\widehat{AEF}) = 6m(\widehat{ECF})$ dür.



Buna göre $m(\widehat{FCB})$ nün kaç derece olduğunu bulunuz.

3. Aşağıdaki ABC üçgeninde $m(\widehat{B}) = 2x + 5^o$, $m(\widehat{C}) = x + 15^o$, $|AC| > |AB|$ ve x bir tam sayıdır.



Buna göre $m(\widehat{A})$ nün derece cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değerini bulunuz.

4. Aşağıdaki adımları takip ederek çiziminizi oluşturunuz ve soruyu oluşturduğunuz çizime göre cevaplayınız.


I. A açısı geniş açı olacak şekilde bir ABC üçgeni çiziniz.

II. BC kenarı üzerinde $|AE| = |BE|$ olacak şekilde bir E noktası işaretleyiniz.

III. BC kenarı üzerinde $|AF| = |FC|$ olacak şekilde bir F noktası işaretleyiniz.

$m(\widehat{EAF}) = 24^o$ ise $m(\widehat{BAC})$ nün kaç derece olduğunu bulunuz.

5. ABE bir üçgen olmak üzere özdeş kibrit çöpleri aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi yerleştirildiğinde $m(\widehat{BAC}) = a, m(\widehat{CBD}) = b, m(\widehat{DEC}) = c$, $C \in [AE]$ ve $D \in [BE]$ olur.



Buna göre


I. $\frac{a}{3} = c$

II. $b = 2c$

III. $b + c = a$


ifadelerinden hangilerinin doğru olduğunu bulunuz. (Kibrit çöplerinin kalınlığı dikkate alınmayacaktır.)

6. Aşağıda verilen ABC üçgeninde $D \in [BC]$, $m(\widehat{BAD}) = 80^o$, $m(\widehat{BDA}) = 60^o$ ve $m(\widehat{DAC}) = 20^o$ dir.




Buna göre b, c, m, n ve p kenar uzunluklarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

7. Amblem tasarımı yapan Hikmet, Şekil 1'de gösterilen ikizkenar üçgen biçimindeki dört özdeş kartonu bir masa üzerinde aralarında boşluk bırakmadan birleştiriyor. Tepe açısının ölçüsü 22^o olan dört kartonu birleştirdiğinde meydana gelen boşluğa ise taban açılarının ölçüsü x olacak şekilde kırmızı renkli ikizkenar üçgeni yerleştiriyor ve Şekil 2'deki deseni elde ediyor.




Şekil 1



Şekil 2


Buna göre x in derece cinsinden değerini bulunuz.

8. Aşağıda verilen ABC üçgeninde $|BC| = 11\,cm$, $|AC| = 8\,cm$ ve $m(\widehat{BAC}) > m(\widehat{ACB})$ dür.




Verilenlere göre $|AB|$ nun alabileceği kaç farklı tam sayı değeri olduğunu bulunuz.

9. Şekil 1'de ABC üçgeni olarak gösterilen üçgen biçimindeki kâğıdın ön yüzü sarı, arka yüzü turuncu renklidir. ABC üçgeninde $m(\widehat{BAC}) = 70^o$, $m(\widehat{ABC}) = 50^o$ ve $m(\widehat{ACB}) = 60^o$ dir. Bu kâğıdın B köşesinin A köşesinin üzerine gelecek biçimde katlanmasıyla oluşan görüntü Şekil 2'de verilmiştir. B, D, C noktaları doğrusaldır.




Şekil 1



Şekil 2


Buna göre $|AC|$, $|AE|$ ve $|BD|$ nu küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

10. Afrika'da gece safarisine çıkan bir grup; A noktasındaki kamp alanından başlayarak sırasıyla B noktasındaki filleri, ardından C noktasındaki aslanları görmüş ve tekrar kamp alanına dönmüştür. Grubun safaride izlediği yol Şekil 1'de ABC üçgeninin kenarları olarak belirlenmiştir.



Şekil 1

Grup, safari boyunca yönünü pusula ile belirlemiştir. A noktasından B noktasına, B noktasından C noktasına gidilirken pusulanın daima kuzeyi gösteren ibresi ile grubun izlediği yol arasındaki açılar Şekil 2'de gösterilmiştir.



Şekil 2

$|AC| = |BC|$ olduğuna göre $m(\widehat{ACB})$ nün kaç derece olduğunu bulunuz.

Konu ile ilgili daha fazla soru çözmek için karekodu okutunuz.

Farklı Kaydet

Bu temada öğrendiğiniz bilgileri kendi hatırlayacağınız şekilde bu alana kısaca not edebilirsiniz.


Ölçme ve Değerlendirme

Bu bölümde cevaplamanız için farklı soru tiplerinde 14 adet soru bulunmaktadır.
Ölçme ve değerlendirme bölümünün sonunda verilen karekodu okutarak ek sorulara ulaşabilirsiniz.

1. Mert, evindeki mantar panoya okulunun isminin yazılı olduğu üçgen flamayı Şekil 1'deki gibi A, B ve C köşelerinden asmıştır. A ve B köşelerindeki raptiyelerin zaman içinde düşmesi ile flama Şekil 2'deki gibi A, C, B' noktaları doğrusal olacak biçimde panoda asılı kalmıştır.



Şekil 1



Şekil 2


$m(\widehat{A'B'B}) = 24^o$ **olduğuna göre** $m(\widehat{CBB'})$ **nün kaç derece olduğunu bulunuz.**

2. Aşağıda bir yönetmen sandalyesi görseli verilmiştir. Bu sandalyenin ayakları arasında oluşan ABC üçgeni görsel üzerinde gösterilmiştir.



$|AB| = |AC|$ **ve** $|BC| > |AB|$ **olduğuna göre ABC üçgeninin iç açı ölçülerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.**

3. Türkiye, enerji piyasasındaki gücünü artırmak ve enerji bağımsızlığı yolunda hızla ilerlemek için Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama çalışmaları yapmaktadır.



Yukarıdaki görselde Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin aramalar sırasında izlediği rota ABC, DEF üçgenleri ile modellenmiştir.


ABC üçgeninde $m(\widehat{CAB}) = 75^o$, $m(\widehat{ABC}) = 65^o$, DEF üçgeninde $|DE| = 170$ m, $|EF| = 180$ m ve $|DF| = 200$ m olarak verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) ABC üçgeninde <u>en uzun</u> kenarı bulunuz.

b) DEF üçgeninde hangi açının ölçüsünün <u>en büyük</u> olduğunu bulunuz.


4. Aşağıda harita üzerinde gösterilen ABC üçgeninin köşeleri, Çeşme ilçesinin merkezi ile Mykonos (Mikonos) ve Sisam adalarının merkezlerini belirtmektedir.



$m(\widehat{ACB}) > m(\widehat{BAC})$, Mykonos-Sisam ve Çeşme-Sisam arası kuş uçuşu uzaklıklar sırasıyla 230 km ve 130 km'dir.

Buna göre Çeşme'den Mykonos'a kuş uçuşu uzaklığın alabileceği değer aralığını bulunuz.


5. Pruvadaki açıyı ikiye katlama, denizcilikte kıyıda sabit duran bir cisim ile gemi arasındaki mesafeyi tahmin etmek için kullanılan bir yöntemdir. Aşağıdaki görselde B noktasında bir deniz feneri ve AC doğrusu boyunca hareket eden, saatteki hızı 15 deniz mili olan bir geminin A noktasındaki görüntüsü verilmiştir.




Kaptan, gemi A noktasındayken [AC] ile [AB] arasındaki dar açının ölçüsünü 18^o olarak hesaplıyor. Gemi 2 saat doğrusal yol alıp C noktasına vardığında [CB] ile [CD] arasındaki dar açının ölçüsünü 36^o olarak hesaplıyor.

Buna göre gemi, C noktasından deniz fenerine doğru saatte ortalama 10 deniz mili hızla doğrusal hareket ederse deniz fenerine kaç saat sonra ulaşır?

6. Aşağıdaki görselde bir havaalanındaki pistlerin yukarıdan görünümü verilmiştir. Her pistin başında ve sonunda pist numaraları yazmaktadır. Pist numaraları, pistin saat yönünde kuzeyle yaptığı açıya göre belirlenmektedir. Pistin kuzeyle yaptığı açının birler basamağındaki 0 rakamı silindikten sonra oluşan numara, pist numarası olarak pistin başına yazılmaktadır. Havaalanı pistleri her zaman doğrusaldır. Bu nedenle pistin başında ve sonunda bulunan sayılar arasındaki fark her zaman 18'dir.




Görselde 3/21 pisti olarak adlandırılan pistin kuzeyle yaptığı açıların ölçülerinin modellemesi verilmiştir. Modellemeye göre pistin 3 yazan tarafı, kuzey yönü ile saat yönünde 30^o lik; 21 yazan tarafı ise 210^o lik bir açı yapmaktadır ve 8/26 pisti ile x/y pistinin arasında kalan dar açının ölçüsü 70^o dir.




Buna göre görseldeki havaalanında bulunan x/y pistinin adlandırılmasında kullanılan x ve y sayılarının toplamını bulunuz.

7. Erkan'ın Şekil 1'de verilen renkli kalemlerinin uzunlukları sırasıyla 3, 5, 6, 8 ve 12 cm'dir.



Şekil 1



Şekil 2


Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. (Kalemlerin kalınlıkları dikkate alınmayacaktır.)

a) Erkan'ın bu kalemlerden herhangi üçünü kullanarak kaç farklı üçgen oluşturabileceğini bulunuz.

b) Erkan, kahverengi ve mavi kalemleri Şekil 2'deki gibi $\alpha > 90^o$ olacak biçimde düz bir zemine yerleştirmiştir.

Erkan'ın Şekil 2'deki üçgeni tamamlayabilmesi için Şekil 1'deki kalemlerden kaç tanesini kullanabileceğini bulunuz.

8. Aşağıdaki görselde nehir ağızlarını temizlemek ve nehirleri atıklardan arındırmak için kullanılan bir araç verilmiştir. Araç operatörü, AC kolunu C noktası etrafında hareket ettirerek uzunluğu sabit çelik halatla vincin ucundaki toplama kafesini indirip kaldırabilmektedir.




Görselde $|AC| = 12$ m, $|CB| = 20$ m ve toplama kafesi su yüzeyinde olduğuna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Toplama kafesi suyun içine girerken A ve B noktaları arasındaki çelik halatın uzunluğu azalır mı, artar mı? Yorumlayınız.

b) A ve B noktaları arasında halatın uzunluğunun m cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değerini bulunuz.

c) ACB açısının ölçüsü BAC açısının ölçüsünden büyük değerler almaya başladığında kafesin B noktasına uzaklığı nasıl değişir? Yorumlayınız.

9. Aşağıdaki görselde Ercan'ın evinin, okulunun ve kırtasiyenin konumları gösterilmiştir. Okula gitmek için evden çıkan Ercan önce kırtasiyeye uğraması gerektiğini hatırlamış, kuzey doğrultusu ile 42^o lik açı yaparak kuzeybatı yönünde doğrusal şekilde 150 metre yürümüş ve kırtasiyeye ulaşmıştır. Kırtasiyeden çıktıktan sonra kuzey doğrultusu ile 56^o lik açı yaparak kuzeydoğu yönünde 150 metre yürümüş ve okula ulaşmıştır.



Buna göre Ercan'ın evden çıkıp doğrudan okula gitmek istemesi durumunda kuzey doğrultusu ile kaç derecelik açı yaparak kuzeydoğu yönünde yol alabileceğini bulunuz. (Yol genişliği dikkate alınmayacaktır.)


10. Bir ABC üçgeninde BC kenarına ait kenar orta dikme BA kenarını E noktasında, BC kenarını D noktasında kesmektedir.

$|BE| = |AC|$, $m(\widehat{ABC}) = 35^o$ **olduğuna göre BAC açısının ölçüsü kaç derecedir?**


A)60 B)65 C)70 D)75 E)80

11. Şekil 1'deki sepetli ağaç budama aracı üzerindeki platform A, B ve C noktalarındaki rulmanlar yardımıyla katlanarak araç üzerine yerleştirilebilmektedir. AB ve BC uzunlukları sabittir. Şekil 1'de $m(\widehat{ABC}) = \frac{9}{2}m(\widehat{BAD})$ dür.

Budama işlemi bittikten sonra platform, rulmanlar yardımıyla A ve B noktalarından katlanarak Şekil 2'deki gibi $[B'C'] \,//\, [BC]$ olacak biçimde araç yüzeyine dik konuma getirildiğinde $m(\widehat{BB'C'}) = 30^o$ olmuştur.



Şekil 1




Şekil 2

Verilenlere göre $m(\widehat{BAD}) = x$ kaç derecedir?

A)13 B)18 C)27 D)33 E)42

12. Şekil 1'deki ön yüzü turuncu, arka yüzü mavi olan üçgen şeklindeki kâğıt, AB ve AC kenarları çakışacak biçimde katlandığında Şekil 2'deki görüntü elde edilmektedir.



$m(\widehat{ACB}) = 48^o$, $D \in [BC]$ ve $|AD| = |AB'|$ olduğuna göre ABC açısının ölçüsü kaç derecedir?

A)62 B)66 C)76 D)84 E)86

13. Aşağıda üçgenlerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

I. Her üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı, bir doğru açının ölçüsüne eşittir.

II. Kenar uzunlukları $|BC| = 12$ cm, $|AC| = 5$ cm ve $m(\widehat{ACB}) = 30^o$ olan bir ABC üçgeni çizilebilir.


III. İç açılarının ölçüleri sırasıyla 1, 2 ve 3 sayıları ile orantılı olan bir üçgenin en küçük dış açısı dik açıdır.

IV. İkizkenar üçgenlerde tepe açısına ait dış açıortay, üçgenin tabanını keser.

Bu ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III
D) I, II, III E) II, III, IV

14. Aşağıdaki görselde bir otobüsün ring seferi yaptığı yol ve bu yol üzerindeki duraklar verilmiştir. Otobüs; otelden aldığı yolcuları lunaparka, lunaparktan aldığı yolcuları ören yerine ve ören yerinden aldığı yolcuları tekrar otele doğrusal yolları takip ederek getirmektedir. Otobüs, lunapark ve ören yeri duraklarında sırasıyla 10 ve 8 dakika beklemiş; yol boyunca başka bir durakta durmayıp duraklar arasında aynı sabit hızla hareket etmiştir.



Otobüsün otel durağından harekete başlayıp tekrar aynı durağa varma süresi 1 saat olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Otobüs otelden hareket ettikten 30 dakika sonra ören yerine ulaşmıştır.

B) Lunapark ile ören yeri arası yolculuk 16 dakika sürmüştür.

C) Ören yeri ile otel arası yolculuk 19 dakika sürmüştür.

D) Otel ile lunapark arası yolculuk, lunapark ile ören yeri arasındaki yolculuktan uzun sürmüştür.

E) Yolculuk süresinin en uzun olduğu güzergâh ören yeri ile otel arasıdır.

Tema ile ilgili daha fazla soru çözmek için karekodu okutunuz.

SÖZLÜK

A-D

akyuvar	:	Kan, lenf gibi vücut sıvılarında bulunan çekirdekli, yuvarlak hücre.
alyuvar	:	Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre.
apsis	:	Düzlemdeki bir noktayı belirten sıralı ikilinin birinci bileşeni.
aralık	:	Birbirinden farklı iki sayı arasındaki gerçek sayıların belirttiği küme.
arz	:	Piyasaya mal sürülmesi, sunu.
atom	:	Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık.
deniz feneri	:	Kıyıların tehlikeli yerlerinde, bazı kaya ve adacıkların üzerinde geceleri deniz taşıtlarına yol gösteren, tepesinde güçlü bir ışık kaynağı olan ışık kulesi; fener.
denklem	:	İçinde yer alan bazı niceliklere ancak uygun bir değer verildiği zaman sağlanabilen eşitlik; muadele.
dik koordinat sistemi	:	Tüm eksenleri birbirine dik olan koordinat sistemi.
direnç	:	Bir nesnenin elektrik akımına karşı dayanma özelliği; mukavemet, rezistans.
düzlem	:	Üzerine, kesişen iki doğrunun her noktasının dokunması gereken yüzey, müstevi.

G-H-I

genel ağ	:	Dünya üzerindeki tüm bilgisayarların birbirine bağlanmasını sağlayan genelleştirilmiş bilgi iletişim ağı.
hipotez	:	Deneylerle henüz yeter derecede doğrulanmamış ancak doğrulanacağı umulan kuramsal düşünce.
hüküm	:	Bir yargı bildiren önerme.
ışık yılı	:	Işığın bir yılda aldığı yol.

K-M-O-Ö

kalori	:	Besinlerin, dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık ve enerjisini sağlama değerlerini gösteren ölçü.
kolesterol	:	Kanda ve büyük ölçüde ödde bulunan, besinlerle alınan sterol.
kurye	:	Posta, kargo, mektup vb. gönderileri alıcıya ulaştıran kimse.
kuş bakışı	:	Yüksek bir yerden aşağıya doğru, bütün genişliği içine alacak biçimde bakış.
mil	:	Türlü işlerde kullanılmak için yapılan ince ve uzun metal çubuk.
model	:	Resim, heykel vb. yapılırken baka baka benzetilmeye çalışılan nesne veya kimse, örnek.

mutlak değer	:	Sayı doğrusu üzerinde alınan bir sayının başlangıç noktasına olan uzaklığı.
ordinat	:	Bir noktanın uzaydaki yerini belirten sıralının ikinci bileşeni.
önerme	:	Doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadeler.
ören	:	Ait olduğu eski uygarlık hakkında fikir edinmemizi sağlayan kültür ve tabiat kalıntılarından oluşan alan.
özdeşlik	:	İki yanı birbirinin aynı olan veya harflerle verilen sayısal değerler ne olursa olsun iki yanı da sayıca eşit değerler alan eşitlik.

P-R-T

paralel	:	Aynı düzlem içinde ikişer ikişer bulunan ve kesişmeyen, koşut, muvazi, mütevazi.
parçalı gösterimli fonksiyon	:	Tanım kümesinin alt aralıklarında farklı cebirsel temsillerle ifade edilen fonksiyon.
peron	:	Otobüs terminallerinde aracın yanaştığı, yolcuların inip binmesine yarayan bölüm.
pilotaj	:	Bir hava taşıtını yönetme.
plazma	:	Kanda alyuvarlarla akyuvarların içinde bulunduğu sıvı.
pruva	:	Geminin veya sandalın ön tarafı, baş bölümü.
ring	:	Başlangıç ve sonu aynı nokta olan (sefer).
rulman	:	Mekanik ve elektrikli sistemlerde kayma sürtünmesi yerine bir yuvarlanma sürtünmesi sağlayarak enerji kayıplarını azaltmak için yataklar ile muylular arasına yerleştirilen parça.
teorem	:	Doğruluğu kanıtlanabilen önerme.

KAYNAKÇA

Akkuş, R., Boz Yaman B., Bulut S., Duatepe Paksu A., ve Toluk Uçar Z. (2022). *Geometri öğretim bilgisi*. Ankara: Pegem Akademi.

Atatürk, M. K. (2020). *Geometri*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Boynton, R. (2001, Mayıs). Precise measurement of mass. *60th Annual Conference of the Society of Allied Weight Engineers (Vol. 204)* konferansında sunulan bildiri, Arlington, Texas.

Burton, D. M. (1985). *The history of mathematics: An introduction.* Newton, MA: Allyn Bacon.

Bütüner, A. S. (2009). Kemal ATATÜRK, Geometri, Kitap İncelemesi. *Elementary Education Online, 8*(1), 2.

Çengel, Y. A., Boles, M. A., ve Kanoğlu, M. (2019). *Thermodynamics: An Engineering Approach (9. bs.)*. New York, NY: McGraw-Hill Education.

Gillings, R. J. (2019). Mathematics in the time of the pharaohs. D. M. Campbell (Ed.), *Mathematics: People, problems, results,* (s. 9-17) içinde. Boca Raton, FL: CRC Press.

Haese, M., Humphries, M., Sangwin, C. J., & Vo, N. (2019). *Mathematics: Core topics SL. 1 : for use with IB diploma programme (1. bs)*. Australia: Hease Mathematics.

Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2013). *Fundamentals of Physics (10. bs.)*. New York, NY: Wiley.

Hirt, C., Claessens, S. J., Kuhn, M., & Featherstone, W. E. (2012). Kilometer-resolution gravity field of Mars: MGM2011. *Planetary and Space Science, 67*(1), 147-154.

Hirt, C., & Featherstone, W. E. (2012). A 1.5 km-resolution gravity field model of the Moon. *Earth and Planetary Science Letters, 329*, 22-30.

Hodgkin, L. (2005). *A history of mathematics: From Mesopotamia to modernity.* New York, NY: Oxford University Press.

Imhausen, A. (2020). *Mathematics in ancient Egypt: A contextual history.* Princeton, NJ: Princeton University Press.

Kaler, J. B. (2002). *The Cambridge Encyclopedia of Stars.* New York, NY: Cambridge University Press.

Larson, R., & Edwards, B. H. (2013). *Calculus of a single variable (10. bs.)*. Brooks/Cole.

Mudita, U., & Sherly, M. A. (2022). Analysis of large dam storage capacity and its effect on water demand management in India. *Sustainable Water Resources Management: Proceedings of SWARM 2020* içinde (s. 174-180). Singapore: Springer Nature Singapore.

Rehman, S., Bader, M. A., & Al-Moallem, S. A. (2007). Cost of solar energy generated using PV panels. *Renewable and Sustainable Energy Reviews, 11*(8), 1843-1857.

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar)*. Ankara.

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni.* Ankara

Trotter, M., & Gleser, G. C. (1952). Estimation of stature from long bones of American Whites and Negroes. *American Journal of Physical Anthropology, 10*(4), 463-514.

Kaynakça, APA 6'ya göre hazırlanmıştır.

Cevap anahtarlarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

Genel ağ ve görsel kaynakçasına ulaşmak için karekodu okutunuz.


TÜRKİYE'NİN MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ İLE
KARA VE DENİZ KOMŞULARI HARİTASI
BAŞKENT
Ankara
İL MERKEZİ
Elâzığ
GÖL
ÜLKE SINIRI
ÖZERK BÖLGE SINIRI
AKARSU
0 50 100 200 300 400
km
Harita Genel Müdürlüğü tarafından üretilmiştir.
KARADENİZ
AKDENİZ
EGE DENİZİ
MARMARA DENİZİ
HAZAR DENİZİ
ROMANYA
UKRAYNA
RUSYA FEDERASYONU
BULGARİSTAN
YUNANİSTAN
GÜRCİSTAN
ERMENİSTAN
AZERBAYCAN
İRAN
IRAK
SURİYE
LİBYA
MISIR
İSRAİL
LÜBNAN
FİLİSTİN
Batı Şeria
FİLİSTİN
Gazze Şeridi
KUZEY KIBRIS
TÜRK CUMHURİYETİ
GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ
ACARA Ö.C.
NAHÇIVAN Ö.C.
(AZERBAYCAN)
Sofya
Bükreş
Atina
Lefkoşa
Erenköy
Beyrut
Şam
Bağdat
Tel Aviv
Doğu
Kudüs
Tiflis
Erivan
Sinop
Samsun
Trabzon
Rize
Artvin
Ardahan
Kars
Ordu
Giresun
Gümüşhane
Bayburt
Erzincan
Tokat
Amasya
Çorum
Yozgat
Sivas
Tunceli
Bingöl
Muş
Bitlis
Van
Ağrı
Iğdır
Erzurum
Elâzığ
Malatya
Diyarbakır
Batman
Siirt
Şırnak
Hakkâri
Mardin
Adıyaman
Gaziantep
Şanlıurfa
Kilis
Osmaniye
Adana
Mersin
Hatay
Kahramanmaraş
Niğde
Konya
Karaman
Aksaray
Nevşehir
Kırşehir
Kayseri
Afyonkarahisar
Kütahya
Eskişehir
Ankara
Çankırı
Kırıkkale
Yozgat
Çorum
Amasya
Tokat
Sivas
Erzincan
Bartın
Zonguldak
Kastamonu
Karabük
Düzce
Bolu
Sakarya
Kocaeli
Yalova
Bursa
Bilecik
Tekirdağ
İstanbul
Edirne
Kırklareli
Çanakkale
Gökçeada
Bozcaada
Balıkesir
Manisa
İzmir
Uşak
Aydın
Denizli
Muğla
Isparta
Burdur
Antalya
Konya
Tuz Gölü
Van Gölü
Urumiye Gölü
Meriç N.
Tuna N.
Sakarya N.
Kızılırmak N.
Yeşilırmak N.
Çoruh N.
Kura N.
Aras N.
Fırat N.
Dicle N.
Seyhan N.
Ceyhan N.
Göksu N.
Asi N.
Büyük Menderes N.
Küçük Menderes N.
Gediz N.
Susurluk
Süveyş K.



TÜRK DÜNYASI HARİTASI
Bağımsız Türk Devletleri
Türk Cumhuriyetleri, Türk Bölgeleri
Türk Toplulukları
0 250 500 1.000 1.500 2.000 km
TÜRK CUMHURİYETLERİ, TÜRK BÖLGELERİ
1 GAGAVUZ YERİ
2 KARAÇAY-ÇERKESYA
3 KABARDİN-BALKARYA C.
4 DAĞISTAN C.
5 ÇUVAŞİSTAN C.
6 TATARİSTAN C.
7 BAŞKURT C.
8 KARAKALPAKİSTAN C.
9 ALTAY C.
10 HAKASYA C.
TÜRK TOPLULUKLARI
a Avrupa'daki Türkler
b Kosova Türkleri
c Yunanistan Türkleri
ç Bulgaristan Türkleri
d Romanya Türkleri
e Suriye Türkmenleri
f Irak Türkmenleri
g İran Türkleri
h Afganistan Türkmenleri
ı Pakistan Türkmenleri
i Hindistan Türkmenleri
j Çin H. C. Türkleri
k Moğolistan Türkleri
l Rusya Federasyonu Türkleri
ÜLKE KISALTMALARI
ARNAVUTLUK ARN
BELÇİKA BEL
BOSNA - HERSEK BH
GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ GKRY
HIRVATİSTAN HRV
İSVİÇRE İSV
KARADAĞ KRD
KOSOVA KSV
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KKTC
KUZEY MAKEDONYA KMKD
LİHTENŞTAYN LİH
SIRBİSTAN SRB
RUSYA FEDERASYONU
KAZAKİSTAN
TÜRKİYE
ÖZBEKİSTAN
TÜRKMENİSTAN
KIRGIZİSTAN
TACİKİSTAN
AZERBAYCAN
SAHA (YAKUT) C.
TUVA C.
SİNCAN UYGUR ÖZERK BÖLGESİ
MOĞOLİSTAN
ÇİN HALK CUMHURİYETİ
HİNDİSTAN
PAKİSTAN
AFGANİSTAN
İRAN
IRAK
SURİYE
SUUDİ ARABİSTAN
Barents Denizi
Norveç Denizi
Kara Denizi
Ohotsk Denizi
Bering Denizi
Akdeniz
Karadeniz
Hazar Denizi
Kızıldeniz
Umman Denizi
Yemen Denizi

Bu kitaba sığmayan daha neler var!

eba
www.eba.gov.tr

Karekodu okut, bu kitapla ilgili EBA içeriklerine ulaş!

Teknoloji Yolculuğumuz



BU DERS KİTABI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINCA ÜCRETSİZ OLARAK VERİLMİŞTİR.
PARA İLE SATILAMAZ.

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Beşinci Maddesinin İkinci Fıkrası Çerçevesinde Bandrol Taşıması Zorunlu Değildir.

ORTAÖĞRETİM

Matematik 9. Sınıf Ders Kitabı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI | ORTAÖĞRETİM | DERS KİTABI

Matematik





2. Kitap

ORTAÖĞRETİM

Matematik

9. Sınıf

Ders Kitabı

Yazarlar

Cem DEMİRCİ
Dilek TEKER
Esat AVCI
Gözde Aslı ÖZCAN
İsmail Hakkı ÜSTÜNEL
Kadır ÖZCAN
Özgür ŞEKER
Sercan EMEK
Sunullah KARABUDAK
Süleyman DOĞAN
Turgay KIZGIN
Yasemin YARDIM

DEVLET KİTAPLARI
....., 2024

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI ..... : 9619
DERS KİTAPLARI DİZİSİ ..... : 2040

Her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Kitabın metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz.

Editör
Prof. Dr. Abdulkadir ERDOĞAN
Prof. Dr. Hakan YAMAN
Prof. Dr. Soner DURMUŞ
Doç. Dr. Ayşe YOLCU
Doç. Dr. Nadide YILMAZ

Dil Uzmanları
Eflak MALGACA VARGEL
Hilal ASLAN
Neslihan ARICA

Görsel Tasarımcılar
Çiğdem ÖKCÜN
Hilal YAŞAR
Meltem KORKMAZ
Mustafa ÇAKIR
Nevrez AKIN
Özcan ATAK

Program Geliştirme Uzmanları
Doç. Dr. Recep KAHRAMANOĞLU
Doç. Dr. Serkan ASLAN
Demet YILMAZ
Nedim DENİZLİ
Nurgül KENDİRLİOĞLU GÜNHAN

Ölçme ve Değerlendirme Uzmanları
Dr. Öğr. Üyesi Halime YILDIRIM HOŞ
Dr. Öğr. Üyesi Sinem ŞENFERAH
Cuma GÜÇ
Dilay AK
Nuray SUNAR

Rehberlik Uzmanları
Berna Serap TÜRK
Hilal DEMİRBAĞ

Baskı
Baskı Matbaanın Adı ve
Ticaret Ünvanı
Tel.: (0000) 000 00 00

ISBN 978-975-11-8050-6

Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 17.07.2024 tarih ve 110460855 sayılı yazısı ile eğitim aracı olarak kabul edilmiştir.



İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;
Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif Ersoy


GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

İçindekiler

Kitabın dijital kopyalarında "İçindekiler" sayfasında başlıklar üzerine tıklayarak ilgili sayfalara, iç sayfalarda da Tema isimleri üzerine tıklayarak "İçindekiler" sayfasına ulaşabilirsiniz.

Kitabın Tanıtımı 8

4. Tema EŞLİK VE BENZERLİK **10**

Ön Değerlendirme 12
4.1. GEOMETRİK DÖNÜŞÜMLER 13
Alıştırmalar 35
4.2. İKİ ÜÇGENİN EŞ VEYA BENZER OLMASI İÇİN GEREKLİ OLAN ASGARİ KOŞULLAR 36
Alıştırmalar 51
4.3. BİR ÜÇGENDEN HAREKETLE ONA BENZER ÜÇGENLER OLUŞTURMA 53
Alıştırmalar 59
4.4. TALES, ÖKLİD VE PİSAGOR TEOREMLERİ 60
Alıştırmalar 74
4.5. EŞLİK VE BENZERLİKLE İLGİLİ PROBLEMLER 76
Alıştırmalar 85
Ölçme ve Değerlendirme 87

5. Tema ALGORİTMA VE BİLİŞİM **96**

Ön Değerlendirme 98
5.1. ALGORİTMA TEMELLİ YAKLAŞIMLARLA PROBLEM ÇÖZME 99
Alıştırmalar 126
5.2. ALGORİTMİK YAPILAR İÇERİSİNDEKİ MANTIK BAĞLAÇLARI VE NİCELEYİCİLER 127
Alıştırmalar 134
5.3. ALGORİTMALARDA VE MATEMATİKSEL İSPATLARDA MANTIK BAĞLAÇLARI VE NİCELEYİCİLER 135
Alıştırmalar 140
Ölçme ve Değerlendirme 141

6. Tema İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ **150**


Ön Değerlendirme 152
6.1. TEK NİCEL DEĞİŞKENLİ VERİ DAĞILIMLARI İLE ÇALIŞMA VE VERİYE DAYALI KARAR VERME 154
Alıştırmalar 189
6.2. BAŞKALARI TARAFINDAN OLUŞTURULAN TEK NİCEL DEĞİŞKENLİ VERİ DAĞILIMLARINA DAYALI SONUÇ VEYA YORUMLARI TARTIŞABİLME 193
Ölçme ve Değerlendirme 195


7. Tema VERİDEN OLASILIĞA **200**

Ön Değerlendirme 202
7.1. OLAYLARIN OLASILIĞINI GÖZLEME DAYALI TAHMİN ETME 204
Alıştırmalar 213
7.2. OLAYLARIN OLASILIĞINA İLİŞKİN TÜMEVARIMSAL AKIL YÜRÜTME 214
Alıştırmalar 227
Ölçme ve Değerlendirme 229


Sözlük 232
Kaynakça 234
Cevap Anahtarları Karekodu 235
Genel Ağ ve Görsel Kaynakçası Karekodu 235
Türkiye'nin Mülki İdare Bölümleri ile Kara ve Deniz Komşuları Haritası 236
Türk Dünyası Haritası 237

Kitabın Tanıtımı







Ulaşılan bilgi, kural, önerme veya sonuçların özetlendiği alan




Tema ile ilgili araştırma ödevlerinin verildiği alan




Tema ile ilgili performans görevlerinin verildiği alan




Tema ile ilgili proje ödevlerinin verildiği alan




Öğrenme çıktısı ile ilgili görevlerin bulunduğu alan




Tema ile ilgili ölçme ve değerlendirme çalışmalarının yer aldığı alan



Temada öğrenilenlerin not edilmesi için ayrılan alan



Konu ile ilgili kişi, kurum ve olaylar hakkında önemli tarihsel bilgilerin yer aldığı alan



SEMBOLLER VE SEMBOLLERİN AÇIKLAMALARI

Başlarken

Konuya Başlarken

Kontrol Noktası

Farklı Kaydet

Çalışmanın Bittiği Yer

Uygulamanın Başladığı Yer

Uygulamanın Bittiği Yer

Bireysel Uygulama

Grup Uygulaması

Rehberli Uygulama

Ders Öncesi Hazırlık Gerektiren Çalışma

Hesap Makinesi Gerektiren Soru

Ön Değerlendirme

Sonraki Sayfada Devam Eden Çalışma

Önceki Sayfadan Devam Eden Çalışma

Alıştırmalar, Ölçme ve Değerlendirme

4. TEMA

Eşlik ve Benzerlik

4.1. Geometrik Dönüşümler

4.2. İki Üçgenin Eş veya Benzer Olması İçin Gerekli Olan Asgari Koşullar

4.3. Bir Üçgenden Hareketle Ona Benzer Üçgenler Oluşturma

4.4. Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri

4.5. Eşlik ve Benzerlikle İlgili Problemler

▶ Anahtar Kavramlar

- benzerlik
- dönme dönüşümü
- eşlik
- Öklid teoremi
- Pisagor teoremi
- Tales teoremi

▶ Sembol ve Gösterimler

- $\cong$
- $\sim$

▶ Bu temada sizden

- geometrik dönüşümlerle ilgili çıkarım yapabilmeniz,
- iki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilmeniz,
- bir üçgenden hareketle ona benzer üçgenler oluşturma ile ilgili yansıtma yapabilmeniz,
- Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerini ispatlayabilmeniz,
- eşlik ve benzerlikle ilgili çıkarım ve teoremleri içeren problemleri çözebilmeniz

beklenmektedir.

Tema boyunca sizden çalışma kâğıtlarındaki soruları çözmeniz, performans görevlerini yerine getirmeniz, ölçme ve değerlendirme sorularını çözmeniz beklenmektedir.



Tema karekodu


Tema sunusuna ulaşmak için karekodu okutunuz.

Başlarken

Eş ve benzer geometrik şekillerle günlük hayatın birçok alanında karşılaşılmaktadır. Örneğin eş ve benzer geometrik şekillere geometrik dönüşümler uygulanarak süslemeler yapılmakta veya sanat eserleri üretilmekte, bazı mimari yapıların belli oranda küçültülmüş maketleri yapılmakta, gerçek boyutların büyük oranlarda küçültülmesi ile haritalar oluşturulmaktadır.

Ön Değerlendirme

1. Aşağıda ABCD dörtgeni dik koordinat sistemi üzerinde gösterilmiştir.




Buna göre aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan alanları tamamlayınız.

a) ABCD dörtgeni 5 birim sağa, 2 birim aşağı ötelenirse A noktasının ötelenmesi sonucunda oluşan A' noktasının koordinatları (…, …) olur.

b) ABCD dörtgenine y eksenine göre yansıma dönüşümü uygulanırsa C noktasının görüntüsü olan C' noktasının koordinatları (…, …) olur.

c) ABCD dörtgenine x eksenine göre yansıma dönüşümü uygulandıktan sonra dörtgen 2 birim sola ve 1 birim yukarıya ötelenirse B noktasının dönüşümler sonucunda oluşan görüntüsünü ifade eden B' noktasının koordinatları (…, …) olur.

2. Aşağıda ABC, DEF, KLM üçgenleri ve kenar uzunlukları dik koordinat sistemi üzerinde gösterilmiştir.




İfadeler	D/Y	Yanlış İfadelerin Doğru Biçimleri
$\frac{a}{d} = \frac{b}{e}$		
$m(\widehat{E}) = m(\widehat{C})$		
$\overset{\frown}{DEF} \cong \overset{\frown}{KLM}$		
$\overset{\frown}{ABC} \sim \overset{\frown}{DFE}$		


Buna göre yukarıdaki tabloda yer alan ifadelerden doğru olanların karşısına "D", yanlış olanların karşısına "Y" yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadenin doğru biçimini tablonun ilgili sütununa yazınız.

3. Aşağıdaki dik üçgenlerde bazı uzunlukların değerleri cm cinsinden verilmiştir. **Verilenlere göre x ile belirtilen kenar uzunluklarının kaç cm olduğunu bulunuz.**


a)



b)



c)




4.1. GEOMETRİK DÖNÜŞÜMLER


Konuya Başlarken

Türk-İslam kültüründe bitki ve çiçek desenleri medrese, cami, saray gibi birçok mimari eserde süsleme amacıyla sıkça kullanılmıştır. Osmanlı Dönemi'nde özellikle lale deseni İznik üretimi çini ve seramiklerde farklı kompozisyonlarla öne çıkmış ve dönemin mimari eserlerini süslemiştir.

Görsel 1'de lalenin ana desen olarak kullanıldığı süsleme örneği, Görsel 2'de süsleme örneğinin bir parçasında yer alan lale desenleri numaralandırılarak verilmiştir.



Görsel 1



Görsel 2

Görselleri inceleyerek aşağıdaki soruların cevaplarına ilişkin fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. Görsel 1'de verilen süsleme örneği oluşturulurken hangi geometrik dönüşümlerin kullanıldığına ilişkin fikirlerinizi belirtiniz.
2. Görsel 2'de yer alan III numaralı deseni elde etmek için I numaralı desene sırasıyla hangi geometrik dönüşüm veya dönüşümlerin uygulandığını belirtiniz.
3. I numaralı desene tek bir dönüşüm uygulanarak III numaralı desenin elde edilmesinin mümkün olup olmadığını, mümkünse hangi geometrik dönüşümün uygulanabileceğini belirtiniz.
4. İkinci ve üçüncü sorulara verdiğiniz cevapları değerlendirerek III numaralı deseni elde etmek için I numaralı desene uygulanan geometrik dönüşümlerin arasında nasıl bir ilişki olduğunu belirtiniz.
5. Görsel 2'de yer alan IV numaralı deseni elde etmek için II numaralı desene sırasıyla hangi geometrik dönüşüm veya dönüşümlerin uygulandığını belirtiniz.
6. Dördüncü soruya verdiğiniz cevaplardan hareketle II numaralı desene tek bir geometrik dönüşüm uygulanarak IV numaralı desenin elde edilmesinin mümkün olup olmadığını II ve IV numaralı desenleri karşılaştırarak belirtiniz.

Düzlemde bir şekli hareket ettirmek için geometrik dönüşümler kullanılır. Bu dönüşümler sayesinde şekil üzerindeki noktalar düzlemdeki başka noktalara bire bir eşlendiğinden tek bir şekil kullanılarak o şekle eş yeni şekiller elde edilir. Bu süreçte kullanılan geometrik dönüşümler; yansıma, öteleme ve dönme dönüşümleridir. Şekil ile bu şeklin geometrik dönüşümler sonucu oluşan görüntüleri estetik bir görünüş sağladığından mimaride, görsel sanatlarda, süsleme sanatlarında ve dekorasyonda geometrik dönüşümlerden sıklıkla faydalanılır.

Yansıma Dönüşümü ve Özellikleri


Düzlemde bir şeklin bir doğruya göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü, şekil üzerindeki noktaların verilen doğruya göre simetriği olan noktalar belirlenerek oluşturulur. Şeklin değişen ve değişmeyen özellikleri ile yansıma dönüşümünün özellikleri, düzlemde verilen şekiller ve şekillerin bir doğruya göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüleri karşılaştırılarak belirlenebilir.


1. Uygulama

Yansıma Dönüşümünün Özellikleri

Aşağıda verilen adımları takip ederek soruları cevaplayınız.

Birim kareli zemin üzerinde ABCDE bölgesinin d doğrusuna göre, KLM bölgesinin k doğrusuna göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüleri verilmiştir. ABCDE ve KLM bölgelerinin belirtilen doğrulara göre yansıma dönüşümleri altındaki görüntüleri sırasıyla A'B'C'D'E' ve K'L'M' bölgeleridir.





1. Verilen şekillerin d ve k doğrularına göre yansıma dönüşümü sonrasında değişen ve değişmeyen özelliklerinin neler olabileceğine ilişkin fikirlerinizi yazınız. Fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.

2. Tablo 1'de şekillere ait özellikler verilmiştir. Belirtilen özelliklerin şekillerin verilen doğrulara göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüleri olan şekillerde değişip değişmediğine ilişkin varsayımlarınızı tablonun ilgili alanına örnekteki gibi yazınız. Şekil üzerindeki bir noktanın görüntüsü olan noktaya uzaklığı ile şekil ve görüntüsünün yansıma doğrusuna uzaklıkları arasında bir ilişki olup olmadığını sözlü olarak ifade ediniz.

Tablo 1

Özellik	Varsayım
Şeklin kenar uzunlukları	Değişmez.
Şeklin iç açı ölçüleri	
Şeklin çevre uzunluğu	
Şeklin alanı	
Şekil üzerindeki noktalar ile bu noktaların görüntüleri arasındaki uzaklık	
Şekil ile görüntüsünün yansıma doğrusuna uzaklığı	

3. Verilen şekiller ile bu şekillerin d ve k doğrularına göre yansıma dönüşümü altındaki görüntülerini karşılaştırarak varsayımlarınızı inceleyiniz. Ulaştığınız sonuçları Tablo 2'nin ilgili alanına örnekteki gibi yazınız.

Tablo 2

Özellik	Sonuçlar
ABCDE beşgeninin kenar uzunlukları ve iç açı ölçüleri	$\|AB\| = 8$ birim, $\|BC\| = 6$ birim, $\|CD\| = 4\sqrt{2}$ birim, $\|DE\| = 2$ birim, $\|EA\| = 2\sqrt{2}$ birim, $m(\widehat{A}) = 45^o$, $m(\widehat{B}) = 90^o$, $m(\widehat{C}) = 45^o$, $m(\widehat{D}) = 225^o$, $m(\widehat{E}) = 135^o$
A'B'C'D'E' beşgeninin kenar uzunlukları ve iç açı ölçüleri	
KLM üçgeninin kenar uzunlukları ve iç açı ölçüleri	
K'L'M' üçgeninin kenar uzunlukları ve iç açı ölçüleri	
ABCDE beşgeninin çevre uzunluğu ve alanı	
A'B'C'D'E' beşgeninin çevre uzunluğu ve alanı	
KLM üçgeninin çevre uzunluğu ve alanı	
K'L'M' üçgeninin çevre uzunluğu ve alanı	
ABCDE beşgeni üzerindeki A, B, C, D, E noktalarının görüntüleri olan noktalara uzaklıkları	
KLM üçgeni üzerindeki K, L, M noktalarının görüntüleri olan noktalara uzaklıkları	
ABCDE beşgeni üzerindeki A, B, C, D, E noktaları ile bunların görüntüleri olan noktaların yansıma doğrusuna uzaklıkları	
KLM üçgeni üzerindeki K, L, M noktaları ile bunların görüntüleri olan noktaların yansıma doğrusuna uzaklıkları	

4. Tablo 2'ye yazdığınız sonuçları arkadaşlarınızın sonuçlarıyla karşılaştırarak tartışınız. Şekiller ve görüntüleri ile yansıma dönüşümünün özelliklerine ilişkin genellemeleri örnekteki gibi yazınız.

Şeklin kenar uzunlukları ile bir doğruya göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsünün kenar uzunlukları eşittir.

5. 2. adımda oluşturduğunuz varsayımlarınızla genellemelerinizi karşılaştırmak için bilgisayar veya etkileşimli tahtada matematik yazılımını açınız. Aşağıda verilen adımları sırasıyla uygulayınız.

a) **Araçlar** bölümünden sırasıyla **Çokgen** ve **Doğru** araçlarını seçerek bir çokgen ve bir doğru oluşturunuz.

Matematik yazılımı ile ilgili videoya ulaşmak için karekodu okutunuz.

b) **Dönüşüm** bölümünden **Doğruda Yansıt** aracını seçerek oluşturduğunuz çokgenin çizdiğiniz doğruya göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsünü oluşturunuz.

c) **Ölçüm** bölümünden sırasıyla **Uzaklık veya Uzunluk, Açı, Alan** araçlarını seçerek oluşturduğunuz çokgenin ve yansıma dönüşümü altındaki görüntüsünün kenar uzunluklarını, açı ölçülerini, alanlarını belirleyiniz.

ç) **Araçlar** bölümünden **Doğru Parçası** aracını seçerek oluşturduğunuz çokgenin köşe noktalarını ve bu noktaların yansıma dönüşümü altındaki görüntüsünü oluşturan noktaları birleştiriniz.

d) **Ölçüm** bölümünden **Uzaklık veya Uzunluk** aracını seçerek ç adımında oluşturduğunuz doğru parçalarının uzunluklarını ve çokgenin köşe noktalarının yansıma doğrusuna uzaklıklarını belirleyiniz.

e) Şeklin köşe noktaları için d adımında yaptığınız ölçümleri şekil üzerindeki farklı noktalar için de yapınız.

f) Oluşturduğunuz çokgeni sürükleyerek ve çokgenin köşe noktalarını hareket ettirerek c ve d adımlarında yaptığınız ölçümlerin değişimini gözlemleyiniz.


6. Farklı şekiller ve bu şekillerin bir doğruya göre yansıma dönüşümü altındaki görüntülerini de matematik yazılımında oluşturarak incelemeler yapınız. Yaptığınız incelemelerden hareketle genellemelerinizin her birini bir önerme olarak örnekteki gibi yazınız.

Yansıma dönüşümü, noktalar arası uzaklıkları korur.

7. Önermelerinizi değerlendirerek bir şekle ait geometrik özelliklerden hangilerinin yansıma dönüşümünün koruduğu özellikler arasında yer aldığını yazınız. Bir şekil ile bu şeklin bir doğruya göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsünün eş olup olmadığına ilişkin fikirlerinizi yazarak sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

Yansıma dönüşümü, düzlemdeki tüm noktaları düzlemdeki tüm noktalara dönüştüren ve noktalar arası uzaklığı koruyan bir dönüşümdür. Bir şekle bir doğruya göre yansıma dönüşümü uygulandığında bu doğru, **yansıma doğrusu** olarak adlandırılır. Şekil üzerindeki bir noktanın ve görüntüsünün yansıma doğrusuna uzaklığı eşittir. Bir şekil ile şeklin bir doğruya göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü eştir.

1. ÖRNEK



Yandaki birim kareli zeminde ABC üçgensel bölgesi ve d doğrusu verilmiştir. Doğru, üçgenin kenarlarını K ve M noktalarında kesmektedir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.


a) ABC üçgensel bölgesinin d doğrusuna göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsünü oluşturunuz.

b) Şekil üzerindeki noktaların d doğrusuna göre yansıma dönüşümü altındaki görüntülerinin ABC üçgeninin hangi bölgesinde olduğunu ve bu durumun nedenini açıklayınız.

c) K ve M noktalarının d doğrusuna göre yansıma dönüşümü altındaki görüntülerini belirleyiniz. K ve M noktaları ile bu noktaların görüntüleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

ç) d doğrusu üzerindeki K ve M noktaları ile bu noktaların görüntülerine dair belirlediğiniz ilişkiyi sağlayan başka noktaların olup olmadığını açıklayınız.

Çözüm




a) ABC üçgensel bölgesinin d doğrusuna göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü yandaki şekilde gösterilen A'B'C' üçgensel bölgesidir.

b) ABC üçgensel bölgesindeki bazı noktaların d doğrusuna göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü ABC üçgeninin iç bölgesindedir. Bu noktalar KLMN dörtgensel bölgesini oluşturur. Şekil üzerindeki bazı noktaların görüntüsünün yine şekil üzerinde olmasının nedeni yansıma doğrusu ile şeklin kesişmesidir. Şekil üzerindeki bazı noktaların görüntüleri ise ABC üçgeninin dış bölgesinde yer almaktadır. Bu noktalar, ALK ve BMNC bölgelerinde yer alan noktalardır.

c) K ve M noktalarının yansıma dönüşümü altındaki görüntüleri sırasıyla K ve M noktalarıdır. Noktalar ve bunların yansıma dönüşümü altındaki görüntüleri çakışıktır.

ç) d doğrusu üzerindeki $[KM]$'nın tüm noktalarının görüntüleri kendileridir.

1. Sıra Sizde




Yandaki birim kareli zeminde d doğrusu ve ABCDEFG çokgensel bölgesi verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.


a) Şeklin köşe noktalarının ve kenarlarının d doğrusuna göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüleri olan nokta ve kenarları yazınız.

b) Çokgensel bölgenin d doğrusuna göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsünü yandaki birim kareli zemine çiziniz.



c) Şekil ile bu şeklin d doğrusuna göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsünü karşılaştırınız. Şekil ile bu şeklin d doğrusuna göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü arasında nasıl bir ilişki olduğunu ve bu ilişkinin nedenini açıklayınız.

ç) Elde ettiğiniz ilişkiyi doğrulayan geometrik şekillere örnekler veriniz. Örnek verdiğiniz geometrik şekilleri ve bu şekillere ait yansıma doğrularını aşağıda verilen birim kareli zemin üzerine çiziniz.



2. Sıra Sizde

Etkileşimli tahta veya bilgisayarda matematik yazılımını açınız. Öğretmeninizin rehberliğinde aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayınız.

1. **Araçlar** bölümünden sırasıyla **Çokgen** ve **Doğru** araçlarını seçerek bir üçgen ve bir doğru oluşturunuz.
2. **Dönüşüm** bölümünden **Doğruda Yansıt** aracını seçerek oluşturduğunuz üçgenin doğruya göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsünü oluşturunuz.
3. **Araçlar** bölümünden **Doğru Parçası** aracını seçerek 1. adımda oluşturduğunuz üçgenin köşe noktaları ile bu noktaların görüntülerini birleştiriniz.
4. **Ölçüm** bölümünden **Açı** aracını seçerek 3. adımda oluşturduğunuz doğru parçaları ile yansıma doğrusu arasındaki açıların ölçülerini belirleyiniz.
5. Şeklin köşe noktaları için 3 ve 4. adımlarda yaptığınız işlem ve ölçümleri şekil üzerindeki farklı noktalar ve görüntüleri için de yapınız.
6. **Yaptığınız çizimden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.**

   a) 4 ve 5. adımlarda belirlediğiniz açı ölçüleri arasındaki ilişkiyi yazınız.

   b) 3. adımda oluşturduğunuz doğru parçaları arasındaki ilişkiyi yazınız.

   c) 1. adımda oluşturduğunuz üçgeni sürükleyerek a ve b sorularında ifade ettiğiniz ilişkilerin geçerli olup olmadığını açıklayınız.

   ç) Yansıma doğrusunu hareket ettirerek a ve b sorularında ifade ettiğiniz ilişkilerin geçerli olup olmadığını açıklayınız.

Kontrol Noktası

- Simetrik şekillerin simetri ekseni olan doğruya göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü ile şekil çakışıktır. Dolayısıyla şeklin düzlemdeki yeri ve yönü değişmez.
- Bir şekil üzerindeki noktalar ile şeklin yansıma dönüşümü altındaki görüntüleri olan noktaları birleştiren doğru parçaları yansıma doğrusuna diktir. Dolayısıyla bu doğru parçaları birbirlerine paraleldir.

Öteleme Dönüşümü ve Özellikleri


Düzlemde bir şeklin belirli bir uzaklık ve yönde öteleme dönüşümü altındaki görüntüsü, şekil üzerindeki tüm noktaların verilen yön ve uzaklıkta ilerletilmesiyle oluşturulur. Şeklin değişen ve değişmeyen özellikleri ile öteleme dönüşümünün özellikleri, düzlemde verilen şekiller ve şekillerin öteleme dönüşümü altındaki görüntüleri karşılaştırılarak belirlenebilir.

2. Uygulama

Öteleme Dönüşümünün Özellikleri-Yansıma ve Öteleme Dönüşümlerinin Karşılaştırılması

Aşağıda verilen adımları takip ederek soruları cevaplayınız.

Birim kareli zeminde ABCD, EFGH ve PRS bölgelerinin belirli doğrultu, yön ve uzaklıklarda ötelenmesi ile oluşturulmuş görüntüleri verilmiştir. ABCD, EFGH ve PRS bölgelerinin öteleme dönüşümleri altındaki görüntüleri sırasıyla A'B'C'D', E'F'G'H' ve P'R'S' bölgeleridir.



1. Verilen şekiller ile öteleme dönüşümü altındaki görüntülerini inceleyerek şekillerin hangi doğrultu (yatay-dikey) ve yönlerde (pozitif-negatif) kaç birim ötelendiğini bulunuz. Hem yatay hem de dikey doğrultuda öteleme dönüşümü uygulanan şekil olup olmadığını belirleyiniz. Cevaplarınızdan hareketle Tablo 1'in ilgili alanlarını uygun ifadelerle doldurunuz.

Tablo 1

Şekil	Öteleme Doğrultusu	Öteleme Yönü	Öteleme Miktarı
ABCD			
EFGH			
$\overset{\frown}{PRS}$			

2. Şekillerin belirlediğiniz öteleme dönüşümleri sonrasında değişen ve değişmeyen özelliklerinin neler olabileceğine ilişkin fikirlerinizi yazınız. Fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.

3. Tablo 2'de şekillere ait özellikler verilmiştir. Belirtilen özelliklerin şekillerin öteleme dönüşümü altındaki görüntüleri olan şekillerde değişip değişmediğine ilişkin varsayımlarınızı tablonun ilgili alanına örnekteki gibi yazınız. Şekil üzerindeki noktalar ile bu noktaların görüntülerine uzaklıkları arasında bir ilişki olup olmadığını sözlü olarak ifade ediniz.

Tablo 2

Özellik	Varsayım
Şeklin kenar uzunlukları	Değişmez.
Şeklin iç açı ölçüleri	
Şeklin çevre uzunluğu	
Şeklin alanı	
Şekil üzerindeki noktalar ile bu noktaların görüntüleri arasındaki uzaklık	
Şeklin düzlemdeki yeri	

4. Verilen şekiller ile bu şekillerin öteleme dönüşümü altındaki görüntülerini karşılaştırarak varsayımlarınızı inceleyiniz. Ulaştığınız sonuçları Tablo 3'ün ilgili alanına örnekteki gibi yazınız.

Tablo 3

Özellik	Sonuçlar
ABCD dörtgeninin kenar uzunlukları ve iç açı ölçüleri	$\lvert AB\rvert = 7$ birim, $\lvert BC\rvert = 4\sqrt{2}$ birim, $\lvert CD\rvert = 3$ birim, $\lvert AD\rvert = 4$ birim $m(\widehat{A}) = 90^o$, $m(\widehat{B}) = 45^o$, $m(\widehat{C}) = 135^o$, $m(\widehat{D}) = 90^o$
A'B'C'D' dörtgeninin kenar uzunlukları ve iç açı ölçüleri	
EFGH dörtgeninin kenar uzunlukları ve iç açı ölçüleri	
E'F'G'H' dörtgeninin kenar uzunlukları ve iç açı ölçüleri	
PRS üçgeninin kenar uzunlukları ve iç açı ölçüleri	
P'R'S' üçgeninin kenar uzunlukları ve iç açı ölçüleri	
ABCD dörtgeninin çevre uzunluğu ve alanı	
A'B'C'D' dörtgeninin çevre uzunluğu ve alanı	
EFGH dörtgeninin çevre uzunluğu ve alanı	
E'F'G'H' dörtgeninin çevre uzunluğu ve alanı	
PRS üçgeninin çevre uzunluğu ve alanı	
P'R'S' üçgeninin çevre uzunluğu ve alanı	
ABCD dörtgeni üzerindeki A, B, C, D noktalarının görüntüleri olan noktalara uzaklıkları	
EFGH dörtgeni üzerindeki E, F, G, H noktalarının görüntüleri olan noktalara uzaklıkları	
PRS üçgeni üzerindeki P, R, S noktalarının görüntüleri olan noktalara uzaklıkları	

5. Tablo 3'e yazdığınız sonuçları arkadaşlarınızın sonuçlarıyla karşılaştırarak tartışınız. Şekiller ve görüntüleri ile öteleme dönüşümünün özelliklerine ilişkin genellemeleri örnekteki gibi yazınız.

Şeklin kenar uzunlukları ile öteleme dönüşümü altındaki görüntüsünün kenar uzunlukları eşittir.

6. Aşağıdaki birim kareli zeminde farklı şekiller oluşturunuz. Oluşturduğunuz şekillere belirlediğiniz yön, doğrultu ve uzaklıkta öteleme dönüşümü uygulayınız. Şekilleri ve şekillerin görüntülerini inceleyerek varsayımlarınızı genellemelerinizle karşılaştırınız. Genellemelerinizin oluşturduğunuz şekiller ve öteleme dönüşümleri için doğru olup olmadığını açıklayınız.

7. 6. adımda yaptığınız incelemelerden hareketle genellemelerinizin her birini bir önerme olarak örnekteki gibi yazınız.

Öteleme dönüşümü, noktalar arası uzaklıkları korur.

8. Önermelerinizi değerlendirerek bir şekle ait geometrik özelliklerden öteleme dönüşümünün koruduğu özellikleri yazınız. Bir şekil ile bu şeklin öteleme dönüşümü altındaki görüntüsünün eş olup olmadığına ilişkin fikirlerinizi yazarak sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

9. Öteleme dönüşümünün özelliklerine ilişkin önermelerinizi yansıma dönüşümünün özellikleri ile karşılaştırarak bu dönüşümlerin özellikleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları Tablo 4'ün ilgili alanına yazınız.

Tablo 4

Yansıma ve Öteleme Dönüşümlerinin Benzer Özellikleri	Yansıma ve Öteleme Dönüşümlerinin Farklı Özellikleri

10. Tablo 4'ten hareketle bir şekil ve şeklin dönüşüm altındaki görüntüsünün kenar uzunlukları veya açı ölçüleri eşit ise şekle uygulanan dönüşümün yansıma mı yoksa öteleme mi olduğunun anlaşılıp anlaşılamayacağına dair fikirlerinizi yazınız.

11. Şekil üzerindeki tüm noktalar ile bu noktaların görüntüleri arasındaki uzaklık eşit ise şekle hangi dönüşümün uygulandığına karar verilip verilemeyeceğine dair fikirlerinizi yazınız.

12. Bir şekle yansıma ve öteleme dönüşümlerinden hangisinin uygulandığının nasıl tespit edilebileceğine ilişkin fikirlerinizi açıklayınız. Fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.

Kontrol Noktası


- Öteleme dönüşümü; düzlemdeki tüm noktaları belirli bir doğrultu, uzaklık ve yönde bulunan tüm noktalara dönüştüren bir dönüşümdür.
- Bir şekle öteleme dönüşümü uygulandığında şeklin düzlemdeki yeri değişir.
- Şekil üzerindeki tüm noktalar öteleme dönüşümü altındaki görüntüleri olan noktalara eşit uzaklıktadır. Bu nedenle şeklin yönü değişmez.
- Bir şeklin öteleme dönüşümü altındaki görüntüsü ile şekil eştir.
- Öteleme dönüşümünün bileşenleri; dönüşümün uygulandığı belirli doğrultu, yön ve uzaklıktır.

3. Uygulama

Yansıma ve Öteleme Dönüşümleri Arasındaki İlişki

Aşağıdaki yönergeleri takip ederek soruları cevaplayınız.

Aşağıdaki birim kareli zeminde CDEF bölgesi ile birbirine paralel d_1 ve d_2 doğruları verilmiştir.



1. CDEF bölgesinin d_1 doğrusuna göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü C'D'E'F' ve C'D'E'F' bölgesinin d_2 doğrusuna göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü C"D"E"F" olmak üzere C'D'E'F' ve C"D"E"F" bölgelerini yukarıda verilen birim kareli zemin üzerinde oluşturunuz.

2. CDEF bölgesine tek bir dönüşüm uygulanarak C"D"E"F" bölgesinin elde edilip edilemeyeceğine ilişkin fikirlerinizi yazınız. Fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.

3. $|CC"|$, $|DD"|$, $|EE"|$ ve $|FF"|$ nu birim kareler yardımıyla bularak karşılaştırınız. Karşılaştırmanızdan hareketle bu uzunlukların arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.

4. 3. adımda ulaştığınız ilişkiden yola çıkarak C"D"E"F" bölgesinin CDEF nin hangi dönüşüm altındaki görüntüsü olduğunu açıklayınız. Açıklamanızdan hareketle uygulanan dönüşümler arasındaki ilişkiyi ifade ediniz.

5. d_1 ve d_2 doğruları arasındaki uzaklığı bulunuz. $|CC"|$, $|DD"|$, $|EE"|$, $|FF"|$ ile d_1 ve d_2 doğrularının birbirine uzaklığı arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.

6. 5. adımda ulaştığınız ilişkiden yola çıkarak dönüşümler arasında nasıl bir ilişki olduğunu ifade ediniz.

3. Sıra Sizde

Etkileşimli tahta veya bilgisayarda matematik yazılımını açınız. Öğretmeninizin rehberliğinde aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayınız.

1. **Araçlar** bölümünden sırasıyla **Çokgen** ve **Doğru** araçlarını seçerek bir üçgen ve bir doğru oluşturunuz.
2. **Dönüşüm** bölümünden **Doğruda Yansıt** aracını seçerek oluşturduğunuz üçgenin doğruya göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsünü oluşturunuz.
3. **İnşa** bölümünden **Paralel Doğru** aracını seçiniz ve 1. adımda oluşturduğunuz doğruya paralel bir doğru çiziniz.
4. **Dönüşüm** bölümünden **Doğruda Yansıt** aracını seçerek üçgenin 2. adımda oluşturduğunuz görüntüsünün 3. adımda çizdiğiniz paralel doğruya göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsünü oluşturunuz.
5. **Araçlar** bölümünden **Doğru Parçası** aracını seçerek 1. adımda oluşturduğunuz üçgenin köşe noktalarını 4. adımda oluşturduğunuz görüntüleriyle birleştiriniz.
6. **Ölçüm** bölümünden **Uzaklık veya Uzunluk** aracını seçerek 5. adımda oluşturduğunuz doğru parçalarının uzunluklarını ve paralel doğrular arasındaki uzaklığı belirleyiniz.

7. Şeklin köşe noktaları için 5 ve 6. adımlarda yaptığınız işlem ve ölçümleri şekil üzerindeki farklı noktalar ve görüntüleri için de yapınız.

8. Aşağıdaki soruları yaptığınız çizime göre cevaplayınız.

a) 6 ve 7. adımlarda elde ettiğiniz uzaklıklar ile paralel doğruların birbirine uzaklığı arasında nasıl bir ilişki olduğunu belirtiniz.

b) Doğruları sürükleyerek 4. adımda oluşturduğunuz üçgen ile 6 ve 7. adımlardaki uzaklıkların değişimini gözlemleyiniz. Paralel doğruların birbirine uzaklığının 6 ve 7. adımlardaki uzaklıkları, bu uzaklıklar arasındaki ilişkiyi ve 4. adımda oluşturduğunuz üçgeni nasıl etkilediğini açıklayınız.

c) Paralel doğruları 1. adımda oluşturduğunuz üçgenin farklı taraflarında olmalarını sağlayacak şekilde sürükleyiniz. Paralel doğrular 1. adımda oluşturduğunuz üçgenin farklı taraflarında olduğunda 4. adımda oluşturduğunuz üçgenin, 6 ve 7. adımlardaki uzaklıkların ve bu uzaklıklar arasındaki ilişkinin nasıl değiştiğini gözlemleyiniz. Gözlemlerinizden elde ettiğiniz verileri açıklayınız.

ç) Oluşturduğunuz doğruların paralel olmaması durumunda a, b, c sorularına verdiğiniz cevapların nasıl değişeceğine ilişkin fikirlerinizi yazınız.

Kontrol Noktası

Düzlemde bir şekle iki paralel doğrudan birine göre yansıma dönüşümü uygulanıp elde edilen görüntüye diğer doğruya göre tekrar yansıma dönüşümü uygulanırsa şekil, doğrular arasındaki uzaklığın iki katı kadar uzaklığa ötelenmiş olur. Şeklin elde edilen son görüntüsü, ilk şeklin öteleme dönüşümü altındaki görüntüsüdür.

Dönme Dönüşümü ve Özellikleri

Kesişen doğrulardan birine göre yansıma dönüşümü uygulanarak elde edilen görüntüye diğer doğruya göre tekrar yansıma dönüşümü uygulandığında yeni bir geometrik dönüşüm elde edilir.

4. Uygulama

Teknoloji Uygulaması

Matematik yazılımı kullanarak aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayınız ve verilen soruları cevaplayınız.


Matematik yazılımı ile ilgili videoya ulaşmak için karekodu okutunuz.

1. **Araçlar** bölümünden sırasıyla **Çokgen** ve **Doğru** araçlarını seçerek ABC üçgenini ve f doğrusunu oluşturunuz.

2. **Dönüşüm** bölümünden **Doğruda Yansıt** aracını seçerek ABC üçgeninin f doğrusuna göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü olan A'B'C' üçgenini oluşturunuz.

3. **Araçlar** bölümünden **Doğru** aracını seçiniz ve f doğrusu ile D noktasında kesişen g doğrusunu çiziniz. **Noktalar** bölümünden **Nesne Üzerinde Nokta** aracını seçerek g doğrusu üzerinde bir G noktası belirleyiniz.

4. Dönüşüm bölümünden **Doğruda Yansıt** aracını seçerek A'B'C' üçgeninin g doğrusuna göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü olan A"B"C" üçgenini oluşturunuz.



5. ABC üçgenine tek bir dönüşüm uygulanarak A"B"C" üçgeninin elde edilip edilemeyeceğine ilişkin fikirlerinizi yazınız. Fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.

6. Tablo 1'de verilen durumlara ilişkin varsayımlarınızı tablonun ilgili alanına örnekteki gibi yazınız.

Tablo 1

Durum	Varsayım
$[AA"]$, $[BB"]$, $[CC"]$ nın düzlemdeki konumları arasındaki ilişki	Doğru parçaları paralel değildir. Kesişir.
$\|AA"\|$, $\|BB"\|$, $\|CC"\|$ arasındaki ilişki	
A, A' ve A" noktalarının doğruların kesim noktasına uzaklıkları arasındaki ilişki	
$\widehat{A"DA}$ nın ve doğrular arasındaki $\widehat{EDG}$ nın ölçüleri arasındaki ilişki	
ABC üçgenine belirli bir doğrultu, uzaklık ve yönde ötelemе dönüşümü uygulanarak A"B"C" üçgeninin elde edilip edilemeyeceği	
ABC üçgenine bir doğruya göre yansıma dönüşümü uygulanarak A"B"C" üçgeninin elde edilip edilemeyeceği	
ABC üçgeninin yönünün değişip değişmediği	

7. Araçlar bölümünden **Doğru Parçası** aracını seçiniz ve $[AA"]$, $[BB"]$, $[CC"]$ nı çiziniz.

8. Ölçüm bölümünden **Uzaklık veya Uzunluk** aracını seçerek 7. adımda oluşturduğunuz doğru parçalarının uzunluklarını belirleyiniz.

9. Araçlar bölümünden **Doğru Parçası** aracını seçiniz. A, A' ve A" noktalarını doğruların kesim noktası (D noktası) ile birleştiren doğru parçalarını oluşturunuz.

10. Ölçüm bölümünden **Uzaklık veya Uzunluk** aracını seçerek 9. adımda oluşturduğunuz doğru parçalarının uzunluklarını belirleyiniz.

11. **Ölçüm** bölümünden **Açı** aracını seçerek $\widehat{A''DA}$ nın ve doğrular arasındaki $\widehat{EDG}$ nın ölçülerini belirleyiniz.

12. Tablo 2'nin ilk satırına 8, 10 ve 11. adımlarda yaptığınız ölçümleri yazınız. Daha sonra ABC üçgenini köşelerinden sürükleyiniz ve elde ettiğiniz değerleri tablonun ilgili kısımlarına not ediniz. Son olarak doğruların kesim noktasını sürükleyiniz ve elde ettiğiniz değerleri tablonun ilgili kısımlarına yazınız.

Tablo 2

$\lvert AA''\rvert$	$\lvert BB''\rvert$	$\lvert CC''\rvert$	$\lvert AD\rvert$	$\lvert A'D\rvert$	$\lvert A''D\rvert$	$m(\widehat{A''DA})$	Doğrular Arasındaki $\widehat{EDG}$ nın Ölçüsü

13. A" noktası için **İzi Göster** özelliğini açınız. Doğrular üzerinde bulunan E veya F noktalarından birini sürükleyerek A" noktasının izini oluşturunuz. A" noktasının izinin nasıl bir şekil oluşturduğunu yazınız. Oluşan izi gözlemleyerek A noktasını A" noktasına eşleştiren dönüşümün A noktasını nasıl hareket ettirdiğine ilişkin varsayımlarınızı örnekteki gibi yazınız.

A noktasını A" noktasına eşleyen dönüşüm, A noktasını doğrusal olarak hareket ettirmez.

14. $[AA"]$, $[BB"]$, $[CC"]$ nın birbirlerine göre konumlarını, Tablo 2'ye yazdığınız değerleri ve 13. adımda A" noktasının izinin oluşturduğu şekli değerlendirerek varsayımlarınızı arkadaşlarınızla tartışınız. Tartışma sonucunda ulaştığınız genellemeleri örnekteki gibi yazınız.

Bir şekle kesişen iki doğruya göre sırasıyla iki kez yansıma dönüşümü uygulandığında şekil üzerindeki noktalar ile bu noktaların görüntülerinin birbirine uzaklıkları farklı olur.

15. 7 ila 11. adımlarda yaptığınız işlem ve ölçümleri şekil üzerindeki farklı noktalar için de yapınız. 13. adımda A" noktası için oluşturduğunuz izi A"B"C" üçgeninin diğer köşe noktaları için de oluşturunuz ve bu noktaların izlerini gözlemleyiniz. Varsayımlarınızla genellemelerinizi karşılaştırınız. Genellemelerinizin şekil üzerindeki farklı noktalar ve görüntüleri için doğru olup olmadığını gözlemlerinizden hareketle açıklayınız.

16. Farklı bir şekil ve bu şeklin kesişen iki doğrudan birine göre yansıma dönüşümü uygulanarak elde edilen görüntüsünün diğer doğruya göre tekrar yansıma dönüşümü uygulanmış görüntüsünü de matematik yazılımında oluşturunuz ve incelemeler yapınız. Yaptığınız incelemelerden hareketle genellemelerinizin her birini bir önerme olarak örnekteki gibi yazınız.

Kesişen doğrulardan birine göre yansıma dönüşümü uygulanarak elde edilen görüntüye diğer doğruya göre tekrar yansıma dönüşümü uygulandığında elde edilen dönüşüm yansıma dönüşümü değildir.

17. Kesişen doğrulardan birine göre yansıma dönüşümü uygulanarak elde edilen görüntüye diğer doğruya göre tekrar yansıma dönüşümü uygulandığında elde edilen dönüşümü yansıma ve öteleme dönüşümünden ayıran özellikleri tespit ediniz. Tespitlerinizi Tablo 3'ün ilgili alanına yazınız.

Tablo 3

Elde Edilen Dönüşümü Yansıma Dönüşümünden Ayıran Özellikler	Elde Edilen Dönüşümü Öteleme Dönüşümünden Ayıran Özellikler

18. Tablo 3'ten hareketle kesişen doğrulardan birine göre yansıma dönüşümü uygulanarak elde edilen görüntüye diğer doğruya göre tekrar yansıma dönüşümü uygulandığında elde edilen dönüşümün şekilleri nasıl hareket ettirdiğini veya şekilleri görüntülerine nasıl eşlediğini tartışınız. Tartışma sonucunda ulaştığınız verilere ilişkin değerlendirmelerinizi yazınız.

Kontrol Noktası

- Düzlemde bir şekle kesişen iki doğrudan birine göre yansıma dönüşümü uygulanıp elde edilen görüntüye diğer doğruya göre tekrar yansıma dönüşümü uygulanırsa şekil üzerindeki noktalar çembersel bir yol çizer ve görüntüleriyle eşleşir.
- Şekil üzerindeki noktaların görüntüleri, her bir noktanın doğruların kesim noktası etrafında ve doğrular arasındaki açının ölçüsünün iki katı kadar açıyla belirli bir yönde hareket etmesi sonucu oluşur.
- Kesişen doğrulardan birine göre yansıma dönüşümü uygulanarak elde edilen görüntüye diğer doğruya göre tekrar yansıma dönüşümü uygulandığında elde edilen dönüşüm dönme dönüşümüdür.
- Doğruların kesim noktası, dönme merkezi; doğrular arasındaki açının ölçüsünün iki katı olan açı ölçüsü değeri ise dönme açısıdır. Dönme merkezi ve dönme açısı, dönme dönüşümünün bileşenleridir.

Şeklin değişen ve değişmeyen özelikleri ile dönme dönüşümünün özellikleri, düzlemde verilen şekiller ve şekillerin bir nokta etrafında belirli bir açıyla ve belirli bir yönde dönme dönüşümü altındaki görüntüleri karşılaştırılarak belirlenebilir.


5. Uygulama

Dönme Dönüşümünün Özellikleri

Matematik yazılımı kullanarak aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayınız ve verilen soruları cevaplayınız.

Matematik yazılımı ile ilgili videoya ulaşmak için karekodu okutunuz.

1. **Araçlar** bölümünden sırasıyla **Çokgen** ve **Nokta** araçlarını seçerek ABC üçgenini ve D noktasını oluşturunuz.
2. **Ölçüm** bölümünden **Sürgü** aracını ve araç ayarlarından da **Açı** simgesini seçerek α sürgüsünü oluşturunuz.
3. **Dönüşüm** bölümünden **Nokta Etrafında Döndür** aracını seçiniz. ABC üçgenini D noktası etrafında saat yönünde α kadar döndürerek A'B'C' üçgenini oluşturunuz.



4. ABC üçgenine uygulanan dönme dönüşümü sonrasında ABC üçgeninin değişen ve değişmeyen özelliklerinin neler olabileceğine ilişkin fikirlerinizi yazınız. Fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.

5. Tablo 1'de ABC üçgeni ile bu üçgenin dönme dönüşümü altındaki görüntüsüne dair özellikler verilmiştir. Belirtilen özelliklerin değişip değişmediğine ilişkin varsayımlarınızı tablonun ilgili alanına örnekteki gibi yazınız.

Tablo 1

Özellik	Varsayım
Şeklin kenar uzunlukları	Değişmez.
Şeklin iç açı ölçüleri	
Şeklin çevre uzunluğu	
Şeklin alanı	
Şekil üzerindeki noktalar ile bu noktaların görüntülerinin dönme merkezine uzaklığı	

6. Ölçüm bölümünden sırasıyla **Uzaklık veya Uzunluk**, **Açı** ve **Alan** araçlarını seçerek ABC ve A'B'C' üçgenlerinin kenar uzunluklarını, çevre uzunluklarını, açı ölçülerini ve alanlarını belirleyiniz.

7. **Araçlar** bölümünden **Doğru Parçası** aracını seçiniz. $[AD]$, $[BD]$, $[CD]$, $[A'D]$, $[B'D]$ ve $[C'D]$nı oluşturunuz.

8. **Ölçüm** bölümünden **Uzaklık veya Uzunluk** aracını seçerek 7. adımda oluşturduğunuz doğru parçalarının uzunluklarını belirleyiniz.

9. Tablo 2'nin boş olan ilk sütununa 6 ve 8. adımlarda yaptığınız ölçümleri yazınız. Daha sonra dönme merkezini sürükleyiniz ve elde ettiğiniz değerleri tabloya not ediniz. Son olarak α sürgüsünü hareket ettiriniz ve ulaştığınız değerleri tabloya yazınız.

Tablo 2

ABC üçgeninin kenar uzunlukları	$\lvert AB\rvert$								
	$\lvert AC\rvert$								
	$\lvert BC\rvert$								
A'B'C' üçgeninin kenar uzunlukları	$\lvert A'B'\rvert$								
	$\lvert A'C'\rvert$								
	$\lvert B'C'\rvert$								
ABC üçgeninin iç açı ölçüleri	$m(\widehat{BAC})$								
	$m(\widehat{ABC})$								
	$m(\widehat{ACB})$								
A'B'C' üçgeninin iç açı ölçüleri	$m(\widehat{B'A'C'})$								
	$m(\widehat{A'B'C'})$								
	$m(\widehat{A'C'B'})$								
ABC üçgeninin çevre uzunluğu	$Ç(\widehat{ABC})$								
A'B'C' üçgeninin çevre uzunluğu	$Ç(\widehat{A'B'C'})$								
ABC üçgeninin alanı	$A(\widehat{ABC})$								
A'B'C' üçgeninin alanı	$A(\widehat{A'B'C'})$								
ABC üçgeninin köşe noktalarının dönme merkezine uzaklıkları	$\lvert AD\rvert$								
	$\lvert BD\rvert$								
	$\lvert CD\rvert$								
A'B'C' üçgeninin köşe noktalarının dönme merkezine uzaklıkları	$\lvert A'D\rvert$								
	$\lvert B'D\rvert$								
	$\lvert C'D\rvert$								

10. Tablo 2'ye yazdığınız değerleri kullanarak varsayımlarınızı arkadaşlarınızla saygı çerçevesinde tartışınız. Tartışma sonucunda ulaştığınız genellemeleri örnekteki gibi yazınız.

Şeklin kenar uzunlukları ile dönme dönüşümü altındaki görüntüsünün kenar uzunlukları eşittir.

11. ABC üçgenini köşelerinden sürükleyiniz. ABC ve A'B'C' üçgenlerinin 9. adımda incelediğiniz özelliklerinin değişimini gözlemleyiniz. Gözlemlerinizden hareketle varsayımlarınızı genellemelerinizle karşılaştırınız. Karşılaştırmanız sonucunda elde ettiğiniz verileri yazınız.

12. Farklı şekiller ve bu şekillerin dönme dönüşümü altındaki görüntülerini de matematik yazılımında oluşturarak incelemeler yapınız. Yaptığınız incelemelerden hareketle genellemelerinizin her birini bir önerme olarak örnekteki gibi yazınız.


Dönme dönüşümü, noktalar arası uzaklıkları korur.

13. Önermelerinizi değerlendirerek bir şekle ait geometrik özelliklerden dönme dönüşümünün koruduğu özellikleri yazınız. Bu özellikler ve elde ettiğiniz diğer önermeler sonucunda bir şekil ile bu şeklin dönme dönüşümü altındaki görüntüsünün eş olup olmadığına ilişkin fikirlerinizi yazarak arkadaşlarınızla tartışınız.

14. Dönme dönüşümünün özelliklerine ilişkin önermelerinizi yansıma ve öteleme dönüşümlerinin özellikleri ile karşılaştırarak değerlendiriniz. Dönme dönüşümünü diğer dönüşümlerden ayırt etmeyi sağlayacak özellikleri yazınız.

Kontrol Noktası

- Dönme dönüşümü, düzlemdeki tüm noktaları dönme merkezi ve dönme açısı yardımıyla belirli bir yönde hareket ettirerek yine düzlemdeki tüm noktalara dönüştüren bir dönüşümdür.
- Bir şekle dönme dönüşümü uygulandığında şekil üzerindeki herhangi bir nokta ile bu noktanın görüntüsünün dönme merkezine uzaklıkları birbirine eşit olur.
- Bir şeklin dönme dönüşümü altındaki görüntüsü ile şekil eştir.



Görsel 4.1: *Geleneksel Türk-İslam süsleme örneği*

Türk kültürüne ait sanat eserlerinde sıklıkla geometriden faydalanılmış; özellikle mimari eserlerdeki süsleme uygulamalarında, geleneksel halı ve kilimlerde geometrik dönüşümler kullanılmıştır. Görsel 4.1'de Türk-İslam medeniyetine ait mimari eserlerde sıklıkla kullanılan geleneksel bir süsleme örneği bulunmaktadır. Örnekteki desenler çoğunlukla dönme dönüşümü kullanılarak oluşturulmuştur. 12 köşeli yıldız etrafında dizili yıldız motifleri, 12 köşeli yıldızın merkez noktası etrafında 30^o döndürülerek elde edilmiştir.


Görsel 4.2'de Türk kültürüne ait geleneksel motiflerin kullanıldığı halı ve kilim örnekleri bulunmaktadır. Halı ve kilim desenleri oluşturulurken geometrik şekiller kullanılmış, desenlerin yerleştirilmesinde ise geometrik dönüşümlerden yararlanılarak estetik bir görünüm elde edilmiştir.



Görsel 4.2: *Geleneksel Türk halı ve kilim örnekleri*

2. ÖRNEK

Aşağıdaki görsellerde farklı kültürlere ait süsleme ve motif örnekleri verilmiştir. Görsel 1'de Orta Asya Türk kültürüne ait bir süsleme örneği, Görsel 2'de Antik Yunan Dönemi'ne ait bir duvar süslemesi, Görsel 3'te Mısır kültürüne ait ahşap süsleme örneği yer almaktadır.



Görsel 1



Görsel 2



Görsel 3

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.


a) Görsel 1'de yer alan süslemedeki desenlerden farklı doğrulara göre yansıma dönüşümü uygulanarak elde edilmiş desen parçalarına örnek veriniz ve bu parçaların nasıl oluşturulduğunu görsel üzerinde gösteriniz. Görseldeki süslemenin sadece yansıma dönüşümü kullanılarak elde edilip edilemeyeceğini açıklayınız.

b) Görsel 2'de yer alan süslemede öteleme dönüşümü uygulanarak elde edilmiş bir desen örneği bulunuz. Bu desenin bir doğruya göre yansıma dönüşümü kullanılarak nasıl elde edilebileceğini görsel üzerinde gösteriniz.

c) Görsel 3'teki kapı süslemesinde yer alan desenlerden dönme dönüşümüne örnek veriniz. Verdiğiniz örnekten hareketle dönme dönüşümünün yansıma dönüşümü ile ilişkisinin nasıl kullanıldığını görsel üzerinde gösteriniz.

Çözüm

a)



Görselde yer alan 1 numaralı desene d_1 doğrusuna göre yansıma dönüşümü uygulandığında 2 numaralı desen oluşur.


2 numaralı desenin d_2 doğrusuna göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü, 3 numaralı deseni oluşturur. d_1 ve d_2 doğruları kesişen doğrular olduğundan 3 numaralı desen 1 numaralı desenin dönme dönüşümü uygulanmış hâlidir.

3 numaralı desene d_3 doğrusuna göre yansıma dönüşümü uygulandığında 4 numaralı desen elde edilir. Dört desenin oluşturduğu parçaya d_4 doğrusuna göre yansıma dönüşümü uygulanırsa 5 numaralı desen parçası oluşturulur.

Oluşturulan bu 5 desenin meydana getirdiği parçaya d_5 doğrusuna göre yansıma dönüşümü uygulandığında 6 numaralı parça oluşur. Bu parçanın da d_6 doğrusuna göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü, 7 numaralı parçayı meydana getirir.


Görseldeki süsleme sadece yansıma dönüşümü kullanılarak elde edilebilir. Görseldeki 7 desenin her biri, 1 numaralı desen parçasından başlanarak farklı doğrulara göre yansıma dönüşümü uygulanmak suretiyle oluşturulmuştur.

b)



Görselde yer alan süslemede 1 numaralı desene öteleme dönüşümü uygulanarak 2 numaralı desen elde edilmiştir. 1 numaralı desene önce d_1 doğrusuna göre yansıma dönüşümü uygulanmış ve 3 numaralı desen oluşturulmuştur. Daha sonra bu desenin d_1 doğrusuna paralel olan d_2 doğrusuna göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü oluşturulmuş ve 2 numaralı desen elde edilmiştir.

c)



3 numaralı desen, 1 numaralı desene dönme dönüşümü uygulanarak elde edilmiştir.
1 numaralı desene d_1 doğrusuna göre yansıma dönüşümü uygulandığında 2 numaralı desen elde edilir. Bu desenin de d_2 doğrusuna göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü 3 numaralı deseni oluşturur. Doğrular kesiştiğinden 1 numaralı desene bu doğrulara göre sırasıyla yansıma dönüşümü uygulandığında desen, doğruların kesim noktası etrafında doğrular arasındaki açının ölçüsünün iki katı kadar ölçüyle döndürülmüş olur.

4. Sıra Sizde

Aşağıdaki görsellerde farklı kültürlere ait süsleme örnekleri verilmiştir. Görsel 1'de Elhamra Sarayı'na ait bir duvar süslemesi, Görsel 2'de Özbekistan'da bulunan bir duvar mozaiği yer almaktadır.



Görsel 1



Görsel 2

Görselleri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

a) Görsel 1'de yer alan süslemede tüm dönüşüm türlerine birer örnek bulunuz. Örneklerinizden hareketle öteleme ve dönme dönüşümü uygulanan desenlerin yansıma dönüşümü kullanılarak nasıl elde edilebileceğini yansıma doğrularını çizerek açıklayınız.

b) Görsel 2'deki desenlerden yansıma dönüşümü kullanılan desenlere örnekler vererek yansıma doğrularını çiziniz. Görselde dönme dönüşümü uygulanan desen örneği bularak desenin oluşturulmasında yansıma dönüşümünün nasıl kullanıldığını gösteriniz.

c) Farklı kültürlere, sanat alanlarına, dönemlere ait eserlerde geometrik dönüşümlerin kullanılmasının nedeni ne olabilir? Fikirlerinizi açıklayınız.

ç) Etkileşimli tahta kullanarak millî kültüre ait halı ve kilim örneklerini, sanat eserlerini ve mimari eserleri araştırınız. Araştırdığınız eserlerde, halı ve kilim örneklerinde kullanılan geleneksel süsleme motiflerini ve desenlerini inceleyiniz. Geometrik dönüşümler kullanılarak oluşturulan geleneksel Türk motif ve desenlerinin millî kültürün oluşmasında üstlendiği role ilişkin fikirlerinizi belirtiniz. Geometrik dönüşümlerin süslemelerin oluşturulmasında nasıl kullanıldığına ilişkin fikirlerinizi açıklayınız.

Kontrol Noktası

- Geometrik dönüşümler, düzlemdeki tüm noktaları yine düzlemdeki tüm noktalara bire bir eşler.
- Geometrik dönüşümler, uzaklıkları koruduğundan açıları da korur. Bu nedenle bir şekil ile şeklin dönüşümler altındaki görüntüleri eştir.

Performans Görevi

Süsleme Oluşturma

Bu görevde sizden motif oluşturmanız ve oluşturduğunuz motifler ile geometrik dönüşümleri kullanarak süsleme örneği tasarlamanız istenmektedir.

Göreve başlamadan önce aşağıdaki hususa dikkat ediniz.

- Çalışmanızı oluştururken takip edeceğiniz adımları belirleyiniz.

Görev esnasında aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

- En az 3 farklı motif oluşturunuz.
- Oluşturduğunuz motiflerle en az 3 farklı süsleme örneği oluşturunuz.
- Süslemenizi oluştururken tüm geometrik dönüşümleri en az bir kez kullandığınızdan emin olunuz.
- Tasarladığınız süsleme örneklerini poster ya da çevrim içi uygulamalardan hangisini kullanarak sunacağınıza karar veriniz ve sunumunuzu hazırlayınız.
- Sunumunuzda süsleme örneklerinizi Türk kültürüne ait süsleme örnekleriyle karşılaştırdığınızdan ve süslemelerinizi oluştururken takip edeceğiniz adımlara yer verdiğinizden emin olunuz.
- Görevinizi sınıfta ve öğretmeninizin belirlediği sürede tamamlayınız.

Görev bitiminde aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

- Görevinizi tamamladıktan sonra oluşturduğunuz ürünü sınıfta sunarak arkadaşlarınızla paylaşınız.
- Çalışmanızı öğretmeninize zamanında teslim ediniz.

Performans göreviniz aşağıdaki karekodda verilen analitik dereceli puanlama anahtarı ile öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir.


Kendinizi performans görevi kapsamında sizden beklenen davranışlar açısından değerlendirmek amacıyla aşağıdaki karekodda verilen öz değerlendirme formunu doldurunuz.

Analitik dereceli puanlama anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

Öz değerlendirme formuna ulaşmak için karekodu okutunuz.

Alıştırmalar

1. Aşağıdaki birim kareli zeminde ABCDE beşgeni verilmiştir.




Buna göre

a) ABCDE beşgeninin 6 birim sağa, 8 birim aşağıya ötelenmesi sonucu oluşan görüntüsünü birim kareli zemine çiziniz.

b) ABCDE beşgeninin uygulanan öteleme dönüşümü sonrası oluşan görüntüsünü elde etmek için ABCDE beşgenine başka hangi dönüşüm ya da dönüşümlerin uygulanabileceğini açıklayınız.

2. Bir şekle hangi geometrik dönüşüm veya dönüşümler uygulandığında şeklin düzlemdeki yeri kesinlikle değişir? Farklı şekiller için matematik yazılımında incelemeler yaparak ulaştığınız sonuçları açıklayınız.

3. Aşağıdaki birim kareli zeminde KLM üçgeni ve KLM üçgenine uygulanan geometrik dönüşüm sonucu oluşan K'L'M' üçgeni verilmiştir.



Buna göre

a) KLM üçgenine uygulanan hangi dönüşüm sonucunda K'L'M' üçgeninin elde edildiğini ifade ediniz.

b) KLM üçgenine hangi dönüşümün uygulandığına nasıl karar verdiğinizi açıklayınız.

4. Aşağıdaki görselde geleneksel desenlerin kullanıldığı kilim örneği verilmiştir.



Buna göre

a) Görseli inceleyerek yansıma, öteleme ve dönme dönüşümleri uygulanan desenlere birer örnek bulunuz.

b) Bulduğunuz desenlere uygulanan geometrik dönüşümlerin bileşenlerini açıklayınız.


Konu ile ilgili daha fazla soru çözmek için karekodu okutunuz.

4.2. İKİ ÜÇGENİN EŞ VEYA BENZER OLMASI İÇİN GEREKLİ OLAN ASGARİ KOŞULLAR

Konuya Başlarken

Eş ve benzer geometrik şekillere çeşitli geometrik dönüşümler uygulanarak sanat eserleri üretilmektedir.

Aşağıdaki görselde üçgenlerin kullanıldığı bir duvar resmi yer almaktadır.



Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Duvar resmindeki üçgenlerin eş ya da benzer olduğu nasıl belirlenebilir?
2. Duvar resmindeki üçgenlerin eş ya da benzer olduğunu göstermek için hangi ölçümlerin yapılması yeterli olur?

Üçgenlerin Eş Olma Koşulları


Dönüşümler; geometrik bir şeklin kenar uzunluklarını, açı ölçülerini, çevre uzunluğunu ve alanını korumaktadır. Bir üçgen ile üçgenin çeşitli dönüşümler altındaki görüntüsü, karşılıklı kenar uzunlukları ve açı ölçüleri eşit olduğundan eştir.

6. Uygulama

Üçgenlerin Eş Olma Şartları

Aşağıdaki yönergeleri takip ederek soruları cevaplayınız.

1. Birim kareler üzerine çizilmiş ABC ve DEF üçgenleri ile bu üçgenlere uygulanan bazı dönüşümler sonucunda oluşturulmuş A'B'C' ve D'E'F' üçgenlerini inceleyiniz. İki üçgenle ilgili verilen soruların cevaplarına ilişkin varsayımlarınızı boş bırakılan alanlara yazınız.



a) ABC ile DEF üçgenine hangi dönüşümler uygulanarak A'B'C' ve D'E'F' üçgeni oluşturulmuştur? Fikirlerinizi açıklayınız.

b) ABC üçgeni ile A'B'C' üçgeni ve DEF üçgeni ile D'E'F' üçgeni arasında nasıl bir ilişki vardır? Fikirlerinizi açıklayınız.

c) Verilen üçgen çiftlerinin eş olduğunu gösterebilmek için karşılıklı tüm açı ve kenarların eş olduğunu göstermenin gerekip gerekmediğine ilişkin fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

ç) İki üçgenin eş olduğunu söyleyebilmek için bu üçgenlerin asgari hangi elemanlarının eş olması gerektiğine ilişkin varsayımlarınızı açıklayınız. Varsayımlarınızı farklı görüşteki arkadaşlarınızın varsayımları ile karşılaştırınız.

d) İki üçgenin karşılıklı tüm kenar uzunluklarının eşit olması, üçgenlerin eş olduğunu söyleyebilmek için yeterli midir? Düşüncelerinizi farklı görüşteki arkadaşlarınız ile saygı çerçevesinde tartışınız.

e) İki üçgenin karşılıklı iki kenar uzunluğunun ve karşılıklı herhangi bir açısının ölçüsünün bilinmesi, üçgenlerin eş olduğunu söyleyebilmek için yeterli midir? Fikirlerinizi açıklayınız.

f) İki üçgenin karşılıklı tüm açı ölçülerinin eşit olması, üçgenlerin eş olması için yeterli midir? Fikirlerinizi açıklayınız.

2. Aşağıdaki tabloda üçgen çiftleri ve bu üçgenlerin bazı kenar uzunlukları ile açı ölçüleri verilmiştir. Varsayımlarınızı incelemek için bu üçgen çiftlerini cetvel ve açıölçer kullanarak çiziniz. Çizdiğiniz üçgenleri bir makas yardımıyla kesiniz. Kestiğiniz üçgenleri eşleşip eşleşmediklerini kontrol etmek amacıyla üst üste getiririz. Üçgenler eşleşiyorsa tabloya örnekteki gibi "+", eşleşmiyorsa "−" işareti koyunuz. Bu kısmı matematik yazılım programı kullanarak da yapabilirsiniz.

Üçgenler	Kenar Uzunlukları	İç Açı Ölçüleri	Eşleşir/Eşleşmez
$\widehat{ABC}$	$\|AB\| = 6$ cm, $\|BC\| = 8$ cm, $\|AC\| = 10$ cm		+
$\widehat{DEF}$	$\|DE\| = 6$ cm, $\|EF\| = 8$ cm, $\|DF\| = 10$ cm		
$\widehat{DHI}$	$\|DH\| = 5$ cm, $\|DI\| = 7$ cm	$m(\widehat{H}) = 60°$	
$\widehat{JKL}$	$\|JK\| = 5$ cm, $\|KL\| = 7$ cm	$m(\widehat{J}) = 60°$	
$\widehat{MNO}$	$\|MN\| = 5$ cm, $\|MO\| = 8$ cm	$m(\widehat{M}) = 60°$	
$\widehat{PRS}$	$\|PR\| = 5$ cm, $\|PS\| = 8$ cm	$m(\widehat{P}) = 60°$	
$\widehat{TUV}$		$m(\widehat{T}) = 80°$, $m(\widehat{U}) = 70°$, $m(\widehat{V}) = 30°$	
$\widehat{YZW}$		$m(\widehat{Y}) = 80°$, $m(\widehat{Z}) = 70°$, $m(\widehat{W}) = 30°$	
$\widehat{ADK}$	$\|AK\| = 6$ cm	$m(\widehat{A}) = 100°$, $m(\widehat{D}) = 50°$	
$\widehat{NRU}$	$\|NR\| = 6$ cm	$m(\widehat{N}) = 100°$, $m(\widehat{U}) = 50°$	

3. Elde ettiğiniz sonuçlardan hareketle ulaştığınız genellemeleri örnekteki gibi yazınız.

Kenar uzunlukları bilinen tek bir üçgen çizilebilir.

4. Gruplara ayrılınız. Varsayımlarınızla genellemelerinizi karşılaştırmak için 2. adımda uyguladığınız yöntemi grup arkadaşlarınızla birlikte daha fazla üçgen çifti üzerinde uygulayınız ve ulaştığınız sonuçları inceleyiniz. İncelemelerinizi geometri tahtası veya matematik yazılımından yararlanarak da yapabilirsiniz. Grup arkadaşlarınızla fikir alışverişi yaparak genellemeler oluşturunuz. Oluşturduğunuz genellemeleri bir önerme olarak örnekteki gibi yazınız.

Tüm kenar uzunlukları eşit olan üçgenler eş üçgenlerdir.


5. Elde ettiğiniz önermeleri değerlendirmek amacıyla aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

a) Eş üçgenlerin nasıl oluştuğuna ve bu üçgenlerle günlük hayatta nerelerde karşılaşabileceğinize ilişkin örnekler veriniz.

b) Elde ettiğiniz eşlik koşullarından hareketle ikizkenar bir üçgenin taban açılarının eş olmasının nedenini açıklayınız.

c) Karşılıklı kenarları paralel olan bir dörtgenin bir köşegeninin ayırdığı üçgenlerin eş olduğunu eşlik koşullarından yararlanarak açıklayınız.

İki üçgenin köşeleri arasında bire bir eşleme yapıldığında üçgenlerin karşılıklı kenar uzunlukları ve karşılıklı açılarının ölçüleri eşit ise bu üçgenlere **eş üçgenler** denir. Eşlik "$\cong$" sembolü ile gösterilir.



Eşlik ilişkisinin sembol temsilinde karşılıklı köşelerin aynı sırada yazıldığına dikkat ediniz.

Yukarıda verilen üçgenler eş üçgenlerdir ve $\overset{\frown}{KLM} \cong \overset{\frown}{PRT}$ şeklinde temsil edilir.


Kenar-Kenar-Kenar Eşliği

Üç kenar uzunluğu bilinen tek bir üçgen çizilebileceğinden kenar uzunlukları eşit olan iki üçgen eştir. Üçgenlerin tüm kenar uzunluklarının eşit olması, üçgenlerin eş olmasının asgari koşullarından biridir. Kenar uzunlukları eşit olan iki üçgenin karşılıklı açı ölçüleri de eşit olur.

3. ÖRNEK


Aşağıda verilen önermenin doğruluğunu ispatlayınız.
"Bir ikizkenar üçgende üçgenin tepe noktasından çizilen kenarortay, aynı zamanda açıortay ve yüksekliktir."

Çözüm



$|AB| = |AC|$ olacak şekilde ABC ikizkenar üçgeni ve bu üçgenin BC kenarına ait $[AH]$ kenarortayı çizilirse oluşan ABH ve ACH üçgenlerinin karşılıklı tüm kenar uzunlukları eşit olduğundan bu üçgenler eştir (K.K.K.). $\widehat{ABH} \cong \widehat{ACH}$ olduğundan $m(\widehat{BAH}) = m(\widehat{HAC}), m(\widehat{ABH}) = m(\widehat{ACH})$ ve $m(\widehat{BHA}) = m(\widehat{AHC}) = 90^o$ olur. Buradan $[AH]$ açıortaydır. $[AH] \perp [BC]$ olduğu için $[AH]$ aynı zamanda yüksekliktir.


4. ÖRNEK




Yandaki ABC üçgeninde $[BC] \perp [AC]$, $|BC| = 4$ cm ve $|AC| = 7$ cm'dir.

ABC üçgeni, C köşesi etrafında saat yönünde 90^o döndürüldükten sonra 3 cm yukarıya öteleniyor. Dönüşümler sonunda A noktası P noktasına geliyor. Buna göre $m(\widehat{BPA})$ nün kaç derece olduğunu bulunuz.

Çözüm



Şekil 1




Şekil 2

ABC üçgeni 90^o döndürüldüğünde Şekil 1'de gösterilen MCN üçgeni oluşur. Oluşan MCN üçgeni 3 cm yukarı ötelendiğinde ilk konumuna göre Şekil 2'deki görüntü oluşur.

Şekil 2'deki üçgenler eş olduğundan $|AB| = |AP|$ elde edilir. Buradan ABP ikizkenar üçgen olur.
$m(\widehat{BAC}) = m(\widehat{APD}) = a, m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{DAP}) = b$ alınırsa ABC üçgeninde $m(\widehat{BAC}) + m(\widehat{ABC}) = 90^o$, $a + b = 90^o$ olur.

$m(\widehat{BAP}) = a + b = 90^o$ ve ABP ikizkenar üçgen olduğundan $m(\widehat{BPA}) = 45^o$ bulunur.

5. Sıra Sizde




Yandaki DEF üçgeni, E köşesi etrafında saatin tersi yönde 70^o döndürüldüğünde F noktası F' noktasına, D noktası D' noktasına geliyor.

$m(\widehat{DEF}) = 80^o$ **ve** $F' \in [DF]$ **olduğuna göre** $m(\widehat{DD'F'}) = x$ **değerini bulunuz.**

Kenar-Açı-Kenar Eşliği

İki kenar uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açı ölçüsü bilinen tek bir üçgen çizilebileceğinden iki kenar uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açı ölçüleri eşit olan iki üçgen eştir. Üçgenlerin karşılıklı iki kenarının uzunluğunun ve bu kenarlar arasındaki açı ölçülerinin eşit olması, üçgenlerin eş olmasının asgari koşullarından biridir. Eş olan bu üçgenlerin karşılıklı açıları ve üçüncü kenarları da eştir.

5. ÖRNEK




Yanda verilen DEF eşkenar üçgeninde

E noktasının F noktasına göre yansıması E',

F noktasının D noktasına göre yansıması F',

D noktasının E noktasına göre yansıması D' noktası olduğuna göre D'E'F' üçgeninin eşkenar üçgen olduğunu gösteriniz.


Çözüm



$m(\widehat{F'FE'}) = m(\widehat{F'DD'}) = m(\widehat{D'EE'}) = 180^o - 60^o = 120^o$ olur. Oluşan F'FE', F'DD' ve D'EE' üçgenleri eş üçgenler olduğundan $|F'E'| = |E'D'| = |D'F'|$ olur (K.A.K.). Buradan F'E'D' üçgeninin eşkenar üçgen olduğu bulunur.

6. Sıra Sizde


1.



Yandaki ABCD dörtgeninde $[AD] \parallel [BC]$ ve $|AD| = |BC|$ dur.

Buna göre ABC ve ADC üçgenlerinin eş olduğunu gösteriniz.

2.




Yandaki KLM eşkenar üçgeninde $P \in [KM]$, $N \in [LM]$, $|LN| = |PM|$ **ve** $m(\widehat{KRP}) = x$ **olduğuna göre x in kaç derece olduğunu bulunuz.**

Açı-Kenar-Açı Eşliği

Üç açısının ölçüsü bilinen sonsuz tane üçgen çizilebileceğinden iki üçgenin karşılıklı açılarının ölçülerinin eşit olması, üçgenlerin eş olması için yeterli değildir. Karşılıklı ikişer açı ölçüsünün ve bir kenar uzunluğunun eşit olması, iki üçgenin eş olması için gereken asgari koşullardan biridir.

6. ÖRNEK



Kare şeklinde bir masa, kare bir masa örtüsü ile masanın köşeleri örtünün kenarları üzerinde olacak şekilde görseldeki gibi tam olarak örtülmüştür. $|BK| = 30$ cm, $|BN| = 40$ cm olduğuna göre


a) Masa örtüsünün alanının kaç cm^2 olduğunu bulunuz.

b) Masa yüzeyinin alanının kaç cm^2 olduğunu bulunuz.

Çözüm

a) Kare şeklindeki KLMN masa örtüsü açıldığında elde edilen şekilde $m(\widehat{KAB}) = x$ ve $m(\widehat{KBA}) = y$ alınırsa AKB üçgeninin iç açılarının ölçüleri toplamından $x + y = 90^o$ olur.

$m(\widehat{KAB}) + 90^o + m(\widehat{LAD}) = 180^o$ olduğundan $m(\widehat{LAD}) = y = 90^o - x$ olur. ALD üçgeninin iç açılarının ölçüleri toplamından $m(\widehat{ADL}) = x$ olur.




Benzer şekilde
$m(\widehat{KAB}) = m(\widehat{ADL}) = m(\widehat{MCD}) = m(\widehat{CBN}) = x$,
$m(\widehat{KBA}) = m(\widehat{DAL}) = m(\widehat{MDC}) = m(\widehat{BCN}) = y$ ve
$|AB| = |AD| = |DC| = |BC|$ olduğundan AKB,
DLA, CMD ve BNC üçgenleri eştir (A.K.A.).
O hâlde $|AK| = |LD| = |MC| = |BN| = 40$ cm,
$|AL| = |MD| = |NC| = |BK| = 30$ cm'dir. Masa örtüsünün alanı, $\text{Alan}(KLMN) = 70 \cdot 70 = 4900 \text{ cm}^2$ bulunur.

b) AKB üçgeninde Pisagor teoreminden
$|AB|^2 = |KB|^2 + |KA|^2 = 30^2 + 40^2$ olur. Buradan
$|AB| = 50$ cm bulunur. Masa yüzeyinin alanı,
$\text{Alan}(ABCD) = 50 \cdot 50 = 2500 \text{ cm}^2$ elde edilir.

7. ÖRNEK

Bir ikizkenar üçgenin eş kenarlarına ait yüksekliklerin birbirine eşit olduğunu ispatlayınız.


Çözüm



$|AB| = |AC|$ olacak şekilde bir ABC üçgeni ile bu üçgenin eş kenarlarına ait $[BE]$ ve $[CD]$ yükseklikleri çizildiğinde BEC ve CDB üçgenlerinde $[BC]$ ortak kenar olur. $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{ACB})$ ve $m(\widehat{BEC}) = m(\widehat{CDB}) = 90^o$ olduğundan üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamından $m(\widehat{EBC}) = m(\widehat{DCB})$ dür. Buradan BEC ve CDB üçgenleri eş (A.K.A.) ve $|BE| = |CD|$ olur.

7. Sıra Sizde


1.



Yandaki şekilde verilen ABC ve CDE üçgenlerinde
$m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{ACE}) = m(\widehat{CDE})$, $|AC| = |CE|$, $|AB| = 2$ birim ve $|ED| = 7$ birimdir.

B, C ve D noktaları doğrusal olduğuna göre $|BD|$ nun kaç birim olduğunu bulunuz.

2.



Yandaki şekilde ABCD kare, AHG üçgen, $G \in [BC]$ ve H, D, C noktaları doğrusaldır.

$m(\widehat{BAG}) = m(\widehat{HAD})$ **olduğuna göre** $m(\widehat{AGH}) = x$ **değerini bulunuz.**

Kontrol Noktası

- Kenar uzunlukları eşit olan iki üçgen eştir.
- Karşılıklı iki açısının ölçüsü ve karşılıklı bir kenar uzunluğu eşit olan üçgenler eştir.
- Karşılıklı iki kenar uzunluğu ve bu kenarların oluşturduğu açı ölçüleri eşit olan üçgenler eştir.


Üçgenlerin Benzer Olma Koşulları

7. Uygulama

Üçgenlerin Benzer Olma Şartları

Aşağıdaki yönergeleri takip ederek soruları cevaplayınız.

1. ABC ve DEF benzer üçgenlerini inceleyiniz. İki üçgenin benzerlik koşulları ile ilgili verilen aşağıdaki soruların cevaplarına ilişkin varsayımlarınızı boş bırakılan alanlara yazınız.



a) Verilen üçgen çiftinin benzer olduğunu söyleyebilmek için bu üçgenlerin karşılıklı tüm açılarının eş ve karşılıklı kenar uzunluklarının orantılı olduğu gösterilmeli midir? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşarak tartışınız.

b) İki üçgenin karşılıklı tüm kenar uzunluklarının orantılı olması, üçgenlerin benzer olduğunu söyleyebilmek için yeterli midir? Fikirlerinizi açıklayınız.

c) İki üçgenin karşılıklı herhangi bir açısının eş ve bu açıyı oluşturan karşılıklı kenarların uzunlukları oranının eşit olması, üçgenlerin benzer olduğunu söyleyebilmek için yeterli midir? Fikirlerinizi açıklayınız.

ç) İki üçgenin iki açı ölçüsünün eşit olması, üçgenlerin benzer olduğunu söyleyebilmek için yeterli midir? Fikirlerinizi açıklayınız. Sizinle aynı fikirde olan arkadaşlarınızın kanıtları ile kendi kanıtlarınızı karşılaştırınız.

2. Aşağıdaki tabloda üçgen çiftleri ve bu üçgenlerin bazı kenar uzunlukları ile açı ölçüleri verilmiştir. Varsayımlarınızı incelemek için bu üçgen çiftlerini matematik yazılım programı kullanarak çiziniz. Bu üçgenlerin karşılıklı açılarının eş, karşılıklı kenar uzunluklarının orantılı olup olmadığını gözlemleyiniz. Gözlemlerinizden hareketle tabloda boş bırakılan kısımları doldurunuz.

Üçgenler	Verilenler	Karşılıklı Açı Ölçüleri Eşit/Eşit Değil	Karşılıklı Kenar Uzunluklarının Oranı Eşit/Eşit Değil	Üçgenler Benzer/Benzer Değil
$\widehat{ABC}$	$\lvert AB\rvert = 6$ cm, $\lvert BC\rvert = 5$ cm, $\lvert AC\rvert = 4$ cm			
$\widehat{DEF}$	$\lvert DE\rvert = 10$ cm, $\lvert EF\rvert = 8$ cm, $\lvert DF\rvert = 12$ cm			
$\widehat{DHI}$	$\lvert DH\rvert = 6$ cm, $\lvert HI\rvert = 15$ cm, $m(\widehat{H}) = 120^\circ$			
$\widehat{JKL}$	$\lvert JK\rvert = 2$ cm, $\lvert JL\rvert = 3$ cm, $m(\widehat{J}) = 120^\circ$			
$\widehat{MNO}$	$\lvert MN\rvert = 4$ cm, $\lvert MO\rvert = 6$ cm, $m(\widehat{M}) = 40^\circ$			
$\widehat{PRS}$	$\lvert PR\rvert = 8$ cm, $\lvert RS\rvert = 12$ cm, $m(\widehat{P}) = 40^\circ$			
$\widehat{TUV}$	$m(\widehat{T}) = 80^\circ$, $m(\widehat{U}) = 70^\circ$			
$\widehat{YZW}$	$m(\widehat{Y}) = 80^\circ$, $m(\widehat{Z}) = 70^\circ$			
$\widehat{NRU}$	$\lvert NR\rvert = 9$ cm, $m(\widehat{N}) = 100^\circ$			
$\widehat{ADK}$	$\lvert AK\rvert = 3$ cm, $m(\widehat{A}) = 100^\circ$			

3. Elde ettiğiniz sonuçlardan hareketle ulaştığınız genellemeleri örnekteki gibi yazınız.

İki üçgenin iç açılarının ölçüleri eşit ise karşılıklı kenarlarının uzunluklarının oranı eşittir.

4. Gruplara ayrılınız. Varsayımlarınızla genellemelerinizi karşılaştırmak için 2. adımda uyguladığınız yöntemi grup arkadaşlarınızla birlikte daha fazla üçgen çifti üzerinde uygulayınız. Ulaştığınız sonuçları inceleyiniz. İncelemelerinizi geometri tahtası veya matematik yazılımından yararlanarak da yapabilirsiniz. Grup arkadaşlarınızla fikir alışverişi yaparak genellemeler oluşturunuz. Oluşturduğunuz genellemeleri bir önerme olarak örnekteki gibi yazınız.


İki üçgenin benzer olması için birer iç açılarının eş ve bu açıyı oluşturan kenar uzunluklarının oranının eşit olması yeterlidir.

5. Elde ettiğiniz önermeleri değerlendirmek amacıyla aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

a) Benzer üçgenlerle günlük hayatta nerelerde karşılaşabileceğinize ilişkin örnekler veriniz. Üçgenlerin benzerliğini verdiğiniz örneklerden biri üzerinde benzerlik koşullarından yararlanarak açıklayınız.

b) Üçgen şeklinde bir kâğıt, iki kenarının orta noktasını birleştiren doğru boyunca kesiliyor ve yeni bir üçgen oluşturuluyor. Oluşan üçgenin ilk üçgene benzer olmasının nedenini benzerlik koşullarından yararlanarak açıklayınız.

İki üçgenin karşılıklı açıları eş ve bu açıların karşısındaki kenar uzunlukları orantılı ise bu üçgenler benzerdir. Benzerlik "$\sim$" sembolü ile gösterilir.



$m(\widehat{A}) = m(\widehat{D}), m(\widehat{B}) = m(\widehat{E}), m(\widehat{C}) = m(\widehat{F})$ ve

$\frac{|AB|}{|DE|} = \frac{|BC|}{|EF|} = \frac{|AC|}{|DF|} = k$ ise

ABC ve DEF üçgenleri benzerdir ve bu üçgenlerin benzerlik oranı k dir. Üçgenlerin benzerliği $\widehat{ABC} \sim \widehat{DEF}$ şeklinde temsil edilir.

Benzer iki üçgenin benzerlik oranı 1 ise bu üçgenler eş üçgenlerdir.

Benzerlik ilişkisinin sembolik temsilinde karşılıklı köşelerin aynı sırada yazıldığına dikkat ediniz.

Kenar-Kenar-Kenar Benzerliği

İki üçgenin karşılıklı üç kenar uzunluğu orantılı ise bu üçgenler benzerdir. Karşılıklı üç kenar uzunluğunun orantılı olması, iki üçgenin benzer olması için gereken asgari koşullardan biridir.


8. ÖRNEK

Rüzgâr, yaz tatilinde gidecekleri illerin konumlarını 1/2 000 000 ölçekli haritada işaretleyip ABC üçgeni oluşturuyor. Oluşturduğu ABC üçgeninin çevre uzunluğunu 39 cm olarak ölçüyor. Buna göre Rüzgâr'ın tatilde izleyeceği rotanın kuş uçuşu mesafesinin kaç km olduğunu bulunuz.

Çözüm

1/2 000 000 ölçekli haritalar, gerçek boyutunun iki milyonda biri olacak şekilde çizildiğinden iki nokta arasındaki kuş uçuşu mesafeler de gerçek boyutunun iki milyonda biri olur. O hâlde Rüzgâr'ın tatilde izleyeceği rota A'B'C' üçgeni olarak modellenirse A'B'C' ve ABC üçgenleri benzerdir (K.K.K.) ve bu üçgenlerin benzerlik oranı 2 000 000'dur. ABC üçgeninin çevresi 39 cm olduğundan A'B'C' üçgeninin çevre uzunluğu $39 \cdot 2\,000\,000 = 78\,000\,000$ cm olur. 1 km = 100 000 cm olduğundan A'B'C' üçgeninin çevre uzunluğu $\frac{78\,000\,000}{100\,000} = 780$ km bulunur.

8. Sıra Sizde




Yandaki birim kareli kâğıda çizilmiş üçgenlerden benzer olanları belirleyiniz. Benzer üçgenlerin sembolik gösterimini ve benzerlik oranlarını yazınız.

Açı-Açı Benzerliği

İki üçgenin karşılıklı iki açısı eş ise bu üçgenler benzerdir. Karşılıklı iki açısının eş olması, iki üçgenin benzer olması için gereken asgari koşullardan biridir. Karşılıklı iki açısının ölçüsü eşit olan üçgenlerin üçüncü açı ölçüleri de eşittir ve karşılıklı kenar uzunlukları orantılıdır.

9. ÖRNEK




Üstte aynı sırada demir atmış üç geminin olduğu bir görsel verilmiştir. Deniz tabanının doğrusal olarak derinleştiği kabul edilmektedir. I ve II numaralı gemiler arasındaki uzaklık 770 m, II ve III numaralı gemiler arasındaki uzaklık 470 m; suyun B noktasındaki derinliği 15 m, D noktasındaki derinliği 28 m'dir. A, B, C, D noktaları doğrusal ve gemilerin her biri 30 m uzunlukta olduğuna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) I numaralı geminin A noktasına uzaklığının kaç metre olduğunu bulunuz.

b) Suyun C noktasındaki derinliğinin kaç metre olduğunu bulunuz.

Çözüm

a)




Gemilerin boyu 30 m olduğundan
$|BC| = 30 + 770 = 800$ m,
$|CD| = 30 + 470 = 500$ m olur. AGD üçgeninde $[BE] \parallel [CF] \parallel [DG]$ olduğu için yöndeş açılardan $m(\widehat{ABE}) = m(\widehat{ACF}) = m(\widehat{ADG})$ ve $m(\widehat{AEB}) = m(\widehat{AFC}) = m(\widehat{AGD})$ olur.

A.A. benzerliğinden $\widehat{ABE} \sim \widehat{ADG}$ ve $\frac{|AB|}{|AD|} = \frac{|BE|}{|DG|}$ olmalıdır. $|AB| = x$ alınırsa $\frac{x}{x+1300} = \frac{15}{28} \Rightarrow x = 1500$ m bulunur.


b) A.A. benzerliğinden $\widehat{ABE} \sim \widehat{ACF}$ ve $\frac{|AB|}{|AC|} = \frac{|BE|}{|CF|}$ olmalıdır. $|CF| = y$ alınırsa $\frac{1500}{2300} = \frac{15}{y} \Rightarrow y = 23$ m bulunur.

10. ÖRNEK




Yandaki şekilde ABC ve EDC bir dik üçgen, $[AC] \perp [DE]$, $|EC| = 7$ cm, $|AB| = 6$ cm ve $|FC| = 2$ cm olduğuna göre $|AF|$ nun kaç cm olduğunu bulunuz.

Çözüm




$m(\widehat{CAB}) = x$ ve $m(\widehat{ACB}) = y$ alınırsa ABC üçgeninin iç açılarının ölçüleri toplamından $x + y + 90^o = 180^o$ ve $x + y = 90^o$ bulunur. FDC, EDC ve EFC üçgenlerinin iç açılarının ölçüleri toplamından $m(\widehat{FDC}) = x$, $m(\widehat{DEC}) = y$ ve $m(\widehat{ECF}) = x$ olur. Şekildeki üçgenlerin iç açıları eş olduğundan tüm üçgenler birbirine benzerdir (A.A.). Buradan $\widehat{EFC} \sim \widehat{CBA}$ olduğu için $\frac{|FC|}{|AB|} = \frac{|EC|}{|AC|} \Rightarrow \frac{2}{6} = \frac{7}{|AC|} \Rightarrow |AC| = 21$ cm elde edilir ve $|AF| = 21 - 2 = 19$ cm bulunur.

11. ÖRNEK



Şekilde birim kareli zemin üzerinde $[AC]$ ile gösterilen bir yürüyüş yolu verilmiştir. A ve B noktalarında bulunan iki hareketli, aynı anda ve aynı yöne doğru sabit hızlarla harekete başlıyor. Hızlı olan hareketli, yavaş olanı C noktasında yakalıyor. Buna göre hareketlilerin hızlarının oranını bulunuz.

Çözüm




$[DC]$ ve $[AE]$ çizilip D ile E noktaları birleştirilirse $|DC| = 2$ birim, $|AE| = 3$ birim olur. $[DC] \parallel [AE]$ olduğu için iç ters açılardan $m(\widehat{EAC}) = m(\widehat{ACD})$ ve $m(\widehat{CDB}) = m(\widehat{AEB})$ olur. O hâlde A.A. benzerliğinden $\widehat{CDB} \sim \widehat{AEB}$ bulunur. $\frac{|DC|}{|AE|} = \frac{|BC|}{|AB|} \Rightarrow \frac{|BC|}{|AB|} = \frac{2}{3}$ olur. $|BC| = 2k$ birim, $|AB| = 3k$ birim alınırsa t sürede A noktasından yola çıkan hareketli 5k birim, B noktasından yola çıkan hareketli 2k birim yol alır.

Yol = hız · zaman olduğundan

$5k = V_1 \cdot t$


$2k = V_2 \cdot t$ eşitlikleri taraf tarafa bölünürse hareketlilerin hızlarının oranı $\frac{V_1}{V_2} = \frac{5}{2}$ bulunur.

12. ÖRNEK



Yanda A ve B noktalarına yerleştirilen aynı görüş açısına sahip özdeş iki kameranın düzlemsel görüntüsü verilmiştir. A noktasındaki kameranın görüş açısı mavi renkle, B noktasındaki kameranın görüş açısı pembe renkle gösterilmiştir. ADE üçgensel bölgesi her iki kameranın görüş alanı içinde bulunmaktadır. $|AD| = 30$ m, $|DE| = 15$ m ve $|AE| = 25$ m olduğuna göre kameralar arasındaki uzaklığın kaç metre olduğunu bulunuz.

Çözüm




Kameralar aynı görüş açısına sahip olduğundan $m(\widehat{EAD}) = m(\widehat{ABE})$ olmalıdır.

$\widehat{AEB}$, ABE ve ADE üçgenlerinin ortak açısı olduğundan A.A. benzerliğinden $\widehat{ABE} \sim \widehat{DAE}$ ve $m(\widehat{BAE}) = m(\widehat{ADE})$ olur.

$|AB| = x$ metre alınırsa $\frac{|AE|}{|DE|} = \frac{|AB|}{|AD|} \Rightarrow \frac{25}{15} = \frac{x}{30} \Rightarrow x = 50$ metre bulunur.

9. Sıra Sizde



Dikey kenarının uzunluğu 90 cm olan KLMN dikdörtgeni şeklindeki bir boy aynası, KL kenarı zemine paralel olacak şekilde köşelerinden vida yardımıyla duvara tutturulmuştur. Bir süre sonra K noktasındaki vida hariç diğer vidalar gevşeyip çıkmış ve ayna KL'M'N' dikdörtgeni ile gösterildiği şekilde devrilmiştir. $|M'R| = |KL'|, |PL'| = 40$ cm'dir ve son konumda aynanın tüm köşeleri duvara temas etmektedir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Aynanın alanının kaç cm^2 olduğunu bulunuz.

b) N' köşesinin zemine uzaklığının kaç cm olduğunu bulunuz.

Kenar-Açı-Kenar Benzerliği

İki üçgenin karşılıklı iki kenar uzunluğu orantılı ve bu kenarların oluşturduğu açılar eş ise bu üçgenler benzerdir. Karşılıklı iki kenar uzunluğunun orantılı ve bu kenarlar arasındaki açı ölçülerinin eşit olması, iki üçgenin benzer olması için gereken asgari koşullardan biridir.


13. ÖRNEK

A, B, C ve D kasabaları arasındaki kuş uçuşu mesafeler ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

- A ve B kasabaları arasındaki en kısa uzaklık 32 km'dir.
- B ve C kasabaları arasındaki en kısa uzaklık 40 km'dir.
- C ve D kasabaları arasındaki en kısa uzaklık 72 km'dir.
- A ve C kasabaları arasındaki en kısa uzaklık 48 km'dir.
- ABCD bir dörtgen ve $[AB] \mathbin{/\!/} [DC]$ dır.

Verilen bilgilere göre kasabaların konumunu gösteren taslak bir çizim yapınız ve A ile D kasabaları arasındaki en kısa uzaklığın kaç km olduğunu bulunuz.


Çözüm



$[AB] \mathbin{/\!/} [DC]$ olduğu için $m(\widehat{BAC}) = m(\widehat{ACD})$ dür. ABC ve ACD üçgenlerinde $\frac{|AB|}{|AC|} = \frac{32}{48} = \frac{2}{3}$, $\frac{|AC|}{|DC|} = \frac{48}{72} = \frac{2}{3}$ ve $m(\widehat{BAC}) = m(\widehat{ACD})$ olduğundan ABC ve ACD üçgenleri benzerdir (K.A.K.). O hâlde $\frac{40}{x} = \frac{2}{3}$ eşitliğinden $x = 60$ km bulunur.

10. Sıra Sizde


1.



Yanda verilen DEF üçgeninde K ve L noktaları bulundukları kenarların orta noktaları olduğuna göre

a) $|EF| = 2|KL|$ **olduğunu gösteriniz.**

b) $[KL] \mathbin{/\!/} [EF]$ **olduğunu gösteriniz.**

2. 

Yandaki yıldız haritasında K, L ve M yıldızlarının konumları birleştirilerek KLM üçgeni oluşturulmuştur. Yıldızların konumu ve aralarındaki uzaklıklar ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

- P ve N yıldızları KLM üçgeninin kenarları üzerindedir.
- $|PK| = 6$ ışık yılı, $|PL| = 10$ ışık yılı, $|NK| = 8$ ışık yılı, $|NM| = 4$ ışık yılı ve $|LM| = 14$ ışık yılıdır.

Buna göre P ve N yıldızları arasındaki mesafenin kaç ışık yılı olduğunu bulunuz.

Kontrol Noktası

- Karşılıklı üç kenar uzunluğu orantılı olan üçgenler benzerdir.
- Karşılıklı birer açısı eş ve bu açıyı oluşturan kenarların uzunlukları orantılı olan üçgenler benzerdir.
- Karşılıklı iki açısı eş olan üçgenler benzerdir.

Performans Görevi

Bir Üçgene Eş ve Benzer Üçgenler Oluşturma

Bu görevde sizden cetvel, açıölçer, pergel, renkli kalemler, kâğıt gibi araç gereçleri kullanarak bir üçgene eş ve benzer üçgenler oluşturmanız; bu üçgenlerin hangi koşula göre eş veya benzer olduğunu göstermeniz ve çalışmanızı sunmanız istenmektedir.

Göreve başlamadan önce aşağıdaki hususa dikkat ediniz.

- Bir çalışma planı oluşturunuz. Yapılacak işleri bu planda belirtiniz. İhtiyaç duyduğunuzda öğretmeninize danışabilirsiniz.

Görev esnasında aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

- Çalışmanızda eşlik ve benzerlik koşullarından her birini en az bir kez kullandığınızdan emin olunuz.
- Eş veya benzer üçgenleri oluştururken takip ettiğiniz adımlara yer verdiğinizden ve bu adımları çizimlerinizle desteklediğinizden emin olarak sunumunuzu oluşturunuz.
- Görevinizi sınıfta ve öğretmeninizin belirlediği sürede tamamlayınız.

Görev bitiminde aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

- Görevinizi tamamladıktan sonra çalışmanızı sınıfta sunarak arkadaşlarınızla paylaşınız.
- Sunumunuzda Türkçeyi düzgün ve etkili kullanmaya dikkat ediniz.
- Çalışmanızı öğretmeninize zamanında teslim ediniz.

Performans göreviniz aşağıdaki karekodda verilen analitik dereceli puanlama anahtarı ile öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir.


Analitik dereceli puanlama anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

Alıştırmalar

1. $|AD| = |BC|$ **ve** $|AB| = |DC|$ **olacak şekilde bir ABCD dörtgeni çiziniz.** $m(\widehat{DAB}) = m(\widehat{DCB})$ **ve dörtgenin karşılıklı kenarlarının paralel olduğunu gösteriniz.**


2. **Bir ikizkenar üçgenin tepe açısına ait açıortay uzunluğunun aynı zamanda üçgenin yüksekliği ve kenarortayı olduğunu çizerek gösteriniz.**

3. ABC üçgeni şeklindeki bir kâğıt $[AD]$ boyunca katlandığında $[AB'] \parallel [BC]$, $m(\widehat{ADB'}) = 70^o$ ve $m(\widehat{DAC}) = m(\widehat{CAB'})$ olmaktadır.




Buna göre $m(\widehat{ACB}) = x$ **değerini bulunuz.**

4. Aşağıdaki şekilde ABCD ve EFGH birer karedir ve EFGH karesinin köşeleri ABCD karesinin kenarları üzerindedir.



$|ED| = 7$ birim, $|GC| = 4$ birim **olduğuna göre ABCD karesinin çevre uzunluğunu bulunuz.**

5. Aşağıdaki ABCD karesinde ADF ve ABE üçgen; $F \in [AB]$, $E \in [BC]$, $|AF| = |BE|$, $|DG| = 9$ cm, $|FG| = 1$ cm, $|AG| = 3$ cm, $[DF] \cap [AE] = \{G\}$ ve $|EG| = x$ cm'dir.




Buna göre


a) **x değerini bulunuz.**

b) **EGD açısının ölçüsünün kaç derece olduğunu bulunuz.**

6. Akif, Şekil 1'deki ABC üçgeni biçimindeki kartonun 8 tanesini kenarları çakışacak şekilde düzlem üzerinde birleştirerek Şekil 2'deki deseni oluşturmuştur.




Şekil 1



Şekil 2


$m(\widehat{ABC}) = 3 \cdot m(\widehat{ACB})$ **olduğuna göre** $m(\widehat{BAC})$ **nü bulunuz.**

7. Aşağıdaki şekilde $D \in [BC]$, $|AB| = 12$ cm, $|BD| = 4$ cm ve $m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{ACD})$ dür.



Buna göre $|DC|$ **nun kaç cm olduğunu bulunuz.**


8. Aşağıda verilen ABC üçgeninde $D \in [AB]$, $E \in [AC]$, $[BC] \parallel [DE]$, $m(\widehat{ABE}) = m(\widehat{EBC})$, $|AD| = 8$ cm, $|DB| = 4$ cm ve $|EC| = 5$ cm olduğuna göre



a) $\dfrac{|DE|}{|BC|}$ **oranını bulunuz.**


b) $|AE|$ **ve** $|BC|$**nun kaç cm olduğunu bulunuz.**

9. Aşağıdaki şekilde A, C, E ve B, C, D noktaları doğrusaldır. $[AB] \parallel [DE]$, $|BC| = 4$ cm, $|CD| = 6$ cm ve $|AC| = 3$ cm'dir.




Buna göre $|AE|$**nu ve** $\dfrac{|DE|}{|AB|}$ **oranını bulunuz.**

10. Aşağıdaki ABC üçgeninde $D \in [AB]$, $E \in [BC]$, $[DE] \parallel [AC]$, $|AC| = 6$ cm, $|DE| = 4$ cm'dir.



Buna göre $\dfrac{|BE|}{|BC|}$ **ve** $\dfrac{|DA|}{|BD|}$ **oranlarını bulunuz.**

11. Aşağıdaki şekilde bir merdivenin yandan görüntüsü verilmiştir. $m(\widehat{DAE}) = m(\widehat{FCB})$, $[DC] \parallel [AB]$, $[DE] \perp [AB]$, $[CF] \perp [AB]$, $|AE| = 9$ m, $|EF| = 6$ m ve $|FB| = 4$ m'dir.




Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Merdivenin yerden yüksekliğini ifade eden $|DE|$**nun kaç m olduğunu bulunuz.**

b) Merdivenin tüm yüzeyi halı ile kaplanacaktır. Basamakların genişliği 1,5 m olduğuna göre kaç metrekare halıya ihtiyaç olduğunu bulunuz.

12. Aşağıdaki görselde uzunlukları 48 cm olan, A ve B noktalarından aynı hizada işaretlenmiş iki metal çubuk ve bu çubuklar ile yapılan farklı iki şekil verilmiştir. Çubuklar Şekil 1'de A noktasında, Şekil 2'de B noktasında kesiştirildiğinde çubukların uçları arasındaki mesafeler, cm cinsinden görselde belirtildiği gibi olmaktadır.



Buna göre çubuk üzerinde alınan A ve B noktaları arasındaki x uzaklığının kaç cm olduğunu bulunuz.


Konu ile ilgili etkileşimli içeriğe ulaşmak için karekodu okutunuz.

Konu ile ilgili daha fazla soru çözmek için karekodu okutunuz.

4.3. BİR ÜÇGENDEN HAREKETLE ONA BENZER ÜÇGENLER OLUŞTURMA

Konuya Başlarken

Bir balık yetiştirme havuzunun içinde yavrulama dönemindeki balıklar için ayrı bir bölme yapılmak istenmektedir. Havuz ABC üçgeni şeklinde aşağıdaki gibi modellenmiştir. Bölme, $K \in [AB]$ ve $L \in [AC]$ olacak şekilde seçilen iki noktanın doğrusal şekilde birleştirilmesi ile oluşturulacaktır.



Oluşacak AKL üçgeni ile ABC üçgeninin benzer olması istendiğine göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1. ABC üçgenine benzer AKL üçgenini oluşturmak için K ve L noktalarını belirlemeden önce hangi ölçümler yapılmalıdır?
2. K ve L noktası $[KL] \parallel [BC]$ olacak şekilde seçilirse AKL ve ABC üçgenlerinin benzer olup olmayacağına ilişkin fikirlerinizi nedenleriyle açıklayınız.
3. AKL ve ABC üçgenlerinin ortak köşesini oluşturan kenar uzunluklarının orantılı olmasının üçgenlerin benzer olması için yeterli olup olmayacağına ilişkin fikirlerinizi nedenleriyle açıklayınız.

Birçok geometrik problemin temelinde iç içe geçmiş benzer üçgenler kullanılmaktadır. Bir üçgene benzer başka bir üçgenin nasıl oluşturulabileceği bilgisi bu problemlerin çözümünün anlamlandırılabilmesi açısından önem taşır. Üçgenlerin benzer olma koşulları dikkate alınarak bir üçgenden hareketle bu üçgene benzer çok sayıda üçgen oluşturulabilir.

8. Uygulama

Benzer Üçgen Oluşturma

Aşağıda verilen ABC üçgeninin AB ve AC kenarları sırasıyla 4 ve 6 eşit aralığa ayrılmıştır. Benzerlik koşullarından hareketle noktalardan ikisini birleştirerek ABC üçgenine benzer üçgenler oluşturunuz ve soruları cevaplayınız.




1. Hangi nokta çiftleri birleştirilirse oluşan üçgenler ile ABC üçgeninin benzer olacağını açıklayınız.

2. Benzer üçgenlerin hangi benzerlik koşuluna göre belirlendiğini yazınız.

3. ABC üçgeninde $[LR]$ çizildiğinde $[LR] \mathbin{/\!/} [BC]$ olmasının nedenini açıklayınız.

14. ÖRNEK



Dikilen direkler ve bu direklerin etrafına sarılan tellerin oluşturduğu üçgensel bir tarlanın modellemesi yanda verilmiştir. Toplam 16 direk şekildeki gibi eşit aralıklarla dikilmiş ve harflendirilmiştir.

Seçilen iki direk arasına tel çekilerek başka bir üçgensel bölge oluşturulmak istenmektedir. A ve M direkleri arasındaki mesafe 108 metre olduğuna göre

a) Tel uzunluğunun ölçüm yapılmadan hesaplanabilmesi için seçilmesi gereken direkleri bulunuz.

b) C ve J direkleri arasına çekilecek telin kaç metre olması gerektiğini bulunuz.

Çözüm

a) AF kenarı 6, FM kenarı 9 eşit aralığa bölünmüştür. Tel uzunluğunun hesaplanabilmesi için Kenar-Açı-Kenar benzerliğinden hareketle AFM üçgenine benzer üçgenler oluşturulmalıdır. Bu üçgenlerin ortak açısı $\widehat{AFM}$ ve kenar uzunlukları oranı $\frac{6}{9}$ olmalıdır.

D ve H noktaları birleştirilirse $\frac{|DF|}{|FH|} = \frac{|AF|}{|FM|} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$ olduğundan $\widehat{DFH} \sim \widehat{AFM}$ olur.

Ç ve Ğ noktaları birleştirilirse $\frac{|FĞ|}{|FÇ|} = \frac{|AF|}{|FM|} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$ olduğundan $\widehat{GFÇ} \sim \widehat{AFM}$ olur.


C ve J noktaları birleştirilirse $\frac{|CF|}{|FJ|} = \frac{|AF|}{|FM|} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$ olduğundan $\widehat{CFJ} \sim \widehat{AFM}$ olur.

A ve I noktaları birleştirilirse $\frac{|FI|}{|AF|} = \frac{|AF|}{|FM|} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$ olduğundan $\widehat{IFA} \sim \widehat{AFM}$ olur.

b) C ve J noktaları birleştirilirse $\widehat{CFJ} \sim \widehat{AFM}$ olduğundan

$\frac{|CJ|}{|MA|} = \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{|CJ|}{108} = \frac{2}{3} \Rightarrow |CJ| = 72$ m bulunur.

11. Sıra Sizde




Yandaki ABC üçgeninde $D \in [AB]$, $F \in [AC]$, $2|BD| = |AD|$, $2|FC| = |AF|$, $|DE| = 5$ birim **ve** $|FE| = 8$ birim **olduğuna göre** $|BC|$**nun alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerleri toplamının kaç birim olduğunu bulunuz.**

9. Uygulama

Paralel Çizme

Aşağıdaki ABC üçgeninin kenarları üzerindeki iki noktayı üçgenin herhangi bir kenarına paralel olacak şekilde birleştiriniz. Oluşturduğunuz üçgenle ABC üçgeni arasındaki ilişkiyi inceleyerek aşağıda verilen soruları cevaplayınız.




1. Oluşan üçgen ile ABC üçgeninin benzer olup olmadığını belirleyiniz.

2. Oluşan üçgen ile ABC üçgeni benzer ise bu benzerliğin hangi benzerlik koşuluna dayandığını açıklayınız.

3. Bir önceki soruda elde ettiğiniz sonucun çizilen tüm paralel doğrular için geçerli olup olmadığını açıklayınız.

4. Bir DEF üçgeni çiziniz. $K \in [DE]$, $L \in [DF]$ ve $[KL] \mathbin{/\!/} [EF]$ olacak şekilde bir DKL üçgeni oluşturunuz. DKL üçgeni ile DEF üçgeninin benzerlik ilişkisinden hareketle bu üçgenlerin kenarları arasındaki orantıyı ifade ediniz.

15. ÖRNEK




İki dağcı, ABC üçgeni şeklinde modellenmiş bir dağın B ve C noktalarından zirveye doğru tırmanmaya başlamıştır. C noktasından hareket eden dağcı yolun $\frac{3}{5}$'ini tırmandığında D noktasında 1500 metre yüksekliğe ulaşmıştır. Bu sırada B noktasından hareket eden dağcı yolun yarısında bulunan E noktasına varmıştır. Verilen bilgilere göre

a) Dağın zirvesinin kaç metre yükseklikte olduğunu bulunuz.

b) E noktasında bulunan dağcının kaç metre yükseğe tırmandığını bulunuz.

Çözüm



$|AC| \cdot \frac{3}{5} = |DC|$ olduğundan $\frac{|DC|}{|AD|} = \frac{3}{2}$'dir.


$|EB| = \frac{|AB|}{2}$ olduğundan $\frac{|AE|}{|BE|} = 1$'dir.

a) Dağcı D noktasında 1500 m yükseklikte olduğundan $[DG]$ yüksekliği çizilirse $|DG| = 1500$ m'dir.

$[AH]$ yüksekliği çizilirse $\widehat{CGD} \sim \widehat{CHA}$ olduğundan $\frac{|DC|}{|AC|} = \frac{|DG|}{|AH|} \Rightarrow \frac{3}{5} = \frac{1500}{|AH|} \Rightarrow |AH| = 2500$ m olur.

b) $[EF]$ yüksekliği çizilirse $\widehat{EBF} \sim \widehat{ABH}$ olduğundan $\frac{|BE|}{|BA|} = \frac{|EF|}{|AH|} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{|EF|}{2500} \Rightarrow |EF| = 1250$ m olur.


16. ÖRNEK



Yandaki ABC üçgeninde $D \in [AC]$, $E \in [BC]$, $|AD| = |DC|$, $|AB| = 6$ birim, $|BE| = 10$ birim, $|EC| = 4$ birim ve $m(\widehat{ABC}) = 70^o$ olduğuna göre $m(\widehat{DEC})$ nün kaç derece olduğunu bulunuz.

Çözüm

$K \in [BC]$ olmak üzere ABC üçgenine D noktasından $[AB]$na paralel olacak şekilde $[DK]$ çizilsin.




$\widehat{CDK} \sim \widehat{CAB}$ olduğundan (A.A.) $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{DKC}) = 70^o$ ve

$\frac{|DC|}{|AC|} = \frac{|CK|}{|CB|} = \frac{|DK|}{|AB|} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{|CK|}{14} = \frac{|DK|}{6}$ eşitliğinden

$|CK| = |BK| = 7$ birim, $|DK| = 3$ birim bulunur. $|KE| = 7 - 4 = 3$ birim ve $|KE| = |DK| = 3$ birim olduğundan DKE ikizkenar üçgen ve $m(\widehat{KDE}) = m(\widehat{DEK}) = 55^o$ olur. $m(\widehat{DEC}) = 180^o - 55^o = 125^o$ bulunur.

Bir üçgenin iki kenarının orta noktasını birleştiren doğru parçası üçgenin orta tabanıdır. Orta taban, üçüncü kenara paralel ve kenar uzunluğunun yarısına eşittir.

17. ÖRNEK



Yandaki ABC üçgeninde $[BE] \cap [AD] = \{F\}$, $2|BD| = |DC|$ ve $|AE| = |EC|$ olduğuna göre

a) $\dfrac{|BF|}{|FE|}$ oranını bulunuz.


b) $\dfrac{|AF|}{|FD|}$ oranını bulunuz.

Çözüm

a) ADC üçgeninde E noktasından DC kenarına $[EK]$ paraleli çizilirse $\widehat{AKE} \sim \widehat{ADC}$ ve $\widehat{EKF} \sim \widehat{BDF}$ olur (A.A.). $2|BD| = |DC| = 2p$ alınırsa

$\widehat{AKE} \sim \widehat{ADC}$ olduğundan $\dfrac{|AE|}{|AC|} = \dfrac{|EK|}{|DC|} \Rightarrow \dfrac{1}{2} = \dfrac{|EK|}{2p} \Rightarrow |EK| = p$ olur.


$\widehat{FKE} \sim \widehat{FDB}$ olduğundan $\dfrac{|BF|}{|FE|} = \dfrac{p}{p} \Rightarrow \dfrac{|BF|}{|FE|} = 1$ bulunur.



b) $\widehat{EKF} \sim \widehat{BDF}$ olduğundan $\dfrac{|KF|}{|FD|} = \dfrac{p}{p} \Rightarrow |KF| = |FD|$ olur. $|KF| = |FD| = n$ alınsın. $\widehat{AKE} \sim \widehat{ADC}$ olduğundan $\dfrac{|AK|}{|AD|} = \dfrac{p}{2p} \Rightarrow 2|AK| = |AD|$ olur. Buradan $|AK| = |KD| = 2n$ ve $\dfrac{|AF|}{|FD|} = \dfrac{3n}{n} = 3$ bulunur.


12. Sıra Sizde

1.



Yandaki ABC üçgeninde $D \in [AB]$, $E \in [AC]$, $[AB] \perp [BC]$, $|AE| = |EC|$ **ve** $2|AD| = 6|BD| = 3|BC|$ **olduğuna göre** $m(\widehat{ADE}) = x$ **in kaç derece olduğunu bulunuz.**

2.




Yandaki ABC üçgeninde $D \in [AC]$, $m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{DBC})$, $2|AD| = |DC|$ **ve** $|BC| = 6x$ birim **olduğuna göre** $|AB|$ **nun x türünden eşitini bulunuz.**

Konu ile ilgili etkileşimli içeriğe ulaşmak için karekodu okutunuz.

Konu ile ilgili çalışma kâğıdına ulaşmak için karekodu okutunuz.

18. ÖRNEK



Yandaki şekilde bir köprünün yandan görünüşünün modellemesi verilmiştir. $[PR]$ ve $[PS]$ halatları P noktasında birbirine diktir.

$\widehat{PRS} \cong \widehat{TGS}$, $[PH] \perp [RG]$, $|HK| = 180$ m ve $|RH| = 40$ m olduğuna göre


a) Hangi üçgenlerin benzer olduğunu gerekçeleriyle belirtiniz.

b) $|PH|$ nun kaç metre olduğunu bulunuz.

c) Kullanılan toplam halat uzunluğunun yaklaşık değerini metre cinsinden bulunuz.

Çözüm

a) PRH üçgeninde $m(\widehat{PRH}) = a$ ve $m(\widehat{RPH}) = b$ alınırsa üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamından $a + b = 90^o$ olur. $m(\widehat{RPS}) = 90^o$ olduğundan $m(\widehat{HPS}) = a$, PHS üçgeninde $m(\widehat{HPS}) + m(\widehat{PSH}) = 90^o$ olduğundan $m(\widehat{PSH}) = b$ olur. PRH, SPH ve SRP üçgenlerinin iç açılarının ölçüleri eşit olduğundan bu üçgenler Açı-Açı benzerlik koşuluna göre benzer üçgenlerdir.



b) $\widehat{PHR} \sim \widehat{SHP}$ olduğundan $\dfrac{|PH|}{|HS|} = \dfrac{|RH|}{|PH|} \Rightarrow \dfrac{|PH|}{90} = \dfrac{40}{|PH|} \Rightarrow |PH| = 60$ m bulunur.


c) $\widehat{PHR} \sim \widehat{SPR}$ olduğundan $\dfrac{|PR|}{|RS|} = \dfrac{|RH|}{|PR|} \Rightarrow \dfrac{|PR|}{130} = \dfrac{40}{|PR|} \Rightarrow |PR| = \sqrt{5200} \approx 72$ m,

$\widehat{PHS} \sim \widehat{RPS}$ olduğundan $\dfrac{|PS|}{|RS|} = \dfrac{|HS|}{|PS|} \Rightarrow \dfrac{|PS|}{130} = \dfrac{90}{|PS|} \Rightarrow |PS| = \sqrt{11700} \approx 108$ m bulunur.

$|PR| + |PS| = 72 + 108 = 180$ m olduğundan toplam halat uzunluğu yaklaşık $180 \cdot 2 = 360$ m bulunur.

Kontrol Noktası

- Bir üçgende farklı iki kenar üzerindeki iki nokta birleştirilerek bir başka üçgen oluşturulduğunda bu üçgenlerin ortak köşesini oluşturan kenarların uzunlukları orantılı ise bu üçgenler Kenar-Açı-Kenar benzerliğine göre benzerdir.
- Bir ABC dik üçgeninin dik köşesinden çizilen yüksekliğin oluşturduğu üçgenler ABC üçgeni ile benzerdir.
- Bir üçgenin herhangi bir kenarına paralel çizilerek oluşturulan üçgen, Açı-Açı benzerliğine göre bu üçgene benzerdir.




Yandaki ABC üçgeninde $d_1 \,//\, d_2$ ise $\widehat{ADE} \sim \widehat{ABC}$ dir (A.A.).

Buradan $\dfrac{|AD|}{|AB|} = \dfrac{|AE|}{|AC|} = \dfrac{|DE|}{|BC|}$ olur.


Alıştırmalar

1. Cetveller birleştirilerek aşağıdaki üçgen şekli oluşturulmuştur.




1 ve 2 numaralı cetveller üzerindeki hangi sayılar arasına bir doğru parçası yerleştirilirse mevcut üçgene benzer bir üçgen elde edilebileceğini bulunuz.

2. Aşağıdaki şekilde $[LP]$ ve $[MN]$, KLM üçgeninin kenarortaylarıdır. $[LP] \cap [MN] = \{G\}$ dir.




Buna göre $2|GP| = |GL|$ olduğunu gösteriniz.

3. Aşağıdaki ABC ve DCE üçgenlerinde $[AB] \perp [BC]$, $|AD| = |DC|$, $m(\widehat{BAC}) = m(\widehat{DEC})$, $|BC| = 2$ birim ve $|CE| = 8$ birimdir.




Buna göre $|AB|$ nun kaç birim olduğunu bulunuz.

4. Aşağıdaki görselde duvara belli bir açı ile dayanmış merdivene çıkan bir kişi yer almaktadır.



Birbirine eşit mesafede toplam 15 basamağı bulunan bu merdivenin duvara dayandığı noktanın yerden yüksekliği 4 metre olduğuna göre merdivenin 7. basamağında bulunan kişinin yerden yüksekliğini bulunuz.

5. Aşağıda ABC dik üçgeni verilmiştir.



$D \in [AC]$, $m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{BCA})$, $|AD| = 3$ birim ve $|DC| = 12$ birim olacak şekilde $[BD]$ nı çiziniz.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) **Hangi üçgenlerin benzer olduğunu nedenleri ile yazınız.**

b) **$|BD|$ nun kaç birim olduğunu bulunuz.**


c) **$|BC|$ nun kaç birim olduğunu bulunuz.**

Konu ile ilgili daha fazla soru çözmek için karekodu okutunuz.

4.4. TALES, ÖKLİD VE PİSAGOR TEOREMLERİ

Konuya Başlarken

Benzerlik çalışmalarında sıkça karşılaşılan şekiller, paralel doğrular ve kesenlerden oluşur. Tales teoremi, paralel doğrular ve kesenler arasındaki ilişkiyi açıklayan bir teoremdir.



Tales, Mısır Piramitleri'nin yüksekliğini ölçmek için gölgelerden faydalanmıştır. Yukarıdaki görsel Giza Piramidi'ni temsil etmektedir. Görselde $[AH]$ piramidin yüksekliğini, $[ED]$ Tales tarafından kullanılan toprağa dikili durumdaki çubuğu, $[DF]$ ve $[HF]$ sırasıyla güneş ışınlarının belirli bir açıyla geldiği bir saatte çubuğun ve piramidin gölge uzunluklarını göstermektedir.

Buna göre Tales'in piramidin yüksekliğini nasıl hesaplamış olabileceğini düşününüz. Fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

Tales Teoremi

Tales, geometrinin sadeleştirilmesine ve daha anlaşılır olmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Ortaya koyduğu Tales teoremi ile paralel doğrular ve kesenler arasındaki ilişkileri açıklayarak temel geometrik ilkeleri daha erişilebilir hâle getirmiştir.


10. Uygulama

Tales Teoremi

Aşağıda verilen teoremin ispatına yönelik adımları uygulayınız.

1. Teoremi inceleyiniz.

Teorem: Birbirine paralel en az üç doğru, farklı iki kesen üzerinde orantılı doğru parçaları oluşturur.



Verilenler: $d_3 \mathbin{/\!/} d_4 \mathbin{/\!/} d_5$ olacak şekilde d_3, d_4 ve d_5 doğrularını kesen farklı d_1 ve d_2 doğruları

İspatlanacak ifade: $\dfrac{|AB|}{|BC|} = \dfrac{|DE|}{|EF|}$

2. Birinci adımda ifade edilen teoremin benzer üçgenler oluşturularak nasıl ispatlanabileceğine ilişkin fikirlerinizi açıklayınız. Fikirlerinizi arkadaşlarınızla saygı çerçevesinde tartışınız.


3. Benzer üçgenler oluşturmak için gerekli çizimleri yapınız ve çiziminizle ilgili açıklamaları yazınız.

4. Yaptığınız çizimler sonucunda oluşturduğunuz benzer üçgenlerin kenarları arasındaki orantıyı ifade ediniz.

5. Teoremin ispatının tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin fikrinizi ispat sürecinde takip ettiğiniz adımlardan hareketle gerekçelendirerek açıklayınız ve arkadaşlarınızla paylaşarak tartışınız.


6. Yaptığınız ispatta kullandığınız yöntemi değerlendirmek için aşağıdaki problemleri çözünüz.

a)



Yandaki ABC üçgeninde A, D, B ile A, E, C doğrusal, B ve C den geçen doğru d_2 ve $d_1 \mathbin{/\!/} d_2$ olmak üzere $\frac{|AD|}{|DB|} = \frac{|AE|}{|EC|}$ olduğunu gösteriniz.


b)



Yandaki ABC üçgeninde D ve F noktası BC kenarı, E noktası AC kenarı üzerindedir. $[AB] \mathbin{/\!/} [ED]$, $[AD] \mathbin{/\!/} [EF]$, $|CF| = a$, $|FD| = b$ ve $|DB| = c$ olarak verilmiştir.

Buna göre a, b ve c uzunlukları arasındaki ilişkiyi bulunuz.


19. ÖRNEK



Meral A,B ve C noktalarına Emine'nin görebileceği şekilde çubuklar dikiyor. Emine A ve B noktalarındaki çubuklarla aynı hizaya gelerek E noktasını, A ve C noktalarındaki çubuklarla aynı hizaya gelerek D noktasını işaretliyor. Meral ve Emine BC uzunluğunu 5 m, AC uzunluğunu 12 m ve DE uzunluğunu 25 m ölçüyor ve göletin genişliğini hesaplıyor.

$[BC] \mathbin{/\!/} [ED]$ olduğuna göre Meral ve Emine'nin göletin genişliğini ifade eden $|CD|$ nu kaç m olarak hesapladığını bulunuz.

Çözüm



$[BC] \parallel [DE]$ olduğundan ABC ve AED üçgenleri benzerdir.

Buradan $\frac{|AC|}{|AD|} = \frac{|BC|}{|ED|}$ dur.


$$\frac{|AC|}{|AD|} = \frac{|BC|}{|ED|} \Rightarrow \frac{12}{12+|CD|} = \frac{5}{25} \Rightarrow \frac{12}{12+|CD|} = \frac{1}{5}$$

$$\Rightarrow 12 \cdot 5 = 12 + |CD|$$

$$\Rightarrow 60 = 12 + |CD| \text{ ve } |CD| = 48 \text{ m bulunur.}$$


20. ÖRNEK

Selin öğretmen, sınıfa $|AB| = |AC|$ ve $|BC| = 28$ cm olan ikizkenar üçgen biçiminde bir karton parçası getirmiştir. Selin öğretmen, bu karton parçasını önce $[AD]$ boyunca ok yönünde C köşesi B köşesiyle çakışacak şekilde katlıyor; sonra $[EF]$ boyunca ok yönünde B köşesi D köşesiyle çakışacak şekilde katlıyor. Katlama işlemleri sonunda elde edilen şekilde AED üçgeninin çevre uzunluğu 42 cm'dir.



Buna göre Selin öğretmenin elde ettiği son şekildeki EFD üçgeninin çevre uzunluğunun kaç cm olduğunu bulunuz.

Çözüm



ABC ikizkenar üçgeni $[AD]$ boyunca C köşesi B köşesiyle çakışacak şekilde katlandığından $[AD] \perp [BC]$ olur. Aynı şekilde $[EF]$ boyunca B köşesi D köşesiyle çakışacak şekilde katlandığından $[EF] \perp [BD]$ ve $|ED| = |EB|$ olur.


EBD ikizkenar üçgeninde $m(\widehat{EBF}) = m(\widehat{EDF}) = \alpha$, $m(\widehat{BEF}) = m(\widehat{DEF}) = \beta$ ve $|BF| = |DF| = 7$ cm'dir. $m(\widehat{ADB}) = 90^o$ olduğundan $m(\widehat{EDA}) = \beta$ olur. $m(\widehat{BED}) = 2\beta$ olduğundan $m(\widehat{EAD}) = \beta$ dır. Bu nedenle EAD üçgeni ikizkenar üçgen ve $|EA| = |ED| = x$ cm olur.

E ve F noktaları $[AB]$ ve $[BD]$ nın orta noktalarıdır. $[EF]$ ise ABD üçgeninin orta tabanını oluşturur. $\widehat{EBF} \sim \widehat{ABD}$ olduğundan $\frac{|BE|}{|BA|} = \frac{|BF|}{|BD|} = \frac{|EF|}{|AD|}$ bulunur. Buradan orta taban $|EF| = y$ cm iken $|AD| = 2y$ cm olarak bulunur.

AED üçgeninin çevre uzunluğu 42 cm olduğundan $x + x + 2y = 42 \Rightarrow x + y = 21$ cm'dir.

EFD üçgeninin çevre uzunluğu $x + y + 7 \Rightarrow 21 + 7 = 28$ cm bulunur.


21. ÖRNEK



ABC üçgeninde $F, E \in [AC], D \in [AB], [DF] \parallel [BE], [DE] \parallel [BC]$, $|AF| = 4$ cm ve $|FE| = 3$ cm olarak verilmiştir.


Buna göre $|EC|$nun kaç cm olduğunu bulunuz.

Çözüm



ABC üçgeninde $|AD| = p$, $|DB| = k$ ve $[DF] \parallel [BE]$ olduğuna göre Tales teoreminden hareketle $\frac{|AF|}{|FE|} = \frac{p}{k} \Rightarrow \frac{4}{3} = \frac{p}{k}$ olur. ABC üçgeninde $[DE] \parallel [BC]$ olduğuna göre $\frac{|AE|}{|EC|} = \frac{p}{k} \Rightarrow \frac{4+3}{|EC|} = \frac{p}{k}$ eşitlikleri yazılabilir. Buradan $\frac{7}{|EC|} = \frac{4}{3} \Rightarrow 3 \cdot 7 = 4 \cdot |EC| \Rightarrow |EC| = \frac{21}{4}$ cm olur.

22. ÖRNEK



Yandaki şekilde ABC ve DCB dik üçgenlerinde $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{DCB}) = 90^o$ ve $[AC] \cap [BD] = \{E\}$ dir. $[AB] \parallel [DC] \parallel [EF]$ ve $|AB| = b$, $|DC| = c$, $|EF| = a$ olarak verilmiştir.

Buna göre $\frac{1}{a} = \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ bağıntısını elde ediniz.

Çözüm

Yandaki şekilde $[AB] \parallel [EF]$ ve $\widehat{EFC} \sim \widehat{ABC}$ dir (A.A.).


$|BF| = x$ ve $|FC| = y$ olmak üzere $\frac{a}{b} = \frac{y}{x+y}$ olur.

Benzer şekilde $[DC] \parallel [EF]$ ve $\widehat{EFB} \sim \widehat{DCB}$ dir (A.A.).


$|BF| = x$ ve $|FC| = y$ olmak üzere $\frac{a}{c} = \frac{x}{x+y}$ olur.

$$\frac{a}{b} + \frac{a}{c} = \frac{y}{x+y} + \frac{x}{x+y} = 1 \Rightarrow \frac{a \cdot c + a \cdot b}{b \cdot c} = 1$$

$$\Rightarrow a(c+b) = b \cdot c \Rightarrow a = \frac{b \cdot c}{c+b} \text{ olur.}$$




Buradan $\frac{1}{a} = \frac{c+b}{b \cdot c} \Rightarrow \frac{1}{a} = \frac{c}{b \cdot c} + \frac{b}{b \cdot c} \Rightarrow \frac{1}{a} = \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ bulunur.



Yandaki şekilde ABC ve BCD üçgen, $[AC] \cap [BD] = \{E\}$, $F \in [BC]$dır.

$[AB] \parallel [DC] \parallel [EF]$ olmak üzere $\frac{1}{x} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ dir.

23. ÖRNEK




Yandaki görselde mum alevinin saydam olmayan bir karton kutu içindeki görüntüsü modellenmiştir. Bu modelde mum alevinin ışığı karton kutuya açılan delikten geçerek kutunun karşı yüzeyinde oluşmaktadır.

B, H, D ve A, H, C noktaları doğrusaldır. $[AB] \parallel [EF] \parallel [CD]$, $|AB| = 12$ cm, $|BH| = 16$ cm ve $|HD| = 8$ cm olarak verilmiştir.

Buna göre mum alevinin kutu yüzeyinde oluşan görüntüsünün boyunun kaç cm olduğunu bulunuz.


Çözüm



$[AB] \parallel [CD]$ ve $m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{BDC})$,
$m(\widehat{BAH}) = m(\widehat{HCD})$ ve $m(\widehat{BHA}) = m(\widehat{DHC})$
olduğundan $\widehat{AHB} \sim \widehat{CHD}$ dir (A.A.).

Buradan $\frac{|BH|}{|HD|} = \frac{|AB|}{|CD|} = \frac{|AH|}{|HC|}$ dur.

$\frac{|BH|}{|HD|} = \frac{|AB|}{|CD|}$ olduğundan $\frac{16}{8} = \frac{12}{|CD|} \Rightarrow |CD| = \frac{12 \cdot 8}{16} = 6$ cm bulunur.




Yukarıdaki şekilde A, E, D; B, E, C noktaları doğrusal ve $[AB] \parallel [CD]$ olmak üzere $\frac{a}{d} = \frac{b}{c} = \frac{e}{f}$ dir.

Konu ile ilgili etkileşimli içeriğe ulaşmak için karekodu okutunuz.

13. Sıra Sizde


1. Arif, yaşadığı ilçeye kurulan rüzgâr türbinlerinden birinin boyunu ölçmek için basit bir kamera düzeneği kullanmıştır.



Yukarıdaki şekilde D, G ve H noktaları doğrusaldır. Rüzgâr türbininin kameradaki görüntüsünün uzunluğu $|AB| = 4$ cm, kameranın genişliği $|FB| = 15$ cm, rüzgâr türbininin kameranın G noktasında bulunan ayağına uzaklığı $|DG| = 3000$ cm'dir.

Buna göre rüzgâr türbininin boyunu ifade eden $|DC|$ nun kaç cm olduğunu bulunuz.


2.




Yandaki şekilde ABC ve BCD üçgen, $[AC] \cap [BD] = \{E\}$, $F \in [BC]$dır. $[AB] \parallel [EF] \parallel [DC]$, $|AB| = 6$ cm, $|DC| = 12$ cm olarak verilmiştir.

Buna göre $|EF|$nun kaç cm olduğunu bulunuz.

3.



Şekil 1




Şekil 2

Şekil 1'de boyunun uzunluğu 1,6 m olan Şükrü'nün günün belli bir saatindeki gölgesinin uzunluğu 2,4 m olarak verilmiştir. Şekil 2'de ise Şükrü'den belli bir mesafe uzaklıktaki ağacın aynı andaki gölge uzunluğu 33 m olarak verilmiştir.

Buna göre ağacın boyunu ifade eden $|ED|$nun kaç m olduğunu bulunuz.


Kontrol Noktası

- TEMEL ORANTI TEOREMİ



Bir ABC üçgeninde $d_1 \parallel d_2$ olmak üzere $\frac{|AD|}{|DB|} = \frac{|AE|}{|EC|}$ dur.

- TALES TEOREMİ



$d_3 \parallel d_4 \parallel d_5$ ve d_3, d_4, d_5 doğrularını kesen farklı iki doğru d_1 ve d_2 olmak üzere $\frac{|AB|}{|BC|} = \frac{|DE|}{|EF|}$ dur.

Öklid Teoremi

Öklid teoremi, matematik tarihinde önemli bir yere sahip olan Antik Yunan matematikçisi Öklid'in ortaya koyduğu teoremlerden biridir.


11. Uygulama

Öklid Teoremi

Aşağıda verilen teoremin ispatına yönelik adımları uygulayınız.

1. Teoremi inceleyiniz.

Teorem: Bir dik üçgende hipotenüse ait yüksekliğin karesi, bu yüksekliğin hipotenüs üzerinde ayırdığı parçaların uzunluklarının çarpımına eşittir.



Verilenler: BAC dik üçgeni, $[AH] \perp [BC]$, $|BH| = p$, $|HC| = k$, $|BC| = a$, $|AC| = b$, ve $|AB| = c$

İspatlanacak ifade: $h^2 = p \cdot k$

2. Teoremin BAC dik üçgeninde hipotenüse ait yüksekliğin çizilmesi ile ortaya çıkan ABH ve ACH dik üçgenleri kullanılarak nasıl ispatlanabileceğine ilişkin fikirlerinizi açıklayınız. Fikirlerinizi arkadaşlarınızla iletişim kuralları çerçevesinde tartışınız.


3. BAC, ABH ve ACH dik üçgenleri arasında herhangi bir benzerlik kuralı var mıdır? Varsa ulaştığınız benzerlik kuralını yazınız.

4. ABH ve CAH üçgenleri arasında belirlediğiniz benzerlik kuralına uygun olarak üçgenlerin kenarları arasındaki ilişkiyi yazınız.

5. Teoremin ispatının tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin fikrinizi ispat sürecinde takip ettiğiniz adımlardan hareketle gerekçelendirerek açıklayınız ve arkadaşlarınızla tartışınız.

6. Yaptığınız ispatta kullandığınız yöntemi değerlendirmek için BAC, ABH ve ACH üçgenleri arasındaki benzerlik kurallarını kullanarak $b^2 = k \cdot a$ ve $c^2 = p \cdot a$ eşitliklerini gösteriniz.

24. ÖRNEK



Yandaki görselde yer alan evin çatısı üçgen şeklinde tasarlanmıştır. ABC üçgeninde $[BA] \perp [CA]$, $[AD] \perp [BC]$, $|BD| = 1,8$ m, $|DC| = 5$ m olarak verilmiştir.

Buna göre


a) $|AD|$ nun kaç m olduğunu bulunuz.

b) $|AB|$ nun yaklaşık değerinin kaç m olduğunu bulunuz.

c) $|AC|$ nun kaç m olduğunu bulunuz.


Çözüm

a)



ABC üçgeninde Öklid teoreminden $|AD| = h$ m olmak üzere $|AD|^2 = |BD| \cdot |DC|$ olduğundan $h^2 = (1,8) \cdot 5 \Rightarrow h^2 = 9 \Rightarrow h = \sqrt{9} = 3$ m olarak bulunur.

b)




ABC ve ABD üçgenleri incelendiğinde $m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{ABC}), m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{ACD})$ ve $m(\widehat{BAC}) = m(\widehat{ADB})$ olduğundan $\widehat{DBA} \sim \widehat{ABC}$ dir (A.A.).

Buradan $\frac{|AB|}{|BC|} = \frac{|BD|}{|AB|} = \frac{|AD|}{|AC|}$ olur.

$\frac{|AB|}{|BC|} = \frac{|BD|}{|AB|}$ olduğundan $|AB|^2 = |BD| \cdot |BC|$ olur.

$|AB|^2 = |BD| \cdot |BC| \Rightarrow |AB|^2 = (1,8) \cdot (6,8) \Rightarrow |AB|^2 = 12,24 \Rightarrow |AB| \approx 3,5$ m bulunur.

c)




ABC ve DAC üçgenleri incelendiğinde $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{DAC}), m(\widehat{BAC}) = m(\widehat{ADC})$ ve $m(\widehat{ACB}) = m(\widehat{ACD})$ olduğundan $\widehat{DAC} \sim \widehat{ABC}$ dir (A.A.).

Buradan $\frac{|AC|}{|CB|} = \frac{|CD|}{|AC|} = \frac{|AD|}{|AB|}$ olur.

$\frac{|AC|}{|CB|} = \frac{|CD|}{|AC|}$ olduğundan $|AC|^2 = |CD| \cdot |CB|$ olur.

$|AC|^2 = 5 \cdot (6,8) \Rightarrow |AC|^2 = 34 \Rightarrow |AC| = \sqrt{34}$ m olarak bulunur.

25. ÖRNEK



Yandaki ABC ve DBE dik üçgenlerinde B, F, E, C noktaları doğrusaldır. $[BA] \perp [CA]$, $[AE] \perp [BC]$, $[BD] \perp [DE]$, $[DF] \perp [BE]$, $|AC| = 12$ cm, $|CE| = 6$ cm ve $|BF| = 3$ cm olarak verilmiştir.

Buna göre $|DB|$ nun kaç cm olduğunu bulunuz.

Çözüm

BAC bir dik üçgen ve $[AE]$ hipotenüse ait yükseklik olduğundan

$|AC|^2 = |CE| \cdot |CB| \Rightarrow 12^2 = 6 \cdot |CB|$ ve $|CB| = 24$ cm bulunur.


Buradan $|BE| = |CB| - |CE| = 24 - 6 = 18$ cm olur.

BDE dik üçgeninde $[DF]$ hipotenüse ait yükseklik olduğundan

$|DB|^2 = |BF| \cdot |BE| \Rightarrow |DB|^2 = 3 \cdot 18 \Rightarrow |DB|^2 = 54$ ve $|DB| = \sqrt{54} = 3\sqrt{6}$ cm bulunur.

14. Sıra Sizde

1.




Yandaki görselde Atakan, Buse, Cemile ve Erkan'ın evlerinin üstten görünümü sırasıyla A, B, C ve E harfleriyle gösterilmiştir.

Atakan'ın evinin Erkan'ın evine olan en kısa uzaklığı 12 m, Buse'nin evinin Cemile'nin evine uzaklığı 25 m'dir. Cemile ile Atakan'ın evleri arasındaki uzaklık Buse ile Atakan'ın evleri arasındaki uzaklıktan daha fazladır. $[AE] \perp [BC]$, $[BA] \perp [CA]$ ve B, E, C noktaları doğrusaldır.

Buna göre Atakan'ın evinin Cemile'nin evine uzaklığını ifade eden $|AC|$ nun kaç m olduğunu bulunuz.

2.



Yandaki şekilde ABC bir dik üçgen, $m(\widehat{BAC}) = 90^o$ ve $[AH] \perp [BC]$ dır. $E \in [AH]$, $m(\widehat{BED}) = 90^o$, $|BD| = |DC|$ ve $|BE| = 6$ cm olarak verilmiştir.

Buna göre $|AB|$ nun kaç cm olduğunu bulunuz.

Pisagor Teoremi

MÖ 6. yüzyılda Antik Yunan matematikçisi Pisagor ve "Pisagor Okulu"nda yetişen öğrenciler, Pisagor teoremini sistematik olarak çalışmış ve kanıtlamıştır. Pisagor, teoremini yalnızca geometrik şekiller üzerinde değil sayıların arasındaki ilişkileri anlamak için de kullanmıştır. Pisagor teoreminin bilinen 300'den fazla kanıtı vardır.

Pisagor teoremi, Öklid'in *Elemanlar* adlı eserinde detaylı bir şekilde ele alınmış ve geometrinin temel taşlarından biri olarak kabul edilmiştir. Öklid, teoremin çeşitli kanıtlarını sunarak matematiksel düşüncenin gelişimine büyük katkıda bulunmuştur.


12. Uygulama

Pisagor Teoremi

Aşağıda verilen teoremin ispatına yönelik adımları uygulayınız.

1. Teoremi inceleyiniz.

Teorem: Bir dik üçgenin dik kenarlarının uzunluklarının kareleri toplamı, hipotenüs uzunluğunun karesine eşittir.



Verilenler: ACB bir dik üçgen, $m(\widehat{ACB}) = 90^o$, $|BC| = a$ birim, $|AC| = b$ birim ve $|AB| = c$ birim

İspatlanacak ifade: $a^2 + b^2 = c^2$

2. Teoremin Öklid teoremi kullanılarak nasıl ispatlanabileceğine ilişkin fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. Gerekli çizimleri Öklid teoremine uygun olarak yapınız ve elde ettiğiniz dik üçgenler ile ACB dik üçgeni arasında herhangi bir benzerlik kuralının olup olmadığını tespit ediniz. Varsa ulaştığınız benzerlik kuralını yazınız.

4. Üçüncü adımda yaptığınız çizim sonucunda ACB dik üçgeni içinde elde ettiğiniz iki farklı dik üçgen ile ACB dik üçgeni arasında belirlediğiniz benzerlik kurallarına uygun olarak ayrı ayrı kenarlar arasındaki ilişkiyi yazınız.


5. Teoremin ispatının tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin fikrinizi ispat sürecinde takip ettiğiniz adımlardan hareketle gerekçelendirerek açıklayınız ve arkadaşlarınızla tartışınız.

6. Bulduğunuz bağıntıyı kullanarak aşağıda verilen soruları cevaplayınız.


a) Üçgenin bir iç açısının ölçüsü 90^o den büyükse bu açının karşısındaki kenar uzunluğu ile diğer kenarlar arasındaki ilişkiyi bulunuz.

b) Üçgenin bir iç açısının ölçüsü 90^o den küçükse bu açının karşısındaki kenar uzunluğu ile diğer kenarlar arasındaki ilişkiyi bulunuz.

26. ÖRNEK



Görsel 1



Görsel 2


Görsel 1'de kısa kenarının uzunluğu 120 cm, uzun kenarının uzunluğu 240 cm olan dikdörtgen biçimindeki yazı tahtası yer almaktadır. Uzun kenarları yere paralel olan yazı tahtası; A, B, C, D noktalarından vidalar ile duvara asılıdır.

Yazı tahtası A, D, C noktalarındaki vidalar kırıldığı için Görsel 2'deki gibi B noktasının etrafında dönmüştür. Bu konumdayken yazı tahtasının A köşesi yerdeki A' noktasının üstüne gelmiştir.

E noktası, tahtanın Görsel 1'deki AD kenarı ile Görsel 2'deki C'D' kenarının kesim noktasıdır ve $|AE| = 30$ cm'dir.

Buna göre $|EC'|$nun kaç cm olduğunu bulunuz.

Çözüm



EAB dik üçgeninde Pisagor teoreminden

$|EB|^2 = |EA|^2 + |AB|^2 \Rightarrow |EB|^2 = 30^2 + 240^2 \Rightarrow$

$|EB|^2 = 900 + 57\,600 \Rightarrow |EB|^2 = 58\,500$ ve

$|EB| = \sqrt{58\,500}$ cm olarak bulunur.

EC'B dik üçgeninde Pisagor teoreminden


$|EB|^2 = |EC'|^2 + |C'B|^2 \Rightarrow \left(\sqrt{58\,500}\right)^2 = |EC'|^2 + 120^2$

$\Rightarrow 58\,500 = |EC'|^2 + 14\,400$

$\Rightarrow |EC'|^2 = 58\,500 - 14\,400$

$\Rightarrow |EC'|^2 = 44\,100$ ve $|EC'| = 210$ cm olarak bulunur.


27. ÖRNEK



Yandaki şekilde ABC eşkenar üçgen, $[DE] \parallel [AB]$, $[AD] \perp [BC]$, $[EF] \perp [AD]$, $D \in [BC]$ ve $E \in [AC]$ dır.

Buna göre $\frac{|AB|}{|FB|}$ oranını bulunuz.

Çözüm




ABC eşkenar üçgeninde $m(\widehat{A}) = m(\widehat{B}) = m(\widehat{C}) = 60^\circ$ dir. $[AB] \parallel [DE]$ olduğundan $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{EDC}) = 60^\circ$ ve EDC üçgeni eşkenar üçgen olur. $|ED| = |DC| = |CE| = 2x$ alınırsa ADC üçgeninde $|DC| = 2x$ ve $[FE]$ orta taban olduğundan $|FE| = x$ elde edilir.

ABC eşkenar üçgeninde $[AD]$ hem açıortay hem yükseklik hem de kenarortay olduğundan $|BD| = 2x$ tir. Buradan ABC eşkenar üçgeninin kenar uzunlukları $|AB| = |BC| = |AC| = 4x$ olarak bulunur.

FED dik üçgeninde Pisagor teoreminden $x^2 + |FD|^2 = (2x)^2 \Rightarrow |FD|^2 = 4x^2 - x^2 \Rightarrow |FD|^2 = 3x^2$ ve $|FD| = x\sqrt{3}$ olur.

FDB dik üçgeninde Pisagor teoreminden $(2x)^2 + (x\sqrt{3})^2 = |FB|^2 \Rightarrow |FB|^2 = 4x^2 + 3x^2$ ve $|FB| = x\sqrt{7}$ olur. Buradan $\frac{|AB|}{|FB|} = \frac{4x}{x\sqrt{7}} \Rightarrow \frac{|AB|}{|FB|} = \frac{4}{\sqrt{7}} = \frac{4\sqrt{7}}{7}$ bulunur.

28. ÖRNEK




Yandaki birim kareli zeminde I, II ve III numaralı doğru parçaları ile A noktası verilmiştir.

A noktasının I numaralı doğru parçasına göre yansıması A' noktasıdır. A' noktasının II numaralı doğru parçasına göre yansıması B' noktası ve B' noktasının III numaralı doğru parçasına göre yansıması C' noktasıdır.

Buna göre $|A'C'|$ nun kaç birim olduğunu bulunuz.

Çözüm




A'B'C' dik üçgeninde Pisagor teoreminden


$|A'C'|^2 = |A'B'|^2 + |B'C'|^2 \Rightarrow |A'C'|^2 = 16^2 + 12^2 \Rightarrow$

$|A'C'|^2 = 144 + 256 = 400$ birim ve $|A'C'| = 20$ birim bulunur.


29. ÖRNEK



$m(\widehat{B}) > 90^o$



$m(\widehat{E}) = 90^o$



$m(\widehat{L}) < 90^o$

Yukarıda verilen ABC, DEF ve KLM üçgenlerinde uzunlukları verilmeyen kenarların uzunluklarının değer aralıklarını bulunuz.

Çözüm

DEF üçgeninde E açısı dik açı olduğundan Pisagor teoremine göre $|DF| = 5$ birim bulunur.

ABC üçgeninde üçgen eşitsizliğine göre $4 - 3 < |AC| < 4 + 3$ ise $1 < |AC| < 7$ olur. Bununla birlikte ABC ve DEF üçgenlerinin ikişer kenar uzunlukları eşit ve ABC üçgeninin B açısının ölçüsü DEF üçgeninin E açısının ölçüsünden büyük olduğu için $|AC| > |DF|$ dur. Bu durumda AC kenarının uzunluğu $5 < |AC| < 7$ bulunur.


KLM üçgeninde L açısının ölçüsü DEF üçgeninin E açısının ölçüsünden küçük olduğu için $|KM| < |DF|$ olur. Bu durumda KM kenarının uzunluğu $1 < |KM| < 5$ bulunur.

Konu ile ilgili etkileşimli içeriğe ulaşmak için karekodu okutunuz.

Konu ile ilgili çalışma kâğıdına ulaşmak için karekodu okutunuz.

15. Sıra Sizde


1.



Yanda verilen ABC üçgeninde $|AB| = 5$ birim, $|AC| = 12$ birim ve $m(\widehat{BAC}) > 90^o$ dir.

Buna göre $|BC|$ nun birim cinsinden alabileceği tam sayı değerleri toplamını bulunuz.

2.




Seda ve Gamze görselde verilen parkın etrafında bulunan dikdörtgen şeklindeki yolda yürüyüş yapmaktadır. $|AB| = 120$ m ve $|BC| = 90$ m'dir. Gamze A-D-C yolunu takip ederek saniyede 2 metre hızla, Seda A-C yolunu takip ederek saniyede 1,5 metre hızla C noktasına doğru yürüyor.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Seda'nın aldığı yolun uzunluğunun kaç metre olduğunu bulunuz.

b) Gamze ve Seda'nın C noktasına varış sürelerini karşılaştırınız.

3.




(Birim karelerin her birinin kenar uzunluğu 50 km'dir.)

Yandaki haritada birim kareli alan üzerinde işaretlenen A, B, C ve D noktaları şehirleri göstermektedir. A noktasında bulunan AFAD çalışanları ilk önce B şehrine gitmek koşuluyla B, C ve D noktalarında bulunan şehirlere yardım götürecektir. Şehirleri en kısa yoldan ziyaret edip tekrar A noktasına dönmek zorunda olan çalışanlar, yola çıkmadan önce en uygun rotayı belirlemek için hesaplama yapmışlardır.

Buna göre AFAD çalışanlarının belirlediği rotada katedilecek toplam yol uzunluğunun kaç km olduğunu bulunuz.

Kontrol Noktası

- ÖKLİD TEOREMİ



BAC dik üçgen, $[AH] \perp [BC]$, $|BC| = a$, $|AC| = b$, $|AB| = c$, $|BH| = p$ ve $|HC| = k$ olmak üzere


$h^2 = p \cdot k$

$b^2 = k \cdot a$

$c^2 = p \cdot a$

ilişkilerine ulaşılır.

- PİSAGOR TEOREMİ



BCA dik üçgeninde $m(\widehat{BCA}) = 90^\circ$, $|BC| = a$, $|AC| = b$ ve $|AB| = c$ olmak üzere $a^2 + b^2 = c^2$ dir.


- ABC üçgeninde

$m(\widehat{BCA}) > 90^\circ \Rightarrow c^2 > a^2 + b^2$ dir.

$m(\widehat{BCA}) < 90^\circ \Rightarrow c^2 < a^2 + b^2$ dir.


Alıştırmalar

1. Aşağıdaki ABC ve ACD üçgenlerinde $[FP] \parallel [AD]$, $[EF] \parallel [BC]$, $|AE| = 7$ cm, $|EB| = 6$ cm ve $|FP| = 5$ cm olarak verilmiştir.




Buna göre $|AD|$ nun kaç cm olduğunu bulunuz.

2. Aşağıdaki şekilde $d_1 \parallel d_2 \parallel d_3$, $\dfrac{|AB|}{|BC|} = \dfrac{2}{3}$, $|BP| = 9$ cm, $|PE| = 12$ cm olarak verilmiştir.




Buna göre $|AF| + |CD|$ toplamının kaç cm olduğunu bulunuz.

3. Aşağıdaki ABC üçgeninde B, A, E noktaları doğrusaldır. $[AH] \perp [BC]$, $m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAH})$, $m(\widehat{HAC}) = m(\widehat{CAE})$, $D \in [BC]$, $|AC| = 6\sqrt{2}$ cm ve $|DH| = 1$ cm olarak verilmiştir.




Buna göre $|AH|$ nun kaç cm olduğunu bulunuz.

4. Aşağıdaki ABC dik üçgeninde $[AB] \perp [AC]$, $[AB] \perp [BD]$, $[AD] \perp [BC]$, $|AH| = 6$ cm, $|HD| = 2$ cm olarak verilmiştir.




Buna göre $|AC|$ nun kaç cm olduğunu bulunuz.

5. Aşağıdaki şekilde F, G, C ve D, E, F noktaları doğrusaldır. $E, G \in [AB]$, $[FD] \parallel [BC]$, $|AE| = 6$ cm, $|EG| = 3$ cm ve $|DE| = |EF|$ olarak verilmiştir.




Buna göre $|GB|$ nun kaç cm olduğunu bulunuz.

6. Aşağıdaki şekilde ABC eşkenar üçgen, $D \in [BC]$, $|BD| = 2$ cm ve $|DC| = 8$ cm olarak verilmiştir.



Buna göre $|AD|$ nun kaç cm olduğunu bulunuz.

7. Tayfun, yeni yaptıracağı evin bir odasının pencerelerini eşkenar üçgen şeklinde tasarlamıştır. Bu tasarım için BC kenarı zemine paralel olan ABC üçgenini C köşesi etrafında 120^o lik açıyla döndürerek CB'A' üçgenini elde etmiştir. CB'A' üçgenini A' köşesi etrafında 120^o lik açıyla döndürerek A'C'B'' üçgenini elde etmiş ve $|BC'|$ nu 5 metre ölçmüştür.



Buna göre Tayfun'un tasarladığı eşkenar üçgen şeklindeki pencerenin bir kenarının uzunluğu kaç metredir?

8. Aşağıdaki görselde üçgen biçiminde bir ev yer almaktadır.


A, D, B ve A, E, C noktaları kendi aralarında doğrusaldır. $[DE] \parallel [BC]$, $|AE| = 1,4$ m, $|EC| = 2,4$ m ve $|BD| = |AD| + 0,8$ m'dir.



Buna göre $|AD|$ nun kaç m olduğunu bulunuz.


9. Aşağıdaki ABC üçgeni, C köşesinden $[DE]$ boyunca katlandığında üçgenin A ve C köşeleri üst üste gelmektedir.

$|AB| = |CD|$ ve $m(\widehat{ABC}) = 68^o$, $m(\widehat{ACB}) = \alpha$ olarak verilmiştir.




Buna göre $m(\widehat{ACB}) = \alpha$ kaç derecedir?

10. Aşağıdaki şekilde B, C, D noktaları doğrusaldır. $[AB] \perp [BC]$, $[CD] \perp [DE]$, $|AB| = 12$ cm, $|DE| = 6$ cm, $|BD| = 24$ cm olarak verilmiştir.



Buna göre $|AC| + |CE|$ nun alabileceği en küçük değerin kaç cm olduğunu bulunuz.

11. Aşağıdaki ABCD dörtgeninde $[AC] \perp [BD]$, $|AB| = 9$ cm, $|BC| = 17$ cm ve $|AD| = 24$ cm olarak verilmiştir.




Buna göre $|DC|$ nun kaç cm olduğunu bulunuz.

Konu ile ilgili daha fazla soru çözmek için karekodu okutunuz.

4.5. EŞLİK VE BENZERLİKLE İLGİLİ PROBLEMLER

Konuya Başlarken

İngilizcede pinhole (pinhol) olarak bilinen iğne deliği ve camera obscura (kamera obskura) adı verilen karanlık kutudan oluşan düzenek günümüzde fotoğraf makinesinin en eski ve ilkel formu kabul edilir. Bu düzenekte bir nesnenin görüntüsünün karanlık kutu içinde oluşma mekanizması şu şekilde çalışır: Işık geçirmez kutunun bir yüzeyine küçük bir delik açılır. Kutunun dışındaki nesneden yansıyan ışık, bu delikten geçerek deliğin karşısındaki yüzeye düşer ve ışığın düştüğü yüzeyde nesnenin baş aşağı bir görüntüsü oluşur.



Verilen bilgileri kullanarak ve görseli inceleyerek aşağıdaki soruların cevaplarına ilişkin fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. Görselden hareketle birer kenarını nesne ve nesnenin karanlık kutudaki görüntüsünün oluşturduğu üçgenleri inceleyiniz. İncelediğiniz üçgenlerin açıları ve kenarları arasındaki ilişkileri belirleyiniz.
2. Birinci soruda ulaştığınız ilişkilerden hareketle karanlık kutuda oluşan görüntünün uzunluğunu bulabilmek için başka hangi bilgilere ihtiyaç duyulacağını belirleyiniz.
3. Nesnenin uzunluğu verildiğinde karanlık kutuda oluşan görüntünün uzunluğunu bulabilmek için gerekli stratejiyi oluşturunuz.


Geometrinin temel şekillerinden olan üçgen ile birçok problem durumunda karşılaşılmaktadır. Üçgenlerin eşlik ve benzerlik koşulları ile bu koşullardan hareketle ispatları yapılan teoremler; bir binanın yüksekliğinin bulunması, bir nehrin genişliğinin hesaplanması, haritaların ölçeklendirilmesi gibi problemlerin çözümünde kullanılmaktadır.

13. Uygulama

Eşlik ve Benzerlikle İlgili Problem Çözme

Aşağıda verilenlerden hareketle soruları cevaplayınız.

Aşağıdaki görselde dikdörtgen şeklindeki iki çantanın zemine paralel olacak şekilde monte edilmiş bir askılıktaki durumları verilmiştir. Her iki çantanın kısa kenarının uzunluğunun uzun kenarının uzunluğuna oranı $\frac{3}{5}$'tir.



Çantaların uzun kenarlarının uzunlukları sırasıyla 70 cm ve 35 cm'dir. Ardışık kolları arasındaki mesafe 5 cm olan askılığa turuncu ve kırmızı çantalar uzun kenarları yere paralel olacak şekilde asılmıştır. Yerden yüksekliği 42 cm olan turuncu çantanın kordon uzunluğu 78 cm, kırmızı çantanın yerden yüksekliği 67 cm'dir. Kırmızı çantanın kordon uzunluğunun kaç cm olduğu bulunmak istenmektedir.

1. Kırmızı çantanın kordon uzunluğuna ilişkin problemin verileri ile ulaşılmak istenen sonuç arasındaki ilişkileri belirleyiniz.

2. Problemdeki çantaların uzun ve kısa kenarlarının uzunluklarının aynı oranda olması ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.

3. Problemdeki çantaların kordonları ve birer kenarı kullanılarak oluşturulan iki dörtgen arasında bir ilişki olup olmadığını açıklayınız.

4. İlk 3 soruya verdiğiniz cevaplardan hareketle problemin matematiksel bileşenlerini ve bu bileşenler arasındaki ilişkileri problemin bağlamına uygun şekilde, matematiksel olarak ifade edip kendi cümleleriniz ile açıklayınız.

5. Problemin matematiksel ifadesi ve açıklamanızdan hareketle planlı şekilde ve bilimsel bir bakış açısıyla problemin çözümüne ilişkin bir strateji oluşturunuz.

6. Belirlediğiniz stratejiyi sistematik şekilde uygulayarak problemin çözümünü yapınız. Çözümünüzde hangi geometrik kavramları nasıl kullandığınızı açıklayınız.

7. Çözümünüzü kontrol ederek arkadaşlarınızın çözüm yollarını ve stratejilerini eleştirel bir bakış açısıyla inceleyiniz. Kendi çözüm yolunuz ile arkadaşlarınızın çözüm yollarını ve stratejilerini karşılaştırınız. İncelediğiniz farklı stratejilerden hangilerinin çözüme ulaşmayı sağlayamadığını belirleyiniz. Bu stratejilerle çözüme ulaşamamanın nedenlerine ilişkin fikirlerinizi açıklayarak arkadaşlarınızla saygı çerçevesinde tartışınız.

8. Çözüme ulaşmayı sağlayan stratejilerin başka hangi tür problemlerin çözümünde kullanılabileceğine ilişkin fikirlerinizi gerekçeleriyle açıklayınız.

9. Farklı stratejilerle ilgili çıkarımlarınızın geçerliliğini ve problemin çözüm stratejisine ilişkin gerekçeli yargılarınızı değerlendirmek amacıyla aşağıda verilen durumlarda stratejinizin geçerli olup olmayacağını açıklayınız.


a) Problemde verilen çantaların farklı geometrik şekillerde (kare, ikizkenar üçgen, yarım daire, düzgün altıgen vb.) olması

b) Problemde verilen çantaların tek bir askı kolu kullanılarak asılması


c) Problemde verilen çantaların birbirinden farklı geometrik şekillerde (dikdörtgen-ikizkenar üçgen, kare-eşkenar üçgen vb.) olması

10. 9. soruda verilen durumlarda problemin çözümü için gerekli verilerin, çözüm için kullandığınız geometrik kavramların ve çözüm stratejinizin değişip değişmeyeceğine ilişkin fikirlerinizi açıklayınız.

30. ÖRNEK




Şekil 1


Şekil 2


Nakışçı Semra Hanım bir kartondan Şekil 1'deki ABC üçgenine eş olan yeterli sayıdaki kartonu kesmiştir. Bu kartonları düzlem üzerinde kenarları çakışacak şekilde birleştirerek Şekil 2'deki çiçek desenini oluşturmuştur.

$m(\widehat{ABC}) = 110^o$ ve $|AB| < |BC|$ olduğuna göre $m(\widehat{BAC})$ nün kaç derece olduğunu bulunuz.

Çözüm



Şekil 1




Şekil 2

ABC üçgeni kendisine eş olan bir başka üçgenle en uzun kenarları çakışacak şekilde birleştirilirse Şekil 1'deki dörtgen elde edilir. Bu dörtgenlerden 8 tanesi uzun kenarları çakışacak şekilde birleştirilirse Şekil 2'deki çiçek deseni oluşur. Oluşan desende 16 adet üçgenin ölçüsü en küçük olan açıları tam açı oluşturur. $m(\widehat{ACB}) = \alpha$ alınırsa $16 \cdot \alpha = 360^o$ eşitliğinden $\alpha = 22,5^o$ olur. ABC üçgeninin iç açılarının ölçüleri toplamından

$$110^o + 22,5^o + m(\widehat{BAC}) = 180^o$$

$$m(\widehat{BAC}) = 47,5^o \text{ bulunur.}$$

31. ÖRNEK



Hakan, lideri olduğu dağcılık kulübü üyeleriyle yapacağı yürüyüşte zirvesine ulaşmayı planladıkları tepenin yüksekliğini ve yürüyecekleri mesafeyi hesaplamak istemektedir. Tepenin doğu ve batı yamaçlarının yer düzlemine değdiği noktalar arasındaki kuş uçuşu mesafe 1350 m'dir ve bu noktaların zirveye uzaklıkları eşittir. Tepenin doğu yamacının yer düzlemine değdiği noktanın Hakan'ın bulunduğu noktaya uzaklığı 527 m'dir. Hakan, yukarıda gösterildiği gibi bir nesneden yansıyan ışık ışınının aynaya çarparak göze ulaştığını ve ışının aynayla yaptığı açının ölçüsü ile göze aynadan yansıyan ışının aynayla yaptığı açının ölçüsünün eşit olduğunu bilmektedir. Bu bilgiden hareketle aynayı yer düzleminde kendisinden 2 m uzaklıktaki A noktasına yerleştiren Hakan'ın yer düzlemine dik pozisyonda durduğunda göz hizasının yerden yüksekliği 150 cm'dir. Ayna bu konumdayken tepenin zirve noktası görülmektedir.

Buna göre aşağıdaki problemleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

1. Problem: Hakan ve kulüp üyelerinin tırmanacakları tepenin yüksekliğinin kaç metre olduğunu bulunuz.


2. Problem: Hakan ve kulüp üyelerinin tepenin yamaç noktasından zirveye kadar doğrusal bir yol yürüyecekleri kabul edilirse yürünmesi gereken yolun uzunluğunun kaç metre olacağını bulunuz.

a) Yukarıdaki problemlerin verilerini ve ulaşılmak istenen uzunluklar arasındaki ilişkileri belirleyerek problemleri geometrik şekiller, matematiksel sembol ve gösterimler yardımıyla ifade ediniz.

b) Problemleri çözünüz.

Çözüm


a) Yüksekliği hesaplanacak tepenin doğu ve batı yamaçlarının tepenin zirvesine eşit uzaklıkta olduğu, doğu ve batı yamaçları arasındaki kuş uçuşu mesafe, Hakan'ın göz hizasının yer düzlemine uzaklığı ve Hakan'ın bulunduğu noktanın tepenin doğu yamacına uzaklığı bilinmektedir. Tepe TBD ikizkenar üçgeni; tepenin batı ve doğu yamaçları sırasıyla B ve D noktaları, zirvesi T noktası; Hakan'ın göz hizasının yerden yüksekliği $[KL]$, aynayı koyduğu nokta A ve tepenin yüksekliği $[TH]$ ile modellenerek aşağıdaki görsel oluşturulabilir.



Verilenlere göre $|BD| = 1350$ m, $|DL| = 527$ m, $|AL| = 2$ m ve $|KL| = 150$ cm'dir. Tepenin zirve noktasından yansıyan ışık ışını $[TA]$, Hakan'ın gözüne aynadan yansıyan ışın $[KA]$ ile gösterilirse $m(\widehat{TAD}) = m(\widehat{KAL})$ olur.

b) $|DL| = |DA| + |AL|$ olduğundan $527 = |DA| + 2$ olur. Buradan $|DA| = 525$ m bulunur. TBD ikizkenar üçgen olduğundan $|BH| = |HD|$ olur.

$|BD| = 1350$ m olduğundan $|BH| = |HD| = 675$ m ve $|HA| = |HD| + |DA| = 675 + 525 = 1200$ m bulunur.




$m(\widehat{TAD}) = m(\widehat{KAL})$ ve $m(\widehat{THA}) = m(\widehat{KLA}) = 90^o$ olduğu için Açı-Açı benzerliğinden $\widehat{THA} \sim \widehat{KLA}$ olur ve buradan $\frac{|TH|}{|KL|} = \frac{|HA|}{|LA|} = \frac{|TA|}{|KA|}$ bulunur. 150 cm = 1,5 m olduğundan $\frac{|TH|}{1,5} = \frac{1200}{2}$ elde edilir.

Buradan $|TH| = 900$ m bulunur.


THD dik üçgeninde Pisagor teoreminden $|TD|^2 = |TH|^2 + |HD|^2$ olduğu için $|TD|^2 = 900^2 + 675^2$ olur. Buradan $|TD| = 1125$ m bulunur.

16. Sıra Sizde

Doğrusal bir tahta parçası ve bu parçaya C noktasından monte edilmiş metal bir desteğin oluşturduğu eşit kollu olmayan bir tahterevalli yapılmıştır.



Şekil 1



Şekil 2

Yukarıdaki şekillerde düz bir zemine K noktasında dik yerleştirilen bu tahterevallinin iki farklı konumu modellenmiştir. Tahterevallinin A ucu Şekil 1'deki gibi yere değdiğinde B ucunun yerden yüksekliği 120 cm, B ucu Şekil 2'deki gibi yere değdiğinde A ucunun yerden yüksekliği 60 cm olarak ölçülmüştür.


Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. (Tahterevallinin kalınlığı ihmal edilecektir.)

a) Tahterevalliye yerleştirilen desteğin uzunluğunun kaç cm olduğunu bulunuz.

b) Tahterevalli eşit kollu olacak şekilde tasarlanırsa tahterevallinin A ucunun yere inmesi durumunda B ucunun yerden yüksekliğinin kaç cm olacağını bulunuz.

c) Tahterevalli Şekil 1'deki konumunda iken $|AK| = 30$ cm'dir. Tahterevallinin zemine paralel konumda dengede kalabilmesi için metal desteğin tahta parçasının hangi ucuna doğru, kaç cm hareket ettirilmesi gerektiğini bulunuz.

32. ÖRNEK



Arda, Çanakkale Şehitler Abidesi'nin boyunu ölçmek istemektedir. Bunun için elinde bulunan bir kitabı, abidenin üst ve alt noktası kitabın uzun ve kısa kenarıyla aynı hizaya gelecek şekilde görseldeki gibi gözüne yaklaştırır.

Arda'nın göz hizasının yerden yüksekliği $|BH| = 1,6$ m, abideye uzaklığı $|AH| = 8$ m olduğuna göre

a) Arda'nın abidenin yüksekliği kaç metre olarak ölçtüğünü bulunuz.

b) Aynı ölçümü Arda'dan daha uzun olan Pelin yapsaydı BH, CH ve AH uzunlukları nasıl değişirdi?

Çözüm

a) ABC üçgeninde $m(\widehat{BAC}) = 90^o$ ve $[AH] \perp [BC]$ olduğundan Öklid teoremi gereğince

$|AH|^2 = |BH| \cdot |CH| \Rightarrow 8^2 = |1,6| \cdot |CH| \Rightarrow |CH| = 40$ m olur.


Buradan hareketle Arda abidenin yüksekliğini $|BC| = |BH| + |CH| \Rightarrow |BH| = 40 + 1,6 \Rightarrow |BC| = 41,6$ m bulur.

b) Pelin Arda'dan daha uzun olduğundan Pelin'nin göz hizasının yerden yüksekliği $|BH|$ artar, abidenin yüksekliği sabit olduğundan $|CH|$ azalır.

$|BH| + |CH|$ toplamı sabit iken $|BH|$ ve $|CH|$ birbirine yakın değerler aldığında $|BH| \cdot |CH|$ değeri artar.

$|AH|^2 = |BH| \cdot |CH|$ olduğundan $|AH|$ artar.

17. Sıra Sizde




Şekilde bir gözlem kulesi verilmiştir. Gözlem kulesinin yerden yüksekliği $|BC| = 8$ m, merdivenin zemin ile temas ettiği noktanın kuleye uzaklığı $|AB| = 6$ m'dir.


Merdiven destek direği $[BH]$, $[AC]$'na dik olduğuna göre $|BH|$'nun kaç m olduğunu bulunuz.

33. ÖRNEK

Bir kenarı pencerenin kenarına paralel olan masanın yüksekliği 75 cm, perdeye uzaklığı 30 cm'dir.



Şekil 1



Şekil 2

Şekil 1'de ucunun yerden yüksekliği 210 cm olan stor perde ve yandan görünümü dikdörtgen şeklinde olan masa verilmiştir. Güneş ışınları masa üzerinde en fazla 60 cm uzağa ulaştığında perde Şekil 2'de gösterildiği gibi 75 cm indirilmiştir.


Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Son durumda güneş ışınlarının masa üzerinde en fazla ne kadar uzağa ulaştığını bulabilmek için bir geometrik modelleme yaparak verilen bilgileri ve istenenleri oluşturduğunuz modelin üzerine yazınız.


b) Uygun stratejiyi kullanarak son durumda güneş ışınlarının masa üzerinde en fazla ne kadar uzağa ulaştığını bulunuz.

Çözüm

a) Probleme ilişkin sayısal veriler, ABC ve DBK üçgenleri oluşturularak şekiller üzerine aşağıdaki gibi yerleştirilebilir. Oluşturulan bu modellemede perde yere dik konumda bulunduğundan $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{DBK}) = 90^o$ olur. Bu nedenle ABC ve DBK dik üçgenlerdir.



Şekil 1



Şekil 2

b) Güneş ışınlarının geliş açısı değişmediğinden ABC ve DBK dik üçgenleri benzer üçgenlerdir. Bu üçgenlerin benzerlik oranı hesaplanmalıdır. Bu nedenle öncelikle üçgenlerin eş açılarının karşısındaki kenar uzunlukları bulunmalıdır. Yukarıda yapılan modelleme incelendiğinde üçgenlerin eş açıları; BAC ve BDK açılarının karşılarındaki kenarların uzunlukları, perdenin ucunun yerden yüksekliği ve masanın boyu kullanılarak hesaplanabilir.


Şekil 1'de perdenin ucunun yerden yüksekliğinden masanın boyu çıkarılırsa $|BC| = 210 - 75 = 135$ cm bulunur. Şekil 2'de $|BC|$'ndan perdenin aşağı çekilen kısmını ifade eden $|CK|$ çıkarılırsa $|BK| = 135 - 75 = 60$ cm bulunur. Buradan ABC ve DBK üçgenlerinin benzerlik oranı $\frac{|BC|}{|BK|} = \frac{135}{60} = \frac{9}{4}$ olur ve $\frac{|AB|}{|DB|} = \frac{9}{4}$ bulunur.

$|AB| = 90$ cm ve $|DB| = (x + 30)$ cm olduğundan $\frac{90}{x+30} = \frac{9}{4}$ elde edilir.

Buradan $x + 30 = 40$ cm ve $x = 10$ cm olur.

18. Sıra Sizde

Aşağıdaki görselde doğrusal bir yol üzerinde bulunan A ve B noktalarına yerleştirilmiş iki lamba direği bulunmaktadır. Bu direkler arasında ise 2 metre boyunda olan Necati yer almaktadır. A ve B noktaları arasındaki uzaklık 18 metredir. A ve B direklerindeki lambaların yerden yüksekliği sırasıyla 6 ve 10 metredir. Lambaların K noktasında bulunan Necati'nin her iki tarafında oluşturduğu gölgelerin boyları birbirine eşittir.



Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Lambalardan herhangi birinin oluşturduğu gölgenin boyunun kaç metre olduğunu bulunuz.

b) K noktasında bulunan Necati, B noktasındaki lamba direğine doğru yürümektedir. Gölgesinin B noktasındaki direğin diğer tarafına geçmemesi için Necati'nin yürüyebileceği mesafenin en fazla kaç m olması gerektiğini bulunuz.

Kontrol Noktası

- Eşlik ve benzerlikle ilgili kavramların, teoremlerin ve ulaşılan çıkarımların yer aldığı problem durumlarının çözümleri yapılırken öncelikle problemin sayısal ve görsel verileri ile ulaşılmak istenen sonuçlar arasındaki ilişkiler belirlenir.
- Eş ya da benzer üçgenler; bu ilişkilerden yararlanılarak, eşlik ve benzerlik koşulları ile bu koşullardan hareketle ispatlanan teoremler kullanılarak belirlenir ve problemin çözümü için gereken strateji oluşturulur. Problemin çözümü yapılırken gerekli sayısal veriler, matematiksel temsiller kullanılarak elde edilir. Problemin çözümü yapılarak uygulanan stratejinin başka hangi durumlarda kullanılabileceği değerlendirilir.
- Problem farklı yollarla çözülür ve çözümler karşılaştırılır.

Konu ile ilgili etkileşimli içeriğe ulaşmak için karekodu okutunuz.

Konu ile ilgili çalışma kâğıdına ulaşmak için karekodu okutunuz.

Proje Ödevi

Eşlik ve Benzerlikle İlgili Problem Çözme

Bu ödevde sizden eşlik ve benzerlikle ilgili 3 farklı problem durumu araştırmanız veya oluşturmanız, bu problemlerin çözümlerini yapmanız beklenmektedir.

Ödeve başlamadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

- Öğretmeninizin rehberliğinde 3 veya 4 kişilik gruplara ayrılınız.
- Bir çalışma planı oluşturunuz, yapılacak işleri bu planda belirtiniz.
- Çalışmanızı oluştururken takip edeceğiniz adımları belirleyiniz.

Ödev esnasında aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

- En az 3 farklı problem durumu araştırınız veya oluşturunuz.
- Problem durumlarından birinin eşlik ve benzerlikle ilgili kavramların kullanıldığı bir yapı örneği içerdiğinden emin olunuz.
- Problem durumlarının çözümlerini aşamalı olarak ve açıklayarak yapınız.
- Problemlerinizi ve çözümlerinizi geometrik şekiller kullanarak görselleştiriniz.
- Yapı örneği içeren problem durumunu görselleştirecek bir ürün (yapının taslak planını içeren afiş veya poster, yapının maketi vb.) oluşturunuz.
- Çalışma süresince grup arkadaşlarınızla iletişiminizi saygı çerçevesinde sürdürünüz.
- Çalışmanız için sunum hazırlayınız.
- Ödevinizi öğretmeninizin belirlediği sürede tamamlayınız.

Ödev bitiminde aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

- Ödevinizi tamamladıktan sonra sınıfta sunarak arkadaşlarınızla paylaşınız.
- Çalışmanızı öğretmeninize zamanında teslim ediniz.

Proje ödeviniz aşağıdaki karekodda verilen analitik dereceli puanlama anahtarı ile öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir.


Analitik dereceli puanlama anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

Alıştırmalar

1. Zübeyde öğretmen, öğrencilerine üçgenlerde benzerlik konusunu anlatmak için B ve C noktaları etrafında dönebilen üç çubuğun oluşturduğu bir mekanizma tasarlamıştır. Şekil 1'deki $[AB]$, $[BC]$ ve $[CD]$ çubuklarının uzunlukları sırasıyla 17, 12 ve 18 cm'dir. Zübeyde öğretmen, $[AB]$ ve $[CD]$ çubuklarını oklar yönünde döndürerek Şekil 2'de gösterildiği gibi K noktasında sabitliyor; oluşan şekilde A ile D noktaları arasına bir çubuk daha koyuyor.



Şekil 1




Şekil 2


Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) A ve D noktaları arasına konulan çubuğun uzunluğunun kaç cm olduğunu bulunuz.

b) $[AD]$ çubuğu kullanılarak düzenek $[AD] \parallel [BC]$ olacak şekilde hareket ettirilirse K noktası $[CD]$ üzerinde yaklaşık kaç cm yer değiştirir?

2. Evinin bulunduğu H noktasından arkadaşı Halûk'un evini görebilen Gonca, Halûk'un evi ile kendi evi arasındaki uzaklığı hesaplamak için aşağıdaki adımları uyguluyor.


Şekil 1




Şekil 2

- L şeklinde bir cetvelin iki kenarına Şekil 1'deki gibi lazer yerleştiriyor.
- 2 metrelik bir sopayı evinin bulunduğu H noktasında zemine dik şekilde konumlandırıyor.
- Lazer ışınlarından biri Halûk'un evinde belirecek şekilde cetveli T noktasında sopanın üzerine Şekil 2'deki gibi sabitliyor.


Gonca, bu adımları uyguladıktan sonra diğer kenardaki lazer ışınının yerde belirdiği A noktası ile H noktası arasındaki mesafeyi 5 cm olarak ölçüyor. Halûk'un evinin lazer ışının AH üzerinde belirdiği noktada olduğu bilinmektedir.

Buna göre Halûk'un evinin Gonca'nın evine uzaklığının kaç m olduğunu bulunuz.


3. Gülşah'ın tabletinin ekranı dikdörtgen şeklindedir. Ekranın kısa kenarının uzunluğu 12 cm, uzun kenarının uzunluğu 18 cm'dir. Gülşah tabletinde Şekil 1'de görülen ABC dik üçgenini inceliyor. Bunun için önce üçgenin AB dik kenarını Şekil 2'de gösterildiği gibi tabletin kısa kenarı kadar büyütüyor ve üçgenin ekranın üst kenarında 3 cm'lik bir kısmı kapladığını görüyor. Daha sonra tabletin ekranını Şekil 3'teki gibi döndürerek üçgenin AB kenarını ekranın uzun kenarı kadar büyütüyor ve üçgenin ekranın üst kenarında kapladığı kısmı x cm olarak ölçüyor.



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) x in kaç santimetre olduğunu bulunuz.

b) Şekil 2'de modellenen ekrandaki sarı bölge <u>en az</u> yüzde kaç büyütülürse ekranın tümü sarı renkte görünür?

Konu ile ilgili daha fazla soru çözmek için karekodu okutunuz.


Farklı Kaydet

Bu temada öğrendiğiniz bilgileri kendi hatırlayacağınız şekilde bu alana kısaca not edebilirsiniz.

Ölçme ve Değerlendirme

Bu bölümde cevaplamanız için farklı soru tiplerinde 23 adet soru bulunmaktadır.
Ölçme ve değerlendirme bölümünün sonunda verilen karekodu okutarak ek sorulara ulaşabilirsiniz.

1. Şekil 1'de birim kareler üzerinde dik kesişen d ve k doğruları, bir kare ve Selçuklu Kartalı motifine ait görsel verilmiştir. Kareye ve Selçuklu Kartalı motifine öteleme ve yansıma dönüşümleri uygulanarak Şekil 2'deki motif oluşturulacaktır.



Şekil 1




Şekil 2

a) Şekil 1'deki kare a birim yukarı ötelenmiş ve karenin d doğrusuna göre yansıması alınmıştır. Selçuklu Kartalı motifinin k doğrusuna göre yansıması alınmış ve motif b birim sola ötelenmiştir. Sırasıyla uygulanan bu dönüşümler sonucunda Şekil 2'deki motif oluşturulmuştur.

Buna göre $a \cdot b$ **işleminin sonucunu bulunuz.**

b) Aynı motifi farklı dönüşümlerle nasıl oluşturabileceğinizi işlem adımlarını yazarak açıklayınız.

2. Aşağıda görseli verilen pervane modelinin kanatları ikizkenar üçgen şeklinde tasarlanmıştır. Pervane modeli, bu kanatlardan birinin kanadın tepe noktası etrafında eşit dönme açılarıyla dört kez döndürülmesi ile oluşturulmuştur.



Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Kanatların dönme açısının ölçüsünü bulunuz.


b) Herhangi iki pervane kanadı arasındaki açının ölçüsü 52^o olduğuna göre pervanenin kanatlarını oluşturan ikizkenar üçgenlerin taban açısının ölçüsünü bulunuz.

c) Pervane dört kanatlı olacak şekilde tasarlanırsa her bir kanadın dönme açısının ölçüsünün kaç derece olması gerektiğini hesaplayınız.

3. Miletli Tales, denizdeki bir geminin sahile mesafesini hesaplamak için sahile dik bir uçurumun ucuna yere paralel bir çubuk yerleştirmiştir.

Uçurumun uç noktasında dik duran Tales, geminin sahile uzaklığını bulabilmek için çubuğun uç noktasının geminin ön tarafı ile aynı hizaya gelmesi gerektiğini belirtmiştir.

A Tales'in göz hizası, B çubuğun uç noktası, C geminin uç noktasıdır.



Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.


a) A, B, C noktaları doğrusaldır. "h" Tales'in yerden göz hizasına kadar yüksekliği, "c" çubuğun boyu, "d" Tales'in su yüzeyinden yüksekliği olmak üzere x in h, c ve d türünden eşitini bulunuz.

b) $c = 2\,m$, $d = 68\,m$ **ve** $h = 1,7\,m$ **ise geminin karaya uzaklığının kaç metre olduğunu bulunuz.**

c) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların karşısına "D", yanlış olanların karşısına "Y" yazınız.

	İfadeler	D/Y
I.	h ve d uzunlukları değişmeyip c uzunluğu artarsa geminin karaya uzaklığı azalır.	(.....)
II.	c ve d uzunlukları değişmeyip h uzunluğu artarsa geminin karaya uzaklığı azalır.	(.....)
III.	h ve c uzunlukları orantılı olarak azaltılırsa geminin karaya uzaklığı aynı kalır.	(.....)

4. Okul yıllığı için fotoğraf çekimi yapan Asım Bey, öğrencileri aşağıdaki gibi doğrusal sıralamıştır. Sıranın en solunda yer alan Aslı adlı öğrencinin kameraya uzaklığı 6 m iken sağdan dördüncü öğrencinin kameraya uzaklığı 10 metredir. Bu konumda öğrencilerin tümünün kadraja girmediğini gören Asım Bey, onlardan doğrusal olarak biraz geri gitmelerini istemiştir.



Görselde öğrencilerin ilk konumları B ile, ikinci konumları A ile gösterilmiştir. Fotoğrafçının durduğu C noktası ile A ve B noktaları doğrusaldır.

Çekim yapılan fotoğraf makinesi en fazla 25 metre uzaklıktaki bir cismi net olarak görüntüleyebilmektedir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Öğrenciler 3 metre geri gittiklerinde öğrencilerin hepsi kadraja tam sığdığına göre en sol ve en sağdaki öğrencilerin arasında en çok kaç metre mesafe olacağını bulunuz.

b) Grubun en sağındaki öğrencinin görüntüsünün net olması için öğrencilerin sırayı bozmadan, doğrusal olarak en fazla kaç metre geri gidebileceklerini bulunuz.

5. Müşterilerine daha güvenli ve rahat bir erişim sağlamak isteyen bir dükkân sahibi, dükkânının girişindeki merdivenin yanına ölçüleri görselde belirtildiği gibi olan bir rampa inşa etmek istemektedir.

Yatay uzunluğu 143 cm olan bu rampayı inşa etmek için iki metal destek, rampaya A ve B noktalarından yer düzlemine dik olacak şekilde yerleştirilecektir. A noktasına yerleştirilen desteğin uzunluğu 39 cm'dir.



Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) B noktasına yerleştirilen desteğin uzunluğu 9 cm olduğuna göre B noktasının rampanın zemine değdiği C noktasına uzaklığının kaç cm olduğunu bulunuz.

b) Rampayı sağlamlaştırmak için rampanın zemine değdiği C noktasından 66 cm uzağa, yer düzlemine dik olacak şekilde yerleştirilen metal desteğin uzunluğunun kaç cm olduğunu bulunuz.

6. Ayça, bir odanın yüksekliğini dolaylı yoldan ölçmek için yeni bir yöntem geliştirmeye çalışmaktadır.

Yönteminde ip ve cetvel kullanan Ayça, görselde ifade edildiği gibi odanın bir duvarının alt köşesindeki P noktasına bir parça ip bağlar ve ipin diğer ucunu sağ eliyle göz hizasında tutarak duvardan geriye doğru yürür. Duvara olan mesafesini ayarlamak için sol eline aldığı 15 cm uzunluğundaki cetveli duvara paralel olacak şekilde tutar. Cetvelin alt kısmı P noktasıyla, cetvelin üst kısmı duvarın üst köşesindeki K noktasıyla aynı hizaya gelene kadar yürümeye devam ederek duvara olan mesafesini ayarlar.




Buna göre

a) Ayça'nın odanın yüksekliğini hesaplayabilmek için kullandığı yöntemi açıklayınız.

b) Ayça'nın gözü ile P noktası arasındaki mesafe 572 cm ve cetvelin alt kenarı ile Ayça'nın gözü arasındaki mesafe 26 cm olduğuna göre odanın yüksekliğini ifade eden $|PK|$ nu bulunuz.

7. Bir nesneden gelen ışık ışını bir aynaya çarptığında gözünüze yansır. Bu durumun nasıl gerçekleştiği aşağıdaki görselde belirtilmiştir.



Buna göre C noktasından gelen bir ışık ışını D noktasından yansıyarak A noktasına gider ve yansıma yasasına göre CDF geliş açısı ADE yansıma açısına eştir.

$[AC] \parallel EF$ **ve** $[AC] \perp [DB]$ **olduğuna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.**

a) ABD üçgeninin CBD üçgeni ile eş olduğunu ispatlayınız.


b) ACD üçgeninin ikizkenar olduğunu doğrulayınız.

c) Aynadan uzaklaşmanın kişinin gördüğü yansımanın boyutu üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığına ilişkin fikirlerinizi belirtiniz.

8. Bir seramik ustası Şekil 1'deki bir kenar uzunluğu 50 cm olan düzgün altıgen şeklindeki seramiği kenarlarına paralel olacak biçimde kesiyor ve Şekil 2'de A, B, C ile gösterilen üç parçaya ayırıyor. A parçasının çevre uzunluğu 190 cm ve C parçasının çevre uzunluğu 220 cm'dir.



Şekil 1



Şekil 2


Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) A parçasının en uzun kenar uzunluğunun kaç cm olduğunu bulunuz.

b) C parçasının en uzun kenar uzunluğunun kaç cm olduğunu bulunuz.

c) B parçasının çevre uzunluğunun kaç cm olduğunu bulunuz.


9.



Bir ressam sehpasının (şövale) konumu ABC üçgeni olarak yandaki gibi modellenmiştir. ABC üçgeninde $[AB] \perp BC$, $|BD| = |BC|$, $|AD| = 70$ cm ve $|DC| = 20$ cm'dir.

Buna göre sehpa ayağı $|BD|$ nun kaç cm olduğunu bulunuz.

10. Aşağıdaki görselde odanın düz zeminine bir yüzleri duvara denk getirilerek üst üste dizilmiş küp biçiminde koliler ve bu kolilere her bir kolinin köşesine temas edecek şekilde dayanmış süpürge yer almaktadır. Süpürgenin zemine, koli köşelerine ve duvara değdiği noktalar sırasıyla A, B, C, D, E dir ve bu noktalar doğrusaldır. En üstte bulunan kolinin bir yüzünün alanı 4 birimkare, en altta bulunan kolinin bir yüzünün alanı 64 birimkaredir. Kolilerin ön yüzleri aynı hizadadır.




Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Süpürgenin uzunluğunun kaç birim olduğunu bulunuz.

b) Süpürge hareket ettirilmeden en üstte bulunan kutunun üzerine yerleştirilebilecek <u>en büyük</u> hacimli kutunun bir ayrıtının uzunluğunun kaç birim olduğunu bulunuz.

11. Aşağıdaki görselde yer alan duvar ve zemin birbirine diktir. 180 cm boyundaki Saffet'in gölgesi, güneşli bir günde 300 cm ötede bulunan 120 cm yüksekliğindeki duvara şekildeki gibi düşmektedir. Boyu 30 cm olan kedi duvara Saffet'ten 100 cm daha yakındır.




Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Duvarın <u>olmaması</u> durumunda Saffet'in gölgesinin boyunun kaç cm olacağını bulunuz.

b) Kedinin gölgesinin bittiği noktanın duvara uzaklığının kaç cm olduğunu bulunuz.

c) Kedi duvara 50 cm uzaklıkta iken kedinin duvardaki gölgesinin boyunun kaç cm olduğunu bulunuz.

12. Aşağıda 1, 2 ve 3 numaralı binaların birbirlerine göre konumları verilmiştir. Metin, evinin zeminden 15 m yükseklikteki penceresinden baktığında her bir katı eşit yükseklikte olan 14 katlı bir iş merkezini 11. katından itibaren görebilmektedir. Alt katlardan birinde oturan komşusunun evinin penceresinden baktığında ise iş merkezini görmemektedir.



Metin'in bulunduğu 1 numaralı binanın 2 numaralı binaya uzaklığı 30 m, 3 numaralı iş merkezine uzaklığı 90 m'dir. 2 numaralı binanın boyu 20 m'dir.


Buna göre Metin, yerden en çok kaç metre yükseklikten baktığında iş merkezini göremez?

13. Kenar uzunlukları aynı olan dikdörtgen şeklindeki iki kitap bir rafa tüm köşeleri raf yüzeyine temas edecek şekilde görseldeki gibi konulmuştur.



Kitaplardan birinin köşegen uzunluğu $12\sqrt{2}$ cm olduğuna göre A ve E köşeleri arasındaki uzaklığın kaç cm olduğunu bulunuz.

14. Şekilde bahçedeki iki ağaç arasında gergin duran halata üç özdeş kuş evi aynı uzunluktaki iplerle bağlanmıştır.



A, B ve C noktalarında asılı olan kuş evlerinin birbirine ve düz zemine uzaklıklarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

I. B noktasının A noktasına uzaklığı 6 metre, C noktasına uzaklığı 3 metredir.

II. A noktasındaki kuş evinin zeminden yüksekliği 10 metre, C noktasındaki kuş evinin zeminden yüksekliği 4 metredir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) B noktasındaki kuş evinin yerden yüksekliğinin kaç metre olduğunu bulunuz.

b) Aynı halat üzerine yerden yüksekliği 16 metre olan D noktasından bir kuş evi asılırsa D noktasının A noktasına uzaklığının kaç metre olacağını bulunuz.

c) Aşağıdakilerden hangileri yapılırsa A noktasında asılı olan kuş evinin yerden yüksekliği ile C noktasında asılı olan kuş evinin yerden yüksekliği arasındaki fark 8 metre olur? Yazınız.


I. C noktasındaki kuş evi sabit bırakılıp A noktasındaki kuş evi halat üzerinde 3 metre sola kaydırılır.

II. C noktasındaki kuş evi halat üzerinde 1 metre sağa, A noktasındaki kuş evi halat üzerinde 2 metre sola kaydırılır.


III. C noktasındaki kuş evi halat üzerinde 2 metre sağa, A noktasındaki kuş evi halat üzerinde 5 metre sağa kaydırılır.

15. Bir hastane yöneticisi, hasta yatağı siparişi vemek istemektedir. Yöneticinin satın almak istediği hasta yatağı; $[AB]$ boyunca birbirine sabitlenen, iki parçadan oluşan ve sadece Şekil 1 ile Şekil 2'deki gibi $[AB]$ etrafında döndürülerek yükseltilebilen bir yataktır.

Hasta yatağı Şekil 1'deki konumdayken $[FD] \perp [CE]$ ve C, D, A, E doğrusaldır. $|FD| = 75$ cm, $|CD| = 25$ cm'dir. Hasta yatağı Şekil 2'deki konuma getirildiğinde $[GH] \perp [AE]$ olmaktadır. Yatakların Şekil 1 ve Şekil 2'deki döndürülme açıları eşittir.



Şekil 1



Şekil 2

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.


a) **$[GH]$nın uzunluğunu bulabilmek için bir geometrik modelleme yapınız. Verilen bilgileri ve istenenleri oluşturduğunuz modelin üzerine yazınız.**

b) **$[GH]$nın uzunluğunu bulabilmek için gerekli olan stratejiyi belirleyiniz.**


c) **Uygun stratejiyi kullanarak $[GH]$nın uzunluğunu bulunuz.**

ç) **Çözümünüzü arkadaşlarınızın çözümleriyle karşılaştırarak farklı çözüm yollarını inceleyiniz.**

16. Nazlı $|AB| = 12$ birim, $|AC| = 9$ birim olan ABC dik üçgeni biçimindeki kartondan kenar uzunlukları oranı $\frac{2}{3}$ olan bir dikdörtgeni Şekil 1'deki işaretli yerlerden keserek Şekil 2'deki üçgenleri elde ediyor.



Şekil 1




Şekil 2

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) **Şekil 2'deki üçgenlerin alanlarının oranını bulabilmek için bir geometrik modelleme yapınız. Verilen bilgileri ve istenenleri oluşturduğunuz modelin üzerine yazınız.**

b) **Oluşturduğunuz modeli kullanarak Şekil 2'deki üçgenlerin alanlarının oranını bulunuz.**

17. Görseldeki bilardo masasının boyu 300 cm, eni 150 cm'dir. Bilardo masasında ikisi uzun kenarların orta noktalarında, dördü köşelerde olmak üzere bilardo toplarının girebileceği toplam altı cep bulunmaktadır. Beyaz top 1 numaralı cebin bulunduğu köşeden görseldeki gibi 10 cm ve 30 cm içeride olacak şekilde yerleştirilmiştir. Topun masanın bir kenarına çarpma açısı ile o kenardan ayrılma açısı aynıdır. Beyaz topun takip ettiği yol doğrusaldır.



Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.


a) Oyuncu beyaz topu 3 ve 4 numaralı ceplerin olduğu kısa kenara çarptırarak 5 numaralı cebe sokmak istemektedir. Beyaz topun 4 numaralı cebin bulunduğu köşeden kaç cm yukarıda masanın kenarına çarpması gerektiğini bulmak amacıyla bir geometrik modelleme yapınız. Verilen bilgileri ve istenenleri oluşturduğunuz modelin üzerine yazınız.

b) Beyaz topun 5 numaralı cebe girmesi için 4 numaralı cebin bulunduğu köşeden kaç cm yukarıda masanın kenarına çarpması gerektiğini bulabilmek için gereken stratejiyi belirleyiniz.

c) Uygun stratejiyi kullanarak beyaz topun 5 numaralı cebe girmesi için 4 numaralı cebin bulunduğu köşeden kaç cm yukarıda masanın kenarına çarpması gerektiğini bulunuz.

ç) Çözümünüzü arkadaşlarınızın çözümleriyle karşılaştırarak farklı çözüm yollarını inceleyiniz.


18. Şekilde birim kareler üzerine çizilen bir gemi ve O noktası görülmektedir. Gemi O noktası etrafında saat yönünde 180^o döndürülmüş ve geminin bir görüntüsü oluşturulmuştur. Oluşan görüntü 10 birim sola, 7 birim yukarıya ötelenerek yeni bir görüntü elde edilmiştir.




Yapılan dönme ve öteleme dönüşümleri sonucunda elde edilen gemi görüntüsü ile ilk baştaki gemi görüntüsünün çakışan alanı kaç birimkaredir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

19. Şekil 1'de zemine dik konumdaki duvara dayalı 25 m uzunluğundaki merdivenin duvara temas ettiği A noktasının yerden yüksekliği 15 m'dir. Merdiven A noktasından aşağı doğru 8 m kayarak Şekil 2'deki durumda sabit kalmıştır. Merdivenin yere temas eden noktası Şekil 1'de B, Şekil 2'de B' ile gösterilmiştir.



Şekil 1




Şekil 2

Buna göre $|BB'|$ kaç metredir?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

20. Aşağıdaki şekilde yer alan belli bir uzunluktaki verici kulesi yere dik konumdadır. Kule dengede kalması amacıyla aynı doğrultudaki farklı noktalara gergin çelik halatlarla sabitlenmiştir. Verici kulesinden doksanar metre uzaklıktaki noktalara sabitlenen halatların uzunlukları 150 m'dir ve bu halatlar kulenin aynı noktasına bağlanmıştır. 150 m'lik halatların dışında kalan iki halattan biri A, diğeri B noktasına sabitlenmiştir.




Buna göre verici kulesinden 225 m uzaklıktaki A noktasına sabitlenen halatın uzunluğu kaç m'dir?

A) 240 B) 245 C) 250 D) 255 E) 260

21. Şekil 1'de 30 cm kalınlıkta ve zemine dik konumda olan bir duvar ile duvara 185 cm uzaklıkta bulunan bir elektrik direği verilmiştir. Direk, rüzgârlı bir havada temeli olan A noktası sabit kalmak koşulu ile O noktasından kırılarak duvarın üstüne yıkılmış ve Şekil 2'deki durum oluşmuştur. Bu durumda direğin uç noktası A noktasından 10 metre uzakta olacak şekilde yer ile temas etmiştir.



Şekil 1



Şekil 2

$m(\widehat{AOC'}) = 90^o$**, B duvarın orta noktası ve O noktasının yerden yüksekliği** $[OB]$ **olduğuna göre** $|OB|$ **kaç metredir?**


A) 4 B) 12 C) 6 D) 8 E) 16

22. Evinden okula gitmek üzere yola çıkan Ebru, önce 150 metre batıdaki kırtasiyeye uğrayarak silgi almıştır. Ardından 120 metre kuzeydeki pastaneden simit almış ve batı yönünde 250 metre yürüyerek Mahmut ile buluşmuştur. Yola birlikte devam eden Ebru ile Mahmut x metre güneydeki okula ulaşmışlardır.

Okul, Ebru'nun evinden 410 metre uzaklıkta olduğuna göre x in metre cinsinden alabileceği değerler toplamı kaçtır?

A) 320 B) 300 C) 280 D) 260 E) 240

23. Kıyıya 50 metre mesafedeki A noktasında çocukları için kumdan kale yapan Alper, kıyıdan 100 metre uzaklıktaki B noktasında kontrolsüz bir yangının başladığını görüyor. Elindeki kovayla denizden taşıdığı suyu en kısa mesafeyi alarak ateşe döküyor.



$[AE] \perp [EF]$, $[BF] \perp [EF]$ **ve** $|EF| = 80$ metre **olduğuna göre Alper'in katettiği yolun uzunluğu kaç metredir?**

A) 200 B) 190 C) 180 D) 170 E) 160

Tema ile ilgili daha fazla soru çözmek için karekodu okutunuz.

5. TEMA

Algoritma ve Bilişim

5.1. Algoritma Temelli Yaklaşımlarla Problem Çözme

5.2. Algoritmik Yapılar İçerisindeki Mantık Bağlaçları ve Niceleyiciler

5.3. Algoritmalarda ve Matematiksel İspatlarda Mantık Bağlaçları ve Niceleyiciler

▶ **Anahtar Kavramlar**

- akış şeması
- algoritma
- çizge
- mantık bağlaçları
- niceleyiciler
- sözde kod
- şifreleme

▶ **Sembol ve Gösterimler**


- $\wedge, \vee, \veebar, \Rightarrow, \forall, \exists$

▶ **Bu temada sizden**

- algoritma temelli yaklaşımlarla problem çözebilmeniz,
- algoritmik yapılar içerisindeki mantık bağlaçları ve niceleyicileri çözümleyebilmeniz,
- mantık bağlaçları ve niceleyicilerin algoritmalarda kullanımına yönelik edindiğiniz deneyimi farklı matematiksel görev ve problemlere yansıtabilmeniz

beklenmektedir.

Tema boyunca sizden çalışma kâğıtlarındaki soruları çözmeniz, performans görevlerini yerine getirmeniz, ölçme ve değerlendirme sorularını çözmeniz beklenmektedir.



Tema karekodu

Tema sunusuna ulaşmak için karekodu okutunuz.

Başlarken

Günlük hayatta birçok etkinliği daha verimli hâle getirmek için sistematik kurallar ve adımlar izlenebilir. Bir seyahatin aşamalarını planlamak, ders çalışma programı oluşturmak, trafik ışıklarının belli bir düzende yanmasını sağlamak, fabrikada bir ürünün üretim basamaklarını planlamak, bir şirketin reklam stratejilerini belirlemek, hastane personellerinin nöbetlerini planlamak gibi iş ve işlemler sistematik kural ve adımlar izlenerek daha etkin hâle getirilebilir.

Ön Değerlendirme

1. $\begin{array}{r|l} 128 & 7 \\ \cline{2-2} -\,7 & 18 \\ \cline{1-1} 58 & \\ -\,56 & \\ \cline{1-1} 2 & \end{array}$

Yanda verilen bölme işleminin nasıl gerçekleştirildiğini adım adım ifade ediniz.

2. Aşağıda bir doğal sayının 3'e tam bölünüp bölünmediğini bulma yöntemi adım adım açıklanmaktadır.

I. Bir doğal sayının her bir basamağındaki rakamların toplamını hesaplayınız.

II. Bu toplam 3'ün katıysa sayı 3'e tam bölünür.

III. Rakamların toplamı 3'ün katı değilse sayı 3'e tam bölünmez.

Bu durumda üç basamaklı abc doğal sayısının 3'e tam bölünüp bölünmediği, mantık bağlacı ve niceleyici yardımıyla aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

$\forall k, n \in \mathbb{Z}^+$ için $a + b + c = 3k \Rightarrow abc = 3n$

Buna göre bir sayının 9'a tam bölünüp bölünmediğini bulma yöntemini adım adım açıklayınız, mantık bağlacı ve niceleyici yardımıyla ifade ediniz.

3. Ahmet, Burcu ve Canan yazılımcı olarak A, B ve C adındaki teknoloji şirketlerinde çalışmaktadır. Ahmet, Burcu ve Canan'ın sosyal ağ, siber güvenlik ve bulut depolama alanında geliştirdikleri uygulamalar ve çalıştıkları şirketlerle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

- Her yazılımcı, farklı bir şirkette çalışmakta ve farklı bir uygulama geliştirmektedir.
- Ahmet, C şirketinde çalışmamaktadır.
- A şirketinde çalışan yazılımcı, sosyal ağ uygulaması geliştirmiştir.
- Burcu, siber güvenlik uygulaması geliştirmiştir.

Buna göre aşağıda verilen cümlelerin başındaki noktalı yerlere ifade doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.

(....) Ahmet bulut depolama alanında uygulama geliştiriyorsa Canan A şirketinde çalışmaktadır.

(....) Ahmet A şirketinde çalışıyorsa Burcu B ya da C şirketinde çalışmaktadır.

(....) Burcu B şirketinde çalışıyorsa Ahmet sosyal ağ ya da bulut depolama alanında uygulama geliştirmektedir.

(....) Ahmet B şirketinde çalışıyorsa Canan siber güvenlik uygulaması geliştirmektedir.

5.1. ALGORİTMA TEMELLİ YAKLAŞIMLARLA PROBLEM ÇÖZME


Konuya Başlarken

İsviçreli matematikçi Euler (Öyler), Pregel (Pregil) Nehri üzerinde yedi köprünün yer aldığı Königsberg (Könisberk) şehrinde 1736'da bir yürüyüş rotası problemi üzerine çalışmıştır. Bu bağlamda Pregel Nehri ve civarını gösteren güncel uydu görüntüsü Görsel 1'de verilmiştir.

Euler şehrin köprülerini, yürüyüş yollarını ve A noktasının üzerinde olduğu adayı modellemiştir (Görsel 2). Her köprüden yalnızca bir kez geçmek şartıyla başlangıç noktasına dönmenin mümkün olup olmadığını araştırmıştır.



Görsel 1



Görsel 2

Verilen bilgileri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız ve fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. Görsel 2'de verilen A, B, C ve D noktalarından birini başlangıç noktası olarak belirleyiniz. Başladığınız noktaya dönmek için yedi köprüyü kullanarak her köprüden yalnızca bir kez geçmek şartıyla bir rota oluşturulabilir mi? Açıklayınız.
2. Seçtiğiniz başlangıç noktasının rotanız üzerindeki etkisini değerlendiriniz.
3. Görsel 2'de bazı noktaların daha fazla köprüyle bağlantılı olduğu görülmektedir. Bu durumun başladığınız noktaya dönebilmek için izleyeceğiniz rotayı nasıl etkilediğini açıklayınız.
4. Euler bu soruyu çözerken nasıl bir yol izlemiş olabilir? Euler'in çalışmasından hareketle algoritma kelimesinin kökeninin ne olabileceğini tartışınız.

Algoritma terimi, ünlü matematikçi Harizmi'nin adından türemiştir. Harizmi'nin eserleri, XII. yüzyılda Latinceye *Algoritmi de numero Indorum* [Algoritmi de numero İndorum (Hint Sayıları Üzerine Algoritmalar)] olarak çevrilmiştir. XIII. yüzyılda algoritma kelimesi Arapça "ondalık sistem" anlamını taşımakta olup bu anlam 0'dan 9'a kadar olan sayılar ve ondalık sistem kavramını içermektedir. XIX. yüzyılda bu terim Fransızcada "algorithme" (algoritim) olarak yeniden şekillenmiş ve anlamı korunarak İngilizceye "algorithm" (algoridım) olarak geçmiştir. Günümüzde algoritma, bir problemi çözmek veya belirli bir görevi tamamlamak için izlenen açık ve anlaşılır şekilde belirlenmiş kural ve işlemlerin adım adım uygulanmasını ifade eder.

1. Uygulama

Para Üstünün Hesaplanması

Verilen bilgileri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.


Bir kitapçıda satılan bir kitabın fiyatı 68 TL'dir. Kitabı satın alan müşteri kasiyere 200 TL vermiştir. Yazar kasada bulunan kâğıt ve madenî paralar 1 TL, 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL'dir.

1. Kitap satın alımı ve para üstü hesaplama sürecindeki temel matematiksel işlemleri ve karar adımlarını belirleyiniz.

2. Para üstü hesaplamasını yaparken müşteriye verilecek kâğıt ve madenî paraların sayısını liste veya tablo temsili yardımıyla belirleyiniz.

3. Liste veya tablodaki bilgileri sıralı işlem adımlarına dönüştürünüz.
1. adım: Müşterinin verdiği 200 TL'yi al.

4. Belirlediğiniz işlem adımlarını para üstü verme sürecini gösterecek şekilde aşağıdaki şema üzerinde gösteriniz.



5. Kasada 100 TL'lik banknot bulunmadığı durumda 2, 3 ve 4. soruda yer alan basamakları yeniden oluşturunuz.

6. Her bir kâğıt paranın kasada olup olmama durumunu da dikkate alarak para üstü vermenin genel bir şemasını oluşturunuz.

7. Para üstünün her durumda doğru verilip verilmediğini şemanızın her bir adımı için kontrol ediniz.

8. Bu problemi çözmek için kullanılabilecek her bir yöntemin (liste, tablo, şema) avantajlarını belirleyiniz.

9. Bu yöntemlerden hangisinin daha sistematik ve etkili olduğunu değerlendiriniz.

Algoritmik yaklaşım; algoritmaların geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve uygulanması için kullanılan kapsamlı bir problem çözme yöntemini tanımlar. Özellikle bilgisayar bilimleri, matematik, mühendislik, ekonomi gibi alanlarda yaygın olarak kullanılan bu yaklaşımın temel prensipleri her türlü bilim dalında uygulanabilir.

2. Uygulama

Doğrusal Fonksiyonun Sıfırını Algoritmik Yaklaşımla Bulma

Verilen bilgileri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

$f: R \rightarrow R$, $f(x) = 3x + 6$ şeklinde tanımlı doğrusal fonksiyon veriliyor.

1. f doğrusal fonksiyonunun sıfırını bulmak için gereken adımları ve işlemleri belirleyiniz.

2. f doğrusal fonksiyonunun sıfırını cebirsel ve grafik temsilleri yardımıyla belirleyiniz.

3. Her bir temsildeki bilgileri sıralı işlem adımlarına dönüştürünüz.

4. Belirlediğiniz işlem adımlarını aşağıdaki şemada gösteriniz.

Grafik Temsili İşlem Adımları

Cebirsel Temsil İşlem Adımları

5. $\forall a, b \in R, g: R \to R, g(x) = ax + b$ şeklinde tanımlı doğrusal fonksiyonun sıfırını bulmak için 2, 3 ve 4. soruda yer alan basamakları yeniden oluşturunuz.

6. Her a ve b değeri için g doğrusal fonksiyonunun sıfırını bulmanın genel bir şemasını oluşturunuz.

7. Şemanızın adımlarının her a ve b değeri için g doğrusal fonksiyonunun sıfırını buldurup buldurmadığını kontrol ediniz.

8. Bu problemi çözmek için kullanılabilecek her bir yöntemin (grafik, cebirsel) avantajlarını belirleyiniz.

9. Bu yöntemlerden hangisinin daha sistematik ve etkili olduğunu değerlendiriniz.

Algoritmik doğal dil, bir problemi çözme adımlarını günlük dili kullanarak sıralı ve açık biçimde anlatan bir yöntemdir. Bu yöntem teknik detaylardan uzak, herkesin anlayabileceği basit ifadelerle algoritmanın nasıl işlediğini gösterir.

Algoritmada kullanılan verilerin düzenli ve anlamlı bir biçimde gösterilmesine **veri yapısı** denir.




Örneğin uzun kenarının uzunluğu 8 birim, kısa kenarının uzunluğu 4 birim olan bir dikdörtgenin alanını bulan algoritmanın işleyişi doğal dille aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

Algoritmik Doğal Dil	*Algoritmanın Çalışması*
1. adım: Başla.	
2. adım: Girdilerin alınması Dikdörtgenin uzun ve kısa kenarının uzunluklarını kullanıcıdan al.	Uzun kenarının uzunluğu 8 birimdir. Kısa kenarının uzunluğu 4 birimdir.
3. adım: Alanın hesaplanması Dikdörtgenin alanı, uzun ve kısa kenarının uzunluklarının çarpımına eşittir. Bu işlemi gerçekleştir.	Alanı $8 \cdot 4 = 32$ birimkare olur.
4. adım: Sonucun yazdırılması Hesaplanan alanı kullanıcıya bilgi vermek amacıyla ekrana ya da bir dosyaya yazdır.	Elde edilen çıktı aşağıdaki gibidir. Dikdörtgenin alanı 32 birimkaredir.
5. adım: Bitir.	

Akış şeması, bir problemi çözme adımlarının görsel temsilidir. İşlemleri, karar noktalarını (evet veya hayır) ve akış yönlerini çeşitli geometrik şekiller kullanarak gösterir.


Akış şemasında kullanılan semboller (geometrik şekiller) ve anlamları Tablo 5.1'de verilmiştir.

Tablo 5.1: *Akış Şemasında Kullanılan Semboller ve Anlamları*

Sembol	Anlamı
	Akış şemasının başlangıcını veya sonunu gösterir.
	Veri girişini veya çıktıyı temsil eder.
	İşlem yapmak için kullanılır.
	Bir koşulun kontrol edildiği ve akışın iki veya daha fazla yola ayrıldığı karar noktasını ifade eder. Evet/Hayır veya Doğru/Yanlış şeklinde kararlar bu şekille gösterilir. Döngü yapılarında kullanılabilir.
	Akış yönlerini temsil eder.
	Bir işlemin sonucunun veya bir problemin çözümünün yazdırıldığını temsil eder.

Döngü, belirli koşullar sağlandığı sürece tekrar eden (yinelenen) işlemleri yürütmek için kullanılan yapıdır.

Örneğin uzun kenarının uzunluğu 8 birim, kısa kenarının uzunluğu 4 birim olan bir dikdörtgenin alanını bulan algoritmanın işleyişi akış şemasıyla yandaki gibi ifade edilebilir.



Atama operatörleri, değişkenlere veya veri yapılarına değer atamak için kullanılan simgelerdir. Bu operatörler; bir değişkene ilk değerini atamak, güncellemek veya bir hesaplama sonucunu belirlemek için kullanılır. Atama için "←" veya "=" sembolleri kullanılabilir. Burada A değişkenine x · y işleminin sonucu atanmıştır.

Sayısal değerleri veya cebirsel ifadeleri karşılaştırmak için kullanılan karşılaştırma operatörleri ve anlamları Tablo 5.2'de verilmiştir .

Tablo 5.2: *Karşılaştırma Operatörleri ve Anlamları*

Operatör	Anlamı
<	küçük
>	büyük
<=	küçük veya eşit
>=	büyük veya eşit
=	eşittir
!=	eşit değil

Sözde kod; bir bilgisayar programının nasıl çalışacağını anlatan, insanların okuyup anlayabileceği, sade ve açıklayıcı bir dil kullanılarak yazılan bir dizi talimattır.

Söz dizimi, bir programlama dilindeki komutların, ifadelerin ve veri yapılarının nasıl düzenlenmesi gerektiğini tanımlayan kurallar ve yapılar bütünüdür.

Sözde kod, gerçek bir programlama dilinin teknik detaylarını ve karmaşık söz dizimini kullanmaz.

Örneğin uzun kenarının uzunluğu 8 birim ve kısa kenarının uzunluğu 4 birim olan dikdörtgenin alanını bulan algoritmanın işleyişi sözde kodla aşağıdaki gibi gösterilebilir.

Sözde Kod

Girdi: uzun kenar uzunluğu,
kısa kenar uzunluğu
Çıktı: alan
Başla
alan ← uzun kenar uzunluğu * kısa kenar uzunluğu
Yazdır "Dikdörtgenin alanı", alan, "birimkaredir."
Bitir

Algoritmanın Çalışması

Kullanıcıdan dikdörtgenin uzun kenar uzunluğunu ve kısa kenar uzunluğunu al.

"alan" adındaki değişkene uzun kenar uzunluğu ile kısa kenar uzunluğunun çarpımını ata.

Ekrana ya da dosyaya "Dikdörtgenin alanı 32 birimkaredir." diye yazdır.

Yukarıda verilen sözde kodun yazımı farklı şekillerde de yapılabilir. Aynı algoritmanın işleyişi yandaki sözde kodla da ifade edilebilir.

Değişkenler veya sabitler üzerinde matematiksel işlemler gerçekleştirmek için kullanılan aritmetik operatörler ve işlevleri Tablo 5.3'te verilmiştir.

Tablo 5.3: *Aritmetik Operatörler ve İşlevleri*

Operatör	İşlevi
+	İki sayının toplamını hesaplar.
–	İki sayının farkını hesaplar.
*	İki sayının çarpımını hesaplar.
/	Bir sayının diğerine bölünmesini sağlar.
^	Bir sayının başka bir sayıya göre kuvvetini hesaplar.
%	Bir sayının diğerine bölümünden kalanı verir.

Sözde Kod

Girdi: uzun kenar uzunluğu,
kısa kenar uzunluğu
Çıktı: alan
Başla
alan = uzun kenar uzunluğu * kısa kenar uzunluğu
Yazdır "Dikdörtgenin alanı [alan] birimkaredir."
Bitir

Sözde kod yazımında kullanılan yazım tarzlarında farklılıklar olabilir. Bu farklılıklar, kullanıcının yatkın olduğu programlama diline kolay geçiş yapmasını sağlar. Verilen sözde kodların "Yazdır" ile başlayan satırlarında algoritmik doğal dil ve akış şemasından farklı bir yazım tercih edilmesinin nedeni, metin ile sayısal değeri ayırt etmektir. Sözde kod yazımında metin ile sayısal değerleri ayırt etmek için verilen gösterimlerden biri tercih edilebilir. Bunların dışında kullanılan sözde kod yazımları da benimsenebilir.

Algoritmik doğal dil, akış şeması ve sözde kod alanlarındaki ifadelerde imla ve noktalama farklılıklarının bulunma nedeni bu ifadelerin kullanımına ilişkin kuralların yazı dili kurallarından farklı olmasıdır.

1. ÖRNEK

Aşağıda 13'ün 3 ile bölümünden kalanı tekrarlı çıkarma yöntemiyle bulan algoritmanın işleyişi algoritmik doğal dille ifade edilmiştir.

Algoritmik Doğal Dil

1. adım: Başla.

2. adım: Girdilerin alınması

Kullanıcıdan bölünen (13) ve bölen (3) al.

3. adım: Kalanın güncellenmesi

Bölünenden 3 çıkar ve kalan olarak al.

4. adım: Koşulun kontrolü

Kalan, bölen sayıdan küçük ise (1 < 3) bitir; değilse 3. adıma git.

5.adım: Sonucun bulunması


Kalan olarak elde edilen ve koşulu sağlayan son değer (1) bölme işleminin kalanıdır.

6. adım: Bitir.

Buna göre verilen iki doğal sayıdan biri diğerine bölündüğünde kalanı çıkarma yöntemiyle bulan algoritmanın işleyişini akış şemasıyla ifade ediniz. 13'ün 3 ile bölümünden kalanı akış şeması yardımıyla bulunuz.

Çözüm

Akış Şeması



Algoritmanın Çalışması

Kullanıcı, bölünen (a) ve bölen (b) sayıları için sırasıyla 13 ve 3 girmiştir. Bu durumda a yerine 13, b yerine 3 girdi olarak alınır.

a nın mevcut değerinden b değeri çıkarılarak yeni bir a değeri hesaplanır. Bu adım, döngünün her yinelenişinde tekrarlanır ve a değeri sürekli azalır. Elde edilen yeni a değerleri yandaki tabloda verilmektedir.

a değeri 1 olduğunda 1 < 3 olduğundan yineleme durmakta ve kalan a ya eşit olmaktadır. Kalan 1'e eşit olur. Yineleme sayısı da bölümü verir.


Koşulun kontrol edildiği a >= b ifadesi a ≥ b şeklinde de gösterilebilir.

Yineleme	a
0	13
1	13 – 3 = 10
2	10 – 3 = 7
3	7 – 3 = 4
4	4 – 3 = 1


2. ÖRNEK

Aşağıda bir doğal sayının tek mi, çift mi olduğunu bulan algoritmanın işleyişi iki farklı akış şemasıyla ifade edilmiştir.

Akış Şeması I



Akış Şeması II



Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Akış şemaları arasındaki temel farkı açıklayınız.

b) Akış şemalarında bir doğal sayının tek mi, çift mi olduğu nasıl belirlenmektedir?

c) Akış şemalarında kullanılan koşul ifadeleri arasındaki mantıksal ilişkiyi açıklayınız.

Çözüm

a) Akış Şeması I ve Akış Şeması II arasındaki temel fark, sayının çiftlik veya teklik durumunu kontrol etmek için kullanılan koşul ifadesidir.

Akış Şeması I'de x % 2 = 0 koşul ifadesiyle sayının çift olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Akış Şeması II'de x % 2 = 1 koşul ifadesiyle sayının tek olup olmadığı kontrol edilmektedir.

b) Her iki akış şemasında da "%" operatörü kullanılarak sayının 2'ye bölümünden kalan değer incelenmektedir. Bu yöntem programlama ve algoritma geliştirmede doğal sayıların çiftlik veya teklik durumunu belirlemek için sıkça kullanılır.

c) "x % 2 = 0 ve x % 2 = 1" ifadeleri bir sayının 2'ye tam bölünüp bölünmediğini kontrol eder, yani birbirlerinin tamamlayıcısıdır.

x doğal sayısı için "x % 2 = 0" ifadesi doğruysa bu doğal sayı çifttir ve x % 2 = 1 ifadesi yanlıştır.

x doğal sayısı için "x % 2 = 1" ifadesi doğruysa bu doğal sayı tektir ve x % 2 = 0 ifadesi yanlıştır.

Örneğin Akış Şeması I'de 75 doğal sayısı için koşul kontrol edildiğinde "75 % 2 = 0" ifadesi yanlış olduğundan "Hayır" yolu izlenir ve "Sayı tektir." çıktısı alınır.

Akış Şeması II'de 75 doğal sayısı için koşul kontrol edildiğinde "75 % 2 = 1" ifadesi doğru olduğundan "Evet" yolu izlenir ve "Sayı tektir." çıktısı alınır. Görüldüğü üzere bir algoritmanın işleyişi bir veya daha fazla akış şemasıyla ifade edilebilir.

1. Sıra Sizde

1.

VKİ Aralığı	Sağlık Durumu Kategorisi
VKİ≤18,5	Düşük kilolu
18,5 <VKİ≤25	Normal kilolu
25 <VKİ≤30	Fazla kilolu
VKİ>30	Obezite


Vücut kitle indeksi (VKİ) bir kişinin kilosunun (kg) boyunun (m) karesine bölünmesiyle hesaplanan bir değerdir, kategoriler yardımıyla genel sağlık durumu hakkında önemli bilgiler sunar. Yandaki tabloda vücut kitle indeksi değerlerine göre sağlık durumu kategorileri verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Aşağıda vücut kitle indeksini bulan ve ilgili kategoriyi belirleyen algoritmanın işleyişinin ifade edildiği akış şeması verilmiştir.

Şemada boş bırakılan alanları gerekli sembol, metin ve matematiksel ifadelerle tamamlayınız.

Akış Şeması



b) Algoritmanın işleyişini algoritmik doğal dil ve sözde kodla ifade ediniz.

Algoritmik Doğal Dil

Sözde Kod

c) Aşağıda verilen boy ve kilo değerlerini kullanarak algoritmayı test ediniz.

Boy (m)	Kilo (kg)	VKİ (kg/m^2)	Kategori
1,67	60		
1,93	80		
1,75	120		

2. $\forall a, b \in \mathbb{R},\ f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = ax + b$ **şeklinde tanımlı doğrusal fonksiyonun sıfırını bulan algoritmanın işleyişini algoritmik doğal dil, akış şeması ve sözde kodla ifade ediniz.**

Algoritmik Doğal Dil

Sözde Kod

Akış Şeması

3. ÖRNEK

Sözde Kod

(Birler basamağı b olarak kısaltılmıştır.)
Girdi: Pozitif bir tam sayı x
Çıktı: x in 5'e tam bölünüp bölünmediğine dair doğru ya da yanlış şeklinde bir çıktı
Başla
b ← x % 10 Sayının birler basamağını bul
b 0 veya 5 ise
Yazdır DOĞRU (x, 5'e tam bölünür.)
b 0 veya 5 değilse
Yazdır YANLIŞ (x, 5'e tam bölünmez.)
Bitir

Yanda pozitif bir tam sayının 5'e tam bölünüp bölünmediğini bulan bir algoritmanın işleyişi sözde kodla ifade edilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Algoritmanın işleyişini algoritmik doğal dille ifade ediniz.

b) 47'nin 5'e tam bölünüp bölünmediğini akış şeması üzerinde test ediniz.


Çözüm

a) Algoritmik doğal dil, aşağıdaki gibi yazılabilir.

Algoritmik Doğal Dil

1. adım: Başla.
2. adım: Girdilerin alınması
Kullanıcıdan pozitif bir tam sayı al.
3. adım: 5'e tam bölünebilme testi
b yi bul. Bu işlem için sayının 10'a bölümünden kalanı bul.
Birler basamağının 0 veya 5 olup olmadığını kontrol et.
4. adım: Sonucun yazdırılması
Birler basamağı 0 veya 5 ise ekrana "Sayı, 5'e tam bölünür." mesajını yaz.
Birler basamağı 0 veya 5 değilse ekrana "Sayı, 5'e tam bölünmez." mesajını yaz.
5. adım: Bitir.

b) Akış şeması yardımıyla 47'nin 5'e tam bölünüp bölünmediği aşağıda test edilmiştir.



2. Sıra Sizde

Aşağıda istenen algoritmaların işleyişlerini algoritmik doğal dil yardımıyla ifade ediniz.

a) Bir doğal sayının 2'ye tam bölünüp bölünmediğini bulan algoritma

Algoritmik Doğal Dil

b) Bir doğal sayının 4'e tam bölünüp bölünmediğini bulan algoritma

Algoritmik Doğal Dil

Derecelendirme ölçeğine ulaşmak için karekodu okutunuz.


Araştırma Ödevi

Aşağıda verilen adımları gerçekleştirerek araştırma ödevini zamanında ve eksiksiz olarak tamamlayınız.

- Çeşitli alanlardan (sosyal ağ, eğitim, sağlık gibi) bilinen ve sık kullanılan üç farklı program veya uygulamayı seçiniz.
- Seçtiğiniz her bir program veya uygulamanın arkasında yatan makine öğrenmesi algoritmalarını araştırınız.
- Bulduğunuz algoritmaların çalışma prensiplerini detaylı bir şekilde açıklayınız.
- Farklı programlar için kullanılan algoritmalar arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirleyiniz.
- Hangi algoritma türlerinin hangi tür uygulamalarda daha sık kullanıldığını belirleyiniz.
- Her bir algoritmanın gerçek yaşamda oluşturduğu etkileri örneklerle gösteriniz.
- Araştırmalarınızı rapor hâline getiriniz. Raporunuzu sınıfınızda bir sunum olarak arkadaşlarınıza sununuz.

Araştırma ödeviniz karekod içinde verilen derecelendirme ölçeği ile öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir.

4. ÖRNEK



Eratosthenes (Eratostenis) Kalburu, MÖ III. yüzyılda Antik Yunan matematikçisi Eratosthenes tarafından geliştirilen bir algoritmadır. Bu algoritma, belirli bir sayıya kadar olan tüm asal sayıları bulmak için kullanılır ve bir sayının daha küçük asal sayıların katı olup olmadığını kontrol ederek asallığını test eder.

Yanda Eratosthenes Kalburu yöntemi yardımıyla 2'den n tam sayısına kadar olan asal sayıları bulan algoritmanın işleyişi akış şemasıyla ifade edilmektedir.

Buna göre aşağıdaki şablonu kullanarak n = 100 için akış şeması yardımıyla asal sayıları belirleyiniz.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Çözüm

Akış şeması yardımıyla aşağıdaki işlem adımları elde edilir.

1. adım: 2'den belirlenen bir n tam sayı değerine kadar ardışık tam sayılardan bir liste oluşturun.

2. adım: Başlangıçta en küçük asal sayı olan 2'yi alın ve 2'nin tüm katlarını (4, 6, 8, …) işaretleyin.

3. adım: İşaretlenmemiş bir sonraki sayıyı alın, örneğin 3 ve tüm katlarını işaretleyin. Tüm sayılar işaretlenmişse veya bir sonraki işaretlenmemiş sayı bulunamıyorsa durun.

4. adım: 3. adımı algoritma sonlanana kadar tekrarlayın. Listede işaretlenmemiş olarak kalan sayılar, n tam sayısına kadar olan tüm asal sayılardır.

Bu adımlar yardımıyla 2'den 100'e kadar olan asal sayılar, yanda verilen şablonda elde edilmiştir.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Kriptoloji, bilgileri koruma ve gizleme bilimidir. Sayıların çarpanlara ayrılması, kriptoloji alanında önemli bir yere sahiptir. Adını buluşçuları olan Ron Rivest (Ron Rivist), Adi Shamir (Adi Şamir) ve Leonard Adleman'ın (Lönırd Adılmın) soy isimlerinin baş harflerinden alan RSA şifreleme algoritması; büyük sayıların asal çarpanlarına ayrılmasına dayanır. Bu algoritmada iki asal sayının çarpımı kolayca hesaplanabilirken bir sayının asal çarpanlarına ayrılması son derece zordur. Bu hesaplama güçlüğü, RSA'nın güvenliğinin temelini oluşturur çünkü bir mesajın şifresini çözmek için gerekli özel anahtar, bu büyük sayıları asal çarpanlarına ayırma işlemine bağlıdır. Etkili bir asal çarpanlara ayırma algoritması olmadan bu tür bir şifrelemeyi kırmak zordur.

Sayıların asal çarpanlarına ayrılması için geliştirilen başlıca algoritmalar; deneme bölme algoritması, Pollard'ın (Pallırd) rho (ro) algoritması ve kuantum bilgisayarlar için geliştirilen Shor (Şor) algoritması şeklinde sıralanabilir.

5. ÖRNEK

Algoritmik Doğal Dil

1. adım: Başla.
2. adım: **Girdi ve çıktıların belirlenmesi**
Kullanıcıdan pozitif bir tam sayı (x) al.
Elde edilen asal çarpanları saklamak için "asal çarpanlar" adında boş bir liste oluştur.
3. adım: **2 ile bölme işlemi yapılması**
x çift ise
x 2'ye bölünebildiği sürece
x i 2'ye böl ve x i sonuç olarak güncelle.
2'yi asal çarpanlar listesine ekle.
4. adım: **Diğer asal sayılarla bölme işlemi yapılması**
y değişkenini 3 olarak başlat.
y değeri x in karekökünden küçük veya x in kareköküne eşit olduğu sürece
x, y ile tam bölünebiliyorsa
x i y ye böl ve sonucu x olarak güncelle.
x, y ile tam bölündüğü sürece işlemi tekrarla.
y yi asal çarpanlar listesine ekle.
Tek sayıları taramak için y yi 2 artır.
5. adım: **Son çarpanın kontrol edilmesi**
x 1'den büyükse
x bir asal sayıdır ve asal çarpanlar listesine eklenmelidir.
6. adım: **Çıktının yazdırılması**
Asal çarpanlar listesini yazdır.
7. adım: Bitir.

Deneme bölme algoritmasında ilk olarak asal çarpanlarına ayrılacak sayının en küçük asal sayı olan 2 ile bölünebilirliğine bakılır. Sayı 2'ye bölünebiliyorsa elde edilen bölümün 2 ile bölünebilirliğine bakılır. Bu işleme iki ile kalanlı bölme işlemi yapılıncaya kadar devam edilir. Ardından 3, 5, 7 gibi asal sayılarla bölme işlemine devam edilir. Bölme işlemi, asal çarpanları bulunmak istenen sayının karekökünden küçük olan asal sayılar için yapılır. Yanda bir sayının asal çarpanlarını bulan deneme bölme algoritmasının işleyişi, algoritmik doğal dille ifade edilmektedir.

Verilen bilgileri inceleyerek 75 sayısının asal çarpanlarının listesini elde ediniz.

Çözüm

İşlem	x	Asal Çarpanlar
Girdi alınır.	75	{}
2'ye tam bölünme	75	{}
y = 3 ile tam bölünme	25	{3}
y = 5 ile tam bölünme	5	{3,5}
y = 7 ile tam bölünme	5	{3,5}

Bir sayının asal çarpanları bulunurken sayının karekök değerine kadar olan asal sayılara bölünüp bölünmediğini kontrol etmek yeterlidir. 11, 13, 17, … asal sayıları 75'in karekökünün yaklaşık değeri olan 8,6'dan büyük olduğu için asal çarpanı olamaz.

Bu durumda 75'in asal çarpanlar listesi {3, 5} olur.

Programlama dili, bilgisayarların anlayabileceği ve işleyebileceği talimatlar dizisini oluşturmak için kullanılan formel bir dildir.

Her programlama dilinin kendine özgü bir söz dizimi vardır. Programcılar, söz dizimleri yardımıyla algoritmaları kod hâline getirir. Böylece bilgisayarlar istenen görevleri yerine getirebilir. Söz dizimi, programlama dilinin kurallarını ve yapılarını içerir. Doğru kullanılmadığında program hatalı çalışır veya hiç çalışmaz.

6. ÖRNEK

Sözde Kod

Girdi: ilk nöbet günü, nöbet aralığı, hedef nöbet
Çıktı: hedef nöbet günü
Başla
    günler ← ("pazartesi", "salı", "çarşamba", "perşembe", "cuma", "cumartesi", "pazar")
    ilk nöbet indeksi ← [günler] in indeksini bul (ilk nöbet günü)
    toplam gün ← (hedef nöbet - 1) * (nöbet aralığı)
    hedef gün indeksi ← (ilk nöbet indeks + toplam gün) % 7
    hedef gün ← günler (hedef gün indeks)
    Yazdır "[hedef nöbet]. nöbet, [ilk nöbet günü] gününden [toplam gün] gün sonra, [hedef gün] günü tutulur."
Bitir

Bir doktor, çalıştığı hastanede yapılan nöbet listesindeki planlamaya göre 3 günde bir nöbet tutacaktır. İlk nöbetini salı günü tutacak olan doktorun 9. nöbetinin hangi güne denk geleceğini bulan algoritmanın işleyişi sözde kodla yanda verilmiştir.

Buna göre yanda verilen algoritmanın işleyişini algoritmik doğal dille ifade ediniz ve 9. nöbetin hangi güne denk geleceğini bulunuz.

Çözüm

Algoritmik Doğal Dil

1. adım: Başla.
2. adım: **Girdilerin alınması**
İlk nöbet günü belirlenir.
Nöbet aralığı belirlenir.
Hedef nöbet belirlenir.
3. adım: **Toplam günün hesaplanması**
Hedef nöbet için toplam geçen gün sayısını hesapla.
Toplam gün: (hedef nöbet −1) · (nöbet aralığı)
4. adım: **İlk nöbet gününün indeksinin bulunması**
Günler listesi: {pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar} olsun.
İlk nöbet, günler listesinde bulunur ve ilk nöbetin baştan kaçıncı eleman olduğu (indeksi) belirlenir.
5. adım: **Hedef günün indeksinin ve hedef günün bulunması**
Hedef gün indeksi, (ilk nöbet indeksi + toplam gün) ifadesinin 7 ile bölümünden kalana eşittir.
Günler listesinden hedef gün indeksi yardımıyla hedef günü belirle ve yazdır.
6. adım: **Sonucun yazdırılması**
Hedef nöbet ilk nöbet gününden toplam gün sonra, hedef günde tutulur.
7. adım: Bitir.

Algoritmanın Çalışması

İlk nöbet günü: Salı
Nöbet aralığı: 3
Hedef nöbet: 9

Toplam gün $(9-1)\cdot 3 = 8\cdot 3 = 24$ bulunur.

İlk nöbet günü olan salı, listenin sol baştan ikinci günü olduğu için ilk nöbet indeksi 2 olur.

(ilk nöbet indeksi + toplam gün): $2 + 24 = 26$ olur. 26 sayısının 7 ile bölümünden kalan, $26 = 7\cdot 3 + 5$ ifadesinden hareketle 5 bulunur. Bu durumda hedef gün indeksi 5 olur. Günler listesinin sol baştan 5. elemanı cumadır.

9. nöbet salı gününden 24 gün sonra, cuma günü tutulur.

3. Uygulama

Kütlesi Farklı Parayı Bulma Problemi

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aynı ebatlara sahip n tane bozuk para içinden kütlesi farklı olan 1 tanesi en az kaç tartımla kesin olarak bulunabilir? Varsayımlarınızı oluşturunuz.

2. n sayısının alabileceği farklı tam sayı değerleri için varsayımlarınızı aşağıdaki tabloyu tamamlayarak doğrulayınız. Ardından tartım sayısıyla ilgili genellemeler oluşturunuz.

n	2	3	4	8	9	16	27	32	64	81
En Az Tartım Sayısı										

3. Varsayımlarınızla genellemelerinizi karşılaştırarak bir önerme şeklinde ifade ediniz. Birden fazla önermeye ulaştıysanız her birini ayrı cümlelerle ifade ediniz.

4. Elde ettiğiniz önermelerin birini seçerek aynı ebatlara sahip n tane bozuk para içinden kütlesi farklı olan 1 tanesinin en az kaç tartımla belirlenebileceğini bulan algoritmanın işleyişini algoritmik doğal dille ifade ediniz.

Algoritmik Doğal Dil

5. Hazırladığınız algoritmayı farklı n değerleri için uygulayınız. Her bir durum için en az tartım sayısını hesaplayınız ve sonuçları karşılaştırınız.

6. Elde ettiğiniz algoritmanın kullanışlılığı, kütlesi farklı olan paranın hafif ya da ağır olmasından etkilenir mi? Açıklayınız.

7. Algoritmanın performansını artırmak için hangi stratejileri önerirsiniz? Alternatif algoritma yaklaşımları neler olabilir? Açıklayınız.

8. Bir otomobil parçaları üreticisi, üretim hattından çıkan vida paketlerinin kalite kontrolünü yapmak için yeni bir test sistemi kurmayı planlamaktadır. Her vida paketinde 1024 vida bulunmaktadır. Her bir vida paketi, belirlenen tolerans aralığındaki kütleye sahip olmalıdır. Elde ettiğiniz algoritma ile 1024 vidanın içindeki 1 hatalı vidayı (hafif ya da ağır) tespit etmek için en az kaç tartım yapılması gerektiğini bulunuz.

9. Bir ilaç üretim tesisi, yeni geliştirdiği bir ilacın üretim sürecinde kalite kontrolünü sağlamak amacıyla bir test protokolü oluşturmak istemektedir. Her parti, 2187 ilaç kapsülü içermektedir ve bu kapsüllerin her biri, belirlenen etken madde miktarına sahip olmalıdır. Etken maddenin eksik veya fazla olması durumunda ilaç kapsülünün kütlesi etkilenmektedir. Buna göre elde ettiğiniz algoritma ile varsa 1 hatalı (etken maddesi eksik veya fazla) kapsülü tespit etmek için en az kaç tartım yapılması gerektiğini bulunuz.

4. Uygulama

Grup İçi Toplam Tokalaşma Sayısını Hesaplama

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

n kişilik bir grupta gruptaki her bir kişinin diğer kişilerle bir kez tokalaşması durumunda toplam tokalaşma sayısı tespit edilmek istenmektedir. Aşağıdaki tabloda gruptaki kişi sayısına göre toplam tokalaşma sayısı verilmiştir.

Kişi Sayısı	2	3	4	5	6	...	n
Toplam Tokalaşma Sayısı	1	3	6	10	15	...	

1. Kişi sayısı n olduğunda toplam tokalaşma sayısının cebirsel temsilini elde ediniz.

2. Tablo veya cebirsel temsil ile elde ettiğiniz bilgileri sıralı işlem adımlarına dönüştürünüz.

3. Belirlediğiniz işlem adımları ile toplam tokalaşma sayısını bulan algoritmanın işleyişini algoritmik doğal dil, akış şeması ve sözde kodla ifade ediniz.

Algoritmik Doğal Dil

Akış Şeması

Sözde Kod

4. Hazırladığınız algoritmayı kullanarak 5, 6 ve 7 kişilik gruplar için toplam tokalaşma sayısını hesaplayınız.

5. Elde ettiğiniz algoritmanın performansı, kişi sayısı artarsa nasıl etkilenir? Tokalaşacak kişi sayısı n olacak şekilde algoritmanızı yeniden oluşturunuz.

6. Algoritmanızın her durumda doğru yanıt verip vermediğini kontrol ediniz.

7. Bu problemi çözmek için kullanılabilecek her bir yöntemin (tablo, şema) avantajlarını belirleyiniz.

8. Bu yöntemlerden hangisinin daha sistematik ve etkili olduğunu karekoddaki etkileşimli içeriği kullanarak değerlendiriniz.

Etkileşimli içeriğe ulaşmak için karekodu okutunuz.

Bir grupta herkesin birbiriyle tokalaşması durumu çizge kuramı yardımıyla da açıklanabilir. Çizge kuramı, nesneler arasındaki ilişkileri düğümler (noktalar) ve bu düğümleri birbirine bağlayan ayrıtlar (çizgi) kullanarak inceler.



Görsel 5.1: *İki düğümlü çizge*

Görsel 5.1'de iki kişinin birbiriyle tokalaşmasının düğüm ve ayrıt yardımıyla çizgesi (model) verilmiştir. Bu çizgede A ve B düğümleri, kişileri; aralarındaki ayrıt, düğümler arasındaki tokalaşmayı göstermektedir.






Çizgeler; sosyal ağlardan genel ağ bağlantılarına, yol bulma sistemlerinden elektrik devrelerine kadar birçok gerçek yaşam problemi için bir model sunar. Algoritmalar, bu modeller üzerinde çalışarak belirli problemleri çözmek için kullanılır.


5. Uygulama

Königsberg Şehrindeki Yürüyüş Rotası Problemini Çizgeler Yardımıyla Çözümleme

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdaki tabloda verilen görsellerde bir şehirdeki belirli noktalar arasındaki farklı yolları temsil eden çizgeler yer almaktadır. Buna göre A noktasından yola çıkan bir kişi her yolu yalnızca bir kez kullanmak şartıyla başladığı noktaya dönüyorsa ✓ , dönemiyorsa ✕ sembolü kullanarak tabloyu örnekteki gibi doldurunuz.

Çizge	Sözel Temsili	Tüm Düğümlerin Tek ya da Çift Sayıda Ayrıta Sahip Olma Durumu	Başladığı Düğüme Dönme Durumu
	A düğümünden yola çıkan bir kişi, a ayrıtını kullanarak B düğümüne ulaşır ve b ayrıtını kullanarak başladığı düğüme dönebilir.	A ve B düğümlerine bağlı ikişer ayrıt vardır. Tüm düğümler, çift sayıda ayrıta sahiptir.	✓
			
			
			
			


2. 

Yandaki çizge; A ya da B düğümünden başlanarak, kalem hiç kaldırılmadan, her ayrıttan bir kez geçilerek, görseldeki oklar takip edilerek, başlanan noktaya dönmek şartıyla kâğıt üzerine çizilebilir.

Tablodaki diğer çizge örneklerini bir başlangıç noktası belirleyerek, kaleminizi hiç kaldırmadan ve her ayrıttan bir kez geçmek şartıyla kâğıt üzerine çiziniz.

Çizge Çizim Alanı

3. Kâğıt üzerine yaptığınız çizimlerde her bir düğümün sahip olduğu ayrıt sayısının tek ya da çift olmasının çizgenin kalem hiç kaldırılmadan çizilebilme durumu ile ilişkisini açıklayınız.

4. 

Yanda verilen modelde Königsberg şehrinin köprüleri ve A noktasının üzerinde olduğu ada yer almaktadır.

Buna göre

a) Çizgede her bir düğümün ayrıt sayısının tek ya da çift olmasının rota planlarına bir etkisi olup olmadığını açıklayınız.

b) Her köprüden yalnızca bir kez geçmek şartıyla belirlediğiniz bir başlangıç noktasına dönmenin mümkün olup olmadığını çözümleyen bir algoritmanın çalışması için gereken girdileri ve beklenen çıktıları tanımlayınız.

c) Algoritmik doğal dil ve akış şeması yardımıyla algoritmanın işleyişini açıklayınız.

Algoritmik Doğal Dil

Akış Şeması

ç) Elde ettiğiniz algoritmayı farklı durumlar (köprülerden birinin kullanım dışı kalması, bir düğüm noktasına yeni ayrıtlar eklenmesi vb.) için test ediniz.

6. Uygulama

Temiz Çevre Optimizasyon Problemi

Verilen bilgileri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Bir çöp arabası; sorumluluk sahasındaki A, B, C ve D adlı dört çöp deposu arasında bir yolculuk gerçekleştirecektir. Çöp arabası; başlangıç noktası olan A çöp deposundan hareket ederek B, C ve D çöp depolarını tek bir kez ziyaret ettikten sonra yine A çöp deposuna dönecektir.

Çöp Depoları	A-B	B-C	C-A	C-D	D-A	B-D
Depolar Arası Mesafe (birim)	133	96	100	103	70	200

Tabloda her iki çöp deposu arasındaki mesafeler (birim) verilmiştir. Her gün çalışan bu çöp arabasının yakıt tüketimini daha temiz bir çevreye sahip olmak amacıyla azaltmak gerekmektedir. Bu nedenle çöp arabasının sorumluluk sahasındaki çöp depolarını en kısa yoldan dolaşabilmesi için bu mesafelerin toplamının en az olması istenmektedir.

1. Tablodaki verileri kullanarak toplam mesafeyi en aza indirmeye çalışınız.

2. Tablodaki verileri kullanarak düğümler A, B, C ve D; ayrıtlar mesafeleri verilen sorumluluk sahasındaki yollar olacak şekilde bir çizge oluşturunuz.

Çizge Çizim Alanı

3. Toplam mesafeyi en aza indiren algoritmanın çalışması için gereken girdi verilerini ve beklenen çıktıları tanımlayınız.

4. Toplam mesafeyi en aza indiren algoritmanın işleyişini algoritmik doğal dil, akış şeması ve sözde kodla ifade ediniz.

Algoritmik Doğal Dil

Akış Şeması

Sözde Kod

5. Oluşturduğunuz çizge üzerinde çöp arabasının katettiği toplam mesafeyi en aza indiren rotayı bulunuz.

6. Toplam mesafeyi en aza indiren rotanızı arkadaşlarınızın rotaları ile karşılaştırıp en iyi rotayı belirleyiniz.

7. Çöp deposu sayısı artarsa elde ettiğiniz algoritmanın performansının nasıl etkileneceğini açıklayınız.


8. Çöp deposu sayısı artarsa algoritmanın performansını artırmak için hangi stratejileri önerirsiniz? Alternatif algoritma yaklaşımları neler olabilir?

9. Bu problemin çözümünde kullanılan tablo ve çizgeden hangisinin daha verimli olduğunu açıklayınız.

10. Bu problemin benzerlik gösterdiği gerçek yaşam durumlarını açıklayınız.

Konu ile ilgili çalışma kâğıdına ulaşmak için karekodu okutunuz.

3. Sıra Sizde



Bir veri merkezindeki üç farklı sunucu (A, B, C) ve üç farklı veri deposu (Ç, D, E) ile A ve Ç arasındaki ilişkiyi gösteren çizge şekilde gösterilmiştir. Her bir sunucu, her bir veri deposundan yüksek hızda ve güvenilir şekilde veri alışverişi yapabilmelidir.

Buna göre veri merkezinin tasarım kuralları gereği sunucular ve depolar arasında çapraz (kesişme) bağlantı olmadan en iyi veri akışını sağlayacak çizgeyi oluşturunuz.

Çizge Çizim Alanı

Derecelendirme ölçeğine ulaşmak için karekodu okutunuz.

Araştırma Ödevi

Aşağıda verilen adımları gerçekleştirerek araştırma ödevini zamanında ve eksiksiz olarak tamamlayınız.

- Kişisel bilgilerin korunmasında kullanılan temel şifreleme algoritmalarını (AES, DES, RSA gibi) araştırınız.
- Bu algoritmaların nasıl çalıştığını ve hangi tür veri güvenliği sağladığını inceleyiniz.
- RSA dışında asal sayıları kullanmayan şifreleme yöntemlerini (eliptik eğri kriptografisi gibi) araştırınız.
- Gelecekte kuantum bilgisayarların kriptoloji alanında hangi yenilikleri sunabileceğini araştırınız.
- Araştırmalarınızı rapor hâline getiriniz. Raporunuzu sunum şeklinde arkadaşlarınıza sununuz.

Araştırma ödeviniz karekod içinde verilen derecelendirme ölçeği ile öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir.


PageRank (Peycrenk), bir çizge üzerindeki düğümlerin (genel ağ adresleri, sosyal medya kullanıcıları gibi) önemini ölçen bir yöntemdir. İlk olarak genel ağ sayfalarının arama motorları tarafından sıralanmasında kullanılan bu algoritma, sayfalar arası bağlantılar üzerinden bir "oylama" sistemi kurarak çalışır.

Örneğin basit bir sosyal ağ üzerindeki bilgi yayılımı üzerinden PageRank algoritması aşağıda incelenmektedir.

Tablo 5.4: *Bir Sosyal Ağda Bilgi Yayılımı*

Kullanıcı	Bilgi Paylaştığı Kullanıcılar
A	B ve C
B	C
C	D
D	A
E	A ve B

Beş kullanıcıdan oluşan bir sosyal ağın kullanıcıları, çeşitli bilgilerini farklı şekillerde paylaşmaktadır. Bu sosyal ağın bağlantıları, Tablo 5.4'te verilmiştir.



Bu bağlantılar bir çizge olarak ele alındığında Königsberg probleminde elde edilen çizgeden farklı olarak ayrıtların yönlerinin olduğu görülmektedir.

Yandaki çizgede her kullanıcı bir düğümle, bilgi yayılımı ise düğümler arası yönlü ayrıtlarla temsil edilmektedir. Düğümlerin yanında yer alan sayılar, düğümlerin Pagerank değerleridir. Bu değerler, kullanıcıların ağdaki etkileri hakkında bilgi verir.

Örneğin kullanıcı C en yüksek değere sahip olduğu için ağdaki en etkili kullanıcı olarak kabul edilir. Kullanıcı E, ağ içinde en düşük Pagerank değerine sahiptir; bu da onun diğer kullanıcılarla daha az bağlantısının olduğunu ve bilgi yayılımının daha zayıf olduğunu gösterir.

7. Uygulama

Siber Güvenlik Sistemlerinde ASCII Karakter Kümesi


Aşağıda verilenlere göre soruları cevaplayınız.

Karakter	ASCII	Karakter	ASCII
@	64	`	96
A	65	a	97
B	66	b	98
C	67	c	99
D	68	d	100
E	69	e	101
F	70	F	102
G	71	g	103
H	72	h	104
I	73	i	105
J	74	j	106
K	75	k	107
L	76	l	108
M	77	m	109
N	78	n	110
O	79	o	111
P	80	p	112
Q	81	q	113
R	82	r	114
S	83	s	115
T	84	t	116
U	85	u	117
V	86	v	118
W	87	w	119
X	88	x	120
Y	89	y	121
Z	90	z	122
[	91	{	123
\	92	|	124
]	93	}	125
^	94	~	126
_	95		

Siber güvenlik sistemlerinde şifreler, dijital mahremiyet ve veri güvenliği açısından verileri korumanın temel araçlarından biridir. Örneğin sosyal ağ hesabınıza giriş yapmak için belirlediğiniz şifre; "Amerikan Bilgi Değişimi İçin Standart Kod" ifadesinin İngilizce karşılığının baş harflerinden elde edilen ASCII karakter kümesinden seçilen harfler, sayılar ve sembollerden oluşur. ASCII karakter kümesi, bir kodlama sistemine dayanır. Yanda verilen ASCII karakter kümesindeki her bir karakter, belirli bir sayısal değerle temsil edilir.

Bilgisayar donanımının elektrik sinyallerini iki durum (açık veya kapalı) kullanarak kolayca temsil edebilmesi tercih edilir. Bilgisayarlar, temelde kendilerine has bir sistem kullanarak çalışır. Bilgisayarlarda tüm veriler (harfler, sayılar, resimler gibi) 0'lar ve 1'ler olarak saklanır ve işlenir. Gerçek siber güvenlik sistemlerinde parolalar, bilgisayarda doğrudan ASCII veya ikilik (binary) halleriyle saklanmaz. Bunun yerine, parolalar özel matematiksel işlemlerden (örneğin SHA-256 gibi algoritmalar) geçirilerek dönüştürülür ve sadece bu dönüştürülmüş hâli, yani özeti sistemde saklanır.

Örneğin A harfinin ASCII karşılığı 65'tir. Onluk sistemdeki 65 sayısını bilgisayar, 1000001 olarak saklar ve işler. Aşağıda 65 sayısının 1000001 sayısına dönüştürülme işlemi verilmiştir.



Örneğin Ali'nin belirlediği şifre AL\Tz olsun. Bu şifrenin bilgisayar sisteminde saklanması için aşağıdaki adımlar uygulanır.

1. adım: ASCII karakter kümesi yardımıyla her karakter kendisine karşılık gelen ASCII karakterine dönüştürülür.

A	L	\	T	z
65	76	92	84	122

Bu durumda AL\Tz şifresinin ASCII karşılığı 65 76 92 84 122 olur.

2. adım: 65 76 92 84 122 değerlerinin bilgisayar sistemindeki karşılıkları bulunur.

A	L	\	T	z
65	76	92	84	122
1000001	1001100	1011100	1010100	1111010

AL\Tz şifresinin bilgisayar sistemindeki karşılıkları 1000001 1001100 1011100 1010100 1111010 şeklindedir.

1. En az bir büyük harf, bir küçük harf ve bir özel karakter içeren, ASCII dışı karakter içermeyen ve en az 8 karakterden oluşan bir şifre belirleyiniz.

2. Belirlediğiniz şifrenin bilgisayar sistemindeki karşılığını bulunuz. Elde ettiğiniz değerleri arkadaşlarınızın bulduğu değerlerle karşılaştırınız. Şifrelerde benzer ya da farklı karakterler olup olmadığını belirleyiniz.

3. Onluk sistemdeki bir sayıyı bilgisayar sistemindeki bir sayıya çeviren algoritmanın işleyişini algoritmik doğal dil yardımıyla açıklayınız.

Algoritmik Doğal Dil

ASCII karakter kümesinin standartlaştırılması, farklı bilgisayar ve ağ sistemlerinin birbiriyle daha kolay iletişim kurmasını sağlamıştır ancak ASCII yalnızca İngiliz alfabesi ve temel sembollerle sınırlıdır. Bu nedenle dünya çapında birçok farklı dil ve simgeyi kapsayacak şekilde genişletilmiş yeni standartlar geliştirilmiştir. Bunlara örnek olarak Genişletilmiş ASCII, Unicode (Yunikod) gibi daha kapsamlı kodlama sistemleri verilebilir. Unicode, dünya genelindeki hemen hemen tüm dilleri destekleyecek şekilde tasarlanmıştır ve ASCII karakter kümesinin doğrudan bir uzantısı olarak görülebilir.

Performans Görevi

Bu görevde sizden belirli sıralama ve arama algoritmalarını analiz etmeniz, bu algoritmalar için akış şemaları oluşturmanız, seçtiğiniz algoritmanın işleyişini sözde kod ve akış şemasıyla ifade etmeniz, çalışmanızı sınıf arkadaşlarınıza sunmanız beklenmektedir.

Göreve başlamadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

- Seçeceğiniz algoritmanın işleyişini algoritmik doğal dille ifade ediniz.
- Akış şemasını çizmek için hangi araçları kullanabileceğinizi belirleyiniz.

Görev esnasında aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

-

Algoritma Türü	Sıralama	Arama
Örnek Algoritmalar		
Analiz Ölçütleri		

Çalışmanız için bir sıralama veya arama algoritması seçiniz. Seçiminizi algoritmanın kullanım senaryosu, verimliliği ve karmaşıklığına göre yaparak tabloyu doldurunuz. Örneğin büyük veri kümeleri için Quick Sort (Kuik Sort), küçük veri kümeleri için ise Bubble Sort (Babıl Sort) tercih edebilirsiniz.

- Seçtiğiniz algoritmanın işleyişini sözde kodla ifade ediniz. Sözde kodunuzun açık ve anlaşılır olmasına özen gösteriniz.
- Algoritmanın her bir adımını gösteren detaylı bir akış şeması çiziniz. Şemada karar noktaları, döngüler ve temel işlemler belirgin şekilde gösterilmelidir. Akış şemasını çizmek için çevrim içi araçlar veya yazılımlar kullanabilirsiniz.
- Yazdığınız akış şeması ve sözde kodun doğru çalıştığını kontrol etmek için çeşitli test senaryoları oluşturunuz ve uygulayınız. Algoritmanın beklenen çıktıları verip vermediğini gözlemleyiniz.
- Çalışmanızın her bölümünü açıklayan ve algoritmanın nasıl çalıştığını özetleyen kapsamlı bir rapor hazırlayınız. Raporda akış şeması ve sözde kodla birlikte algoritmanın nasıl çalıştığını ve neden bu şekilde tasarlandığını açıklayınız.
- Görevin sonunda elde ettiğiniz bulguları, akış şemasını ve sözde kod örneklerini içeren bir sunum hazırlayınız. Sunumunuzda algoritmanın temel prensiplerini, uygulama sürecini ve analiz sonuçlarını net ve anlaşılır bir şekilde aktarınız.

Görev bitiminde aşağıdaki hususa dikkat ediniz.

- Akış şemasını, sözde kod örneklerini, analiz sonuçlarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Performans göreviniz, aşağıdaki karekodda verilen analitik dereceli puanlama anahtarı ile öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir.


Analitik dereceli puanlama anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

Kontrol Noktası

- Aynı ebatlara sahip n tane bozuk para içinden kütlesi farklı olan 1 tanesinin diğerlerine göre hafif ya da ağır olması, tartım sayısını ve tartım sayısına bağlı olarak algoritmanın işleyişini etkilemektedir.
- Bir çizgede tüm düğümler çift sayıda ayrıta sahipse yolu başladığınız noktaya dönecek şekilde tamamlayabilirsiniz.
- Königsberg şehrinde her köprüden yalnızca bir kez geçmek şartıyla başlangıç noktasına dönmek mümkün değildir.

Alıştırmalar

1. Anadolu parsı Türkiye'nin en büyük kedi türü olan, postu sarımsı, üzeri siyah benekli, çevik, yırtıcı, etçil, memeli bir hayvandır. Bir hayvan bilimci olan Zehra, araştırma ekibiyle birlikte nesli tükenmekte olan Anadolu parsının takibini yapmaktadır. Zehra, haritada gösterilen 163 000 km² lik beyaz renkli bölgenin tamamında araştırmasını yürütmektedir.



İkili arama, sıralanmış bir veri seti içinde bir elemanın bulunmasını hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için kullanılan bir arama algoritmasıdır.

Zehra, parsın izini sürmek için ikili arama algoritmasını kullanmayı planlamaktadır. Her adımda araziyi iki eşit parçaya bölüp sadece bir tarafında parsın olup olmadığını kontrol edecektir. Parsın varlığının tespit edildiği taraf daha sonra yeniden ikiye bölünecek ve arama alanı 1 km² den az olduğunda parsın tespit edildiği varsayılacaktır. Zehra, her gün sadece bir alanı kontrol edecektir.

Aşağıda bu iş için kullanılan algoritmanın işleyişi algoritmik doğal dille ifade edilmiştir.

Algoritmik Doğal Dil

1. adım: Başla.
2. adım: **Alanın ikiye bölünmesi**
Kullanıcıdan bölgenin alanını al.
3. adım: **İlk yarının kontrol edilmesi**
İlk yarıyı kontrol et, pars buradaysa bu bölgeyi detaylı incele;
değilse diğer yarıya geç.
4. adım: **İncelenen alanın büyüklüğünün kontrolü**
İncelenen alan 1 km^2 den küçükse parsın tespit edildiğini varsay,
değilse 2. adıma dön.
5. adım: Bitir.

Buna göre algoritmik doğal dille gösterilen ikili arama algoritmasının işleyişini akış şeması ve sözde kodla ifade ediniz.

Akış Şeması

Sözde Kod

Konu ile ilgili daha fazla soru çözmek için karekodu okutunuz.

5.2. ALGORİTMİK YAPILAR İÇERİSİNDEKİ MANTIK BAĞLAÇLARI VE NİCELEYİCİLER

Konuya Başlarken



Ünlü İslam âlimi ve mühendis Cezeri'nin 1206 yılında tamamladığı *Hünerli Mekanik Cihazların Bilgi Kitabı;* otomatlar, su saatleri, makineler ve diğer mekanik cihazlarla ilgili tasarımları içerir. Modern teknolojiden yüzyıllar önce kaleme alınan bu kitap; Cezeri'nin icadı olan makinelerin tasarımına, üretimine, montajına ilişkin bilgi ve talimatların, ayrıca günümüzdeki robotik uygulamalarını çağrıştıran yönergelerin yer aldığı eşsiz bir kaynaktır.

Fil saati, Mardin'in Artuklu ilçesindeki Kasımiye Medresesi'nde sergilenmektedir. Cezeri'nin icat ettiği bu saat, 30 dakikada bir sesli uyarı veren otomatik bir sistemdir. Bu sistemde su gücüyle çalışan robotik prensipler geçerlidir. Saatin çalışma sistemi aşağıda adım adım verilmiştir.

1. adım: Fil figürünün dâhilî haznesi, yeterli miktarda su ile doldurulur. Hazne içerisine önceden gözenek genişliği ayarlanmış, yüzer bir kap yerleştirilir. Bu kap, tasarlanmış gözenek boyutu sayesinde tam olarak 30 dakika boyunca yüzeyde kalmak üzere dengelenmiştir.

2. adım: Kabın altındaki gözenek, suyun yavaşça içeri girmesine izin verir. Bu işlem, kabın kademeli olarak ağırlaşmasına ve su seviyesiyle birlikte alçalmasına yol açar. Kabın batma süreci, zamanlama mekanizmasının temelini oluşturur.

3. adım: Kap, 30 dakika sonunda tamamen batar. Bu koşul sağlandığında fil figürünün baş kısmında bulunan ve kabın batmasıyla etkinleşen mekanik bir tetikleyici harekete geçer.

4. adım: Tetikleyici, bir çekiç mekanizmasını aktive eder. Bu çekiç, fil figürünün baş kısmında bulunan ve ses üretmek için tasarlanmış metal bir çana vurur.

5.adım: Çekiçten gelen darbe belirgin bir ses üretir ve bu ses yarım saatlik periyodun tamamlandığını gösterir. Ses hem uyarı hem de zamanı işaret etme işlevi görür.

6. adım: Sesli uyarıdan sonra sistem yenilenir. Kap, elle işletilen veya otomatik bir mekanizma ile su yüzeyine yeniden yerleştirilir ve 30 dakikalık yeni bir süreç başlar.

Cezeri; insan müdahalesine gerek kalmadan dış dünyanın gereksinimlerine uyum sağlayarak kendini yenileyebilen, verilen görevleri yerine getirebilen, yapay veya biyolojik sistemlerin kontrolü ve iletişimi üzerine odaklanan, günümüzde sibernetik olarak adlandırılan bilim dalının temellerini atmıştır.

Verilen bilgileri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız ve fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. Cezeri'nin mekanik sistemleri, günümüzün mekanik teknolojileriyle karşılaştırıldığında hangi benzerlik ve farklılıklara sahiptir?
2. Cezeri'nin mekanik sistemlerle ilgili çalışmalarının sibernetik biliminin günümüzdeki gelişimine, yapay zekâ ve otomasyon teknolojilerine etkileri neler olabilir?
3. Cezeri'nin tasarladığı fil saati otomatında sesli uyarıyı tetikleyen mekanik süreci bir döngü yapısı içinde (örneğin hangi adımların tekrarlanabilir olduğunu) açıklayınız.

Algoritmik yapılar, bir problemi çözmek veya belirli bir görevi yerine getirmek için adım adım talimatlar içeren yapılardır. Bilgisayar programlarının temeli olan algoritmik yapılar, Cezeri'nin çalışmalarında olduğu gibi geçmişten günümüze gerçek yaşam durumlarında geniş bir alanda kullanılır.

8. Uygulama

Akademik ve Sosyal Faaliyetlere Katılım Bursu Değerlendirme Algoritması

Aşağıda verilenlere göre soruları cevaplayınız.

Bir lise, akademik ve sosyal faaliyetlerde üstün başarı göstermiş öğrencilere burs vermek için özel bir program başlatmıştır. Bu program; öğrencilerin not ortalamalarını, etkinliklere ve bilimsel projelere katılımlarını dikkate alarak burs alacak öğrencileri belirlemektedir.

Tablo 1'de burs başvurusu yapacak öğrenciler ve bu öğrencilerin not ortalamaları, katıldıkları gönüllü etkinliklerde bulunma süreleri (yıl), bilimsel bir projede veya projelerde yer alıp almadıkları hakkında bilgiler yer almaktadır. Son sütunda öğrencilerin burs almaya hak kazanıp kazanmadıkları belirtilecektir.

Tablo 1

İsim	Not Ortalaması	Gönüllü Etkinliklerde Bulunma Süresi (yıl)	Bilimsel Projede Yer Aldı mı? (Evet/Hayır)	Burs Almaya Hak Kazandı/ Kazanamadı
Ali	88	3	Evet	
Banu	90	0	Hayır	
Cem	84	2	Evet	
Derya	92	1	Evet	
Emre	78	4	Hayır	
Fatma	85	1	Evet	
Gökhan	87	0	Hayır	
Hülya	83	5	Evet	
İlker	80	3	Hayır	
Jale	95	2	Evet	
Kerem	86	2	Evet	
Leyla	91	1	Hayır	
Murat	77	3	Evet	
Elif	89	0	Evet	
Oğuz	79	4	Hayır	
Pelin	88	2	Hayır	
Rıza	82	1	Evet	
Seda	93	5	Evet	
Tarık	90	0	Hayır	
Umut	84	3	Evet	

1. Tablo 2'de koşul içeren sözel ifadeleri mantık bağlaçları ve niceleyicilerle ifade ediniz. Koşulu sağlayan öğrencileri bularak Tablo 2'yi doldurunuz.

Tablo 2

Koşulun Sözel İfadesi	Koşulun Mantık Bağlacıyla İfadesi	Koşulu Sağlayan Öğrenciler
Not ortalaması 85'ten fazla olanlar ve en az 2 yıl gönüllü etkinliklerde bulunanlar	(Not ortalaması $>$ 85) $\wedge$ (Gönüllü etkinliklerde bulunma süresi $\geq$ 2)	Ali, Jale, Kerem, Pelin, Seda
Not ortalaması en az 85 olanlar veya bilimsel projede yer alanlar		
Gönüllü çalışma süresi 3 yıl veya daha fazla olanlar ve bilimsel projede yer almayanlar		
Not ortalaması 90'dan fazla ve gönüllü çalışma süresi 1 yıldan fazla olanlar		
Not ortalaması 80'den az olanlar ya da bilimsel projede yer almayanlar		
Gönüllü etkinliklere hiç katılmayanlar ya da bilimsel projede yer alanlar		
Gönüllü çalışma süresi 3 yıldan fazla olanlar ve bilimsel projede yer almayanlar		

2. Burs başvurusu yapan öğrenci sayısının 20 000 olması durumunda not ortalaması 90'dan fazla olan öğrencilerin bulunması için tablo temsili yeterli olur mu? Alternatif olarak geliştirilebilecek yöntemlerin neler olduğunu açıklayınız.

3. Öğrencilerin bilgilerini alan burs komitesi, her başvuru için aşağıdaki ölçütleri değerlendirmektedir.

- Not ortalaması 85'ten büyük olmalıdır.
- En az 2 yıl gönüllü etkinliklere katılım olmalıdır.
- Bilimsel projede yer almış olmalıdır.

Bu koşulların tamamını sağlayan öğrencileri bulan algoritmanın işleyişini algoritmik doğal dille ifade ediniz.

Algoritmik Doğal Dil

4. Yazdığınız algoritmik doğal dil yardımıyla Tablo 1'de öğrencilerin burs almaya hak kazanıp kazanamadığını belirten sütunu tamamlayınız ve algoritmanızı test ediniz.

5. Tablo 3'te verilen iki koşul için 3. soruda elde ettiğiniz algoritmayı test ediniz ve tabloyu doldurunuz.

Tablo 3


Koşullar	Koşulu Sağlayan Öğrenciler
Not ortalaması 83'ten az olanlar veya bilimsel projede yer almayanlar	
Not ortalaması en az 83 olanlar ve bilimsel projede yer alanlar	

6. Tablo 3'te verilen her iki koşulu da sağlayan öğrenci olup olmadığını belirleyiniz. Bu durumun Tablo 3'teki koşulları sağlayan öğrencileri bulan bir algoritma oluşturma sırasında sağladığı avantajları açıklayınız.

Algoritmaların işleyişinde niceleyiciler, genellikle doğrudan gözlemlenmez ancak algoritmanın doğru ve verimli çalışmasını sağlamak için arka planda etkin bir şekilde işler. Bu yapılar, belirli koşulları sağlayan veri ögelerini belirleme ve işlemede önemlidir.

7. ÖRNEK

Bir müzik aletleri üreticisi, metal çubukları kullanarak üçgen şeklinde çalgılar üretmektedir. Hangi çubukların birleştirilebileceğini ve birleştirildiğinde hangi tür üçgen çalgının oluşacağını belirlemek için üretim sürecinde bir algoritma kullanılmaktadır.



Buna göre akış şemasının hangi adımlarında mantık bağlaçlarının kullanıldığını ve algoritmanın işleyişindeki rollerini açıklayınız.

Çözüm

Akış şemasında "ve" bağlacı iki önermenin aynı anda karşılanmasını gerektirir. Örneğin bir metal parçanın uzunluğu, diğer iki metal parçanın uzunlukları toplamından küçük ve farkının mutlak değerinden büyük olmalıdır.

"Veya" bağlacı, üçgenin çeşidini belirleme sürecinde kullanılır. Örneğin üçgenin ikizkenar olup olmadığının belirlenmesi için "a = b veya b = c veya a = c" şeklindeki önermenin sonucuna göre karar verilir. Verilen eşitliklerden herhangi birinin sağlanması, üçgenin ikizkenar olduğunu doğrular.

"İse" bağlacı, algoritmada koşulların birbirine bağlı olduğu durumlar için kullanılır. "Bir metal parçanın uzunluğu, diğer iki metal parçanın uzunlukları toplamından büyük ise çalgı üretilemez." şeklindeki karar süreçlerinde işler.

4. Sıra Sizde



Vavien (Vaviyen) devre, bir aydınlatma sistemini veya herhangi bir elektrikli cihazı iki farklı yerden kontrol etmeye yarayan bir elektrik devresidir. Bu devre, genellikle evlerde merdiven ışıklarının kontrolü için kullanılır. Böylece bir katın başında ve sonunda bulunan iki farklı anahtarla ışık açılıp kapatılabilir.

Yandaki görselde verilen merdiveni aydınlatması için merdivenin başına ve sonuna birer tane anahtar yerleştirilip vavien devre bağlantısı yapılmıştır. Bir üst kata çıkmak isteyen kişi, A anahtarını kullanarak lambayı açar. Üst kata vardığında ise B anahtarı ile lambayı kapatır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Aşağıda vavien devrenin temel çalışma ilkesini anlatan bir algoritmanın işleyişi algoritmik doğal dille verilmektedir.

Buna göre boş bırakılan yere uygun mantık bağlacını yazınız.

Algoritmik Doğal Dil

1. adım: Başla.

2. adım: Girdilerin alınması

Kullanıcıdan bir anahtarın durumu (açık veya kapalı) hakkında giriş al. Lamba başlangıçta kapalıdır.

3. adım: Anahtar durumunun kontrol edilmesi

A ve B anahtarının durumunu kontrol et.

4. adım: Kontrol mekanizması

A anahtarı ……... B anahtarı açıksa lambayı yak.

Değilse lambayı söndür.

5. adım: Sonucun bulunması

Lambanın durumunu güncelle (açık veya kapalı).

6. adım: Bitir.

b) Verilen algoritmanın işleyişini sözde kod ile ifade ediniz.

Sözde Kod

Konu ile ilgili etkileşimli içeriğe ulaşmak için karekodu okutunuz.

9. Uygulama

Tüketme Yaklaşımı ve Kadane Algoritmasını Karşılaştırma

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. A = {5, −3, 2, 7, −4, 1} kümesinde herhangi bir elemandan başlayarak birbiri ardına gelen elemanların toplamlarını örnekteki gibi hesaplayınız. Bu toplamların en büyük olanını bulunuz. Sonucunuzu arkadaşlarınızın bulduğu sonuçlarla karşılaştırınız.

{5, −3} için 5 + (−3) = 2

{5, −3, 2} için 5 + (−3) + 2 = 4

2. A kümesinde herhangi bir elemandan başlanarak birbiri ardına gelen elemanların toplanması ile elde edilen toplamlardan en büyük olanı bulmak için tüketme yaklaşımı kullanılabilir. Tüketme yaklaşımı, elde edilen toplamlardan en büyüğünü bulmak için bir döngü kullanır. Bu döngü, kümenin her elemanını birer birer ele alarak toplamları hesaplar ve karşılaştırır. Tablo 1'de verilen sayı kümesinden alınan ardışık elemanların toplamını bularak tabloyu örnekteki gibi doldurunuz.

Tablo 1

5=5					
5+(−3)=2	−3=				
5+(−3)+2=	(−3)+2=	2=			
5+(−3)+2+7=	(−3)+2+7=	2+7=	7=		
5+(−3)+2+7+(−4)=	(−3)+2+7+(−4)=	2+7+(−4)=	7+(−4)=	−4=	
5+(−3)+2+7+(−4)+1=	(−3)+2+7+(−4)+1=	2+7+(−4)+1=	7+(−4)+1=	(−4)+1=	1=

3. Tablo 1'de elde ettiğiniz değerler ile 1. soruda elde ettiğiniz değeri karşılaştırınız. Verilen sayı kümesinin eleman sayısının artmasının sonuçlarını doğru yanıta ulaşma süresi (hesaplama zamanı) açısından değerlendiriniz.

4. Verilen sayı kümesindeki ardışık elemanların toplanması ile elde edilen toplamlardan değeri en büyük olanı bulmak için Kadane algoritması da kullanılabilir. Tablo 2'de algoritmanın ilk dört adımında elde edilen toplamlardan değeri en büyük olanlar kırmızı renkle gösterilmiştir.

5 ve 6. adımdaki en büyük toplamları önceki adımlara benzer şekilde bularak tabloyu doldurunuz.

Tablo 2

Adımlar	1	2	3	4	5	6
İşlemler	5	5 −3 2	$5 + (-3) + 2 = 4$ 5 −3 2 $5 + (-3) = 2$ $-3 + 2 = -1$	$5 + (-3) + 2 + 7 = 11$ 4 6 5 −3 2 7 2 −1 9	5 −3 2 7 −4	5 −3 2 7 −4 1

5. Kadane algoritması adımlarının yer aldığı tablodan elde ettiğiniz en büyük toplam değeri tüketme yaklaşımıyla bulduğunuz en büyük toplam değerle karşılaştırınız. Hangisinin daha kısa sürede cevabı verdiğini değerlendiriniz.

6. Kadane algoritmasında dizideki her ardışık elemanın toplamı incelendiğinde hangi koşullarda yeni bir toplama işlemi başlatılır? Bu süreçte neden bazı ardışık elemanların oluşturduğu negatif toplamların dikkate alınmadığını açıklayınız.

Konu ile ilgili çalışma kâğıdına ulaşmak için karekodu okutunuz.

Kontrol Noktası

Aşağıdaki bilgi görselinde algoritmik yapılar içinde kullanılan mantık bağlaçları, niceleyiciler ve bunların işlevleri verilmiştir.

Algoritmik Yapılar İçerisindeki Mantık Bağlaçları ve Niceleyiciler

- **Ve Bağlacı**
  İki veya daha fazla önermenin hepsinin doğru olup olmadığını kontrol eder.
- **Veya Bağlacı**
  İki veya daha fazla önermeden en az birinin doğru olup olmadığını kontrol eder.
- **Ya da Bağlacı**
  İki önermeden yalnızca birinin doğru olup olmadığını kontrol eder.
- **İse Bağlacı**
  Bir koşulun sağlanması durumunda belirli bir komutun yerine getirilmesini sağlar.
- **Her Niceleyicisi**
  Bir önermenin herhangi bir öge için doğru olduğunu ifade eder.
- **Bazı Niceleyicisi**
  Bir önermenin en az bir öge için doğru olduğunu ifade eder.

Alıştırmalar

1. Aşağıdaki görselde bir yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi [FSRU (floating storage regasification unit), (fıloding sıtorıç regesifikeyşın yunit)] verilmiştir. Deniz üzerine konumlandırılan bu tesislerde sıvılaştırılmış doğal gaz depolanır ve gerektiğinde gaz hâline dönüştürülür. Böylelikle karasal altyapıya ihtiyaç duyulmadan esnek ve hızlı bir şekilde enerji tedarik edilebilir. Çeşitli limanlara bağlanan bu üniteler sayesinde doğal gazın enerji şebekesine uyumu sağlanır.



Türkiye sahip olduğu üç FSRU ünitesiyle dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almaktadır. Aşağıdaki tablo A, B, C ve D limanlarının farklı FSRU tesisleriyle olan bağlantı durumunu göstermektedir. Bağlı olma durumu "✓" sembolü, bağlı olmama durumu "✕" sembolü ile ifade edilmiştir.

	FSRU Tesisi		
Liman Adı	**Ertuğrul Gazi**	**Dörtyol**	**Saros**
A	✓	✓	✓
B	✕	✓	✓
C	✓	✕	✓
D	✓	✓	✕

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Limanlardan FSRU tesislerine bağlantıları temsil edecek şekilde bir çizge oluşturunuz.

Çizge Çizim Alanı

b) Elde ettiğiniz çizge diyagramında tüm FSRU tesisleri ile bağlantılı olan limanları bulunuz.

c) Elde ettiğiniz çizge diyagramında en az iki farklı FSRU tesisi ile bağlantılı olan limanları belirleyiniz.

ç) FSRU tesislerinin yalnızca bir limana bağlantılı olup olmadığını belirleyen algoritmanın işleyişini algoritmik doğal dille ifade ediniz.

Algoritmik Doğal Dil


Konu ile ilgili daha fazla soru çözmek için karekodu okutunuz.

5.3. ALGORİTMALARDA VE MATEMATİKSEL İSPATLARDA MANTIK BAĞLAÇLARI VE NİCELEYİCİLER

Konuya Başlarken

Kriptolojinin temel unsurlarından biri olan anahtar değiş tokuşu, iletişim kuran tarafların güvenli bir şekilde şifreleme anahtarları paylaşmalarını sağlar. Bu alanda kullanılan Diffie-Hellman (Difi-Helmın) yöntemi, güvenli olmayan kanallar aracılığıyla bir ortak gizli anahtar oluşturulmasına olanak tanır. Diffie-Hellman anahtar değiş tokuşu yöntemi, şifreleme protokollerinin temelini oluşturarak siber saldırılara karşı koruma sağlar ve hassas verilerin korunmasına yardımcı olur. Bu nedenle gelişmiş şifreleme yöntemlerinin anlaşılması ve uygulanması, ülkemizin siber altyapısını güçlendirmek ve ulusal güvenlik seviyesini artırmak için hayati öneme sahiptir.

Diffie-Hellman anahtar değiş tokuşu yönteminde asal sayılar, üslü gösterimler ve kalan bulma gibi matematiksel yapılar kullanılır. Bu durum karşılıklı mesajlaşma sırasında Uğur ve Elif'in cihazlarının iletişim güvenliği için kullandığı Diffie-Hellman anahtar değiş tokuşu algoritmasının işleyişine ilişkin akış şemasıyla aşağıdaki gibi örneklendirilebilir.



Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız ve fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. Diffie-Hellman anahtar değiş tokuşu yönteminin güvenli iletişim sağlamada üstlendiği rolü açıklayınız.
2. Diffie-Hellman anahtar değiş tokuşu yönteminde asal sayı ve taban seçiminin önemini açıklayınız.
3. Uğur ve Elif'in cihazları hangi matematiksel işlemleri gerçekleştirerek ve mantık bağlaçlarını kullanarak iletişim kurmaya devam eder?

Mantık bağlaçları ve niceleyiciler, matematiksel önermelerin yapı taşlarıdır. Bu araçlar, önermeleri birleştirerek ve niceliklerini belirleyerek matematiksel ispat ve algoritmaları şekillendirir.

10. Uygulama

Bir Önermenin Cebirsel İspatı ve Algoritmik Yaklaşım ile Doğrulanması

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdaki "Her tek tam sayının karesi de tek sayıdır." önermesinin ilk adımı verilen cebirsel ispatını tamamlayınız.

1. adım: $n \in \mathbb{Z}$ için $x = 2n + 1$ olsun.

2. Her tek tam sayının karesinin tek sayı olup olmadığını bulan bir algoritmanın işleyişini algoritmik doğal dil ve akış şemasıyla ifade ediniz.

Algoritmik Doğal Dil

Akış Şeması

3. Elde ettiğiniz algoritmayı -10' dan 10'a kadar olan tek tam sayılar için test ediniz.

4. Elde ettiğiniz algoritmanın işleyişi ile cebirsel ispat adımları arasındaki benzerlik ve farklılıkları açıklayınız.

5. Cebirsel, sözel ve algoritmik yaklaşım ile ifade edilen ispat sürecinde hangi mantık bağlaçları ve niceleyicilere neden ihtiyaç duyulduğunu açıklayınız.

8. ÖRNEK

"abc üç basamaklı bir doğal sayı; $k \in \mathbb{Z}$, m ve $n \in \mathbb{Z}^+$ olmak üzere
$(a+b+c=3m \wedge c=2k) \Rightarrow abc=6n$" önermesi için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Önermenin doğruluğunu ispatlayınız.

b) Elde ettiğiniz ispat adımları yardımıyla üç basamaklı bir doğal sayının 6'ya tam bölünüp bölünmediğini bulan bir algoritmanın işleyişini algoritmik doğal dille ifade ediniz.

c) Aşağıdaki sözde kodu inceleyerek mantık bağlaçlarının işlevini açıklayınız.

Sözde Kod

Girdi: abc doğal sayısı
Çıktı: abc nin 6'ya tam bölünüp bölünmediğine dair bir çıktı
Başla
a ← abc / 100 (Bölümün tam kısmı alınır.)
b ← (abc / 10) % 10 (Önce bölümün tam kısmı alınır. Ardından 10 ile bölümünden kalan bulunur.)
c ← abc % 10
(a + b + c) % 3 = 0 ve c % 2 = 0 ise yazdır "abc, 6'ya tam bölünür."
Değilse yazdır "abc, 6'ya tam bölünmez."
Bitir

Çözüm

a) k, m, n, p ve $r \in \mathbb{Z}^+$ olsun.

$a+b+c=3m \Rightarrow \underbrace{\underbrace{99a+9b}_{3(33a+3b)}}_{p} + a+b+c = abc$ (Eşitliğin iki tarafına 3'ün katı olan 99a + 9b eklenir.)

$$3p+3m=abc$$
$$3(p+m)=abc$$
$$3r=abc \text{ elde edilir.}$$

c = 2k ise abc 2'ye tam bölünür. abc hem 2'ye hem de 3'e tam bölündüğünden abc = 6n bulunur.

b) *Algoritmik Doğal Dil*

1. adım: Başla.
2. adım: **Girdilerin alınması**
Kullanıcıdan üç basamaklı bir doğal sayı alın.
3. adım: **Sayının basamaklarının ayrılması**
Sayının yüzler basamağı olan a yı elde etmek için sayıyı 100'e bölün ve bölümün tam kısmını alın.
Sayının onlar basamağı olan b yi elde etmek için sayıyı 10'a bölün, bölümün birler basamağını alın.
Sayının birler basamağı olan c yi elde etmek için sayıyı 10'a bölün ve kalanı alın.
4. adım: **Sayının 6'ya tam bölünüp bölünmediğinin kontrol edilmesi**
c ve a + b + c ifadesini elde edin.
5. adım: **Sonucun kontrol edilmesi ve yazdırılması**
c 2'nin katı ve a + b + c 3'ün katı ise abc 6'ya tam bölünür,
değilse abc 6'ya tam bölünmez.
6. adım: Bitir.

c) Sözde kodda kullanılan "ve" bağlacı "$(a+b+c)\,\%\,3=0$ ve $c\,\%\,2=0$" ifadesindeki her iki eşitliğin sağlanması durumunda sayının 6'ya tam bölünebileceğini göstermektedir.

"ise" bağlacı yardımıyla abc sayısının 6'ya tam bölünme durumu $\left[(a+b+c)\ 3=0 \text{ ve } c\ 2=0\right]$ kontrol edilir. Bu yapı, algoritmanın girdiye göre dinamik çıktılar üretmesini sağlar.

Konu ile ilgili etkileşimli içeriğe ulaşmak için karekodu okutunuz.

5. Sıra Sizde

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Üç basamaklı bir doğal sayının 8'e tam bölünüp bölünmediğini gösteren bir önerme yazıp bu önermenin doğruluğunu ispatlayınız.

b) Önermeyi ispatlamak için kullandığınız mantık bağlaçları ve niceleyicilere yönelik çıkarımlarınız ne olur? Açıklayınız.

c) İspat adımlarından hareketle üç basamaklı bir doğal sayının 8'e tam bölünüp bölünmediğini bulan bir algoritmanın işleyişini akış şeması ile ifade ediniz.

Akış Şeması

11. Uygulama

Bir Cebirsel İspatın Algoritmik Yaklaşımla İncelenmesi

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Artanlığın tanımından faydalanarak "$\forall a > 0$ için $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=ax+b$ şeklinde tanımlı doğrusal fonksiyon artandır." önermesinin doğruluğunu ispatlayınız.

2. Yaptığınız cebirsel ispatın adımlarının her birini sözel olarak ifade ediniz.

3. Elde ettiğiniz sözel ifadelerden faydalanarak ispatın aşamalarını ifade eden bir algoritmanın işleyişini algoritmik doğal dil ve akış şeması yardımıyla ifade ediniz.

Algoritmik Doğal Dil

Akış Şeması

4. Cebirsel, sözel ve algoritmik yaklaşım ile ifade edilen ispat sürecinde mantık bağlaçları ve niceleyicilere neden ihtiyaç duyulduğunu açıklayınız.

Konu ile ilgili çalışma kâğıdına ulaşmak için karekodu okutunuz.

Kontrol Noktası

Mantık bağlaçları ve niceleyicilerin matematiksel ispat ve algoritmik süreçlerdeki işlevleri aşağıdaki bilgi görselinde verilmiştir.

Mantık Bağlaçları ve Niceleyicilerin Matematiksel İspat ve Algoritmalardaki İşlevleri

- **Koşullara Göre Karar Verme**
  Mantık bağlaçları, ispat süreçlerinde karar noktalarını belirlemek ve farklı durumlar arasında geçişi kontrol etmek için kullanılır.
- **Adımları Birleştirme**
  Mantık bağlaçları, bir ispatın adımlarını birbirine bağlamak ve sonuçların doğruluğunu sağlamak için kullanılır.
- **Genelleme ve Özelleştirme**
  Niceleyiciler, matematiksel ifadelerde genelleme veya özelleştirme yapmak için kullanılır.
- **Sembolik İfadelerin Anlaşılması**
  Niceleyiciler ve mantık bağlaçları, sembolik ifadelerin doğru yorumlanmasını sağlayarak matematiksel dilin anlaşılırlığını ve netliğini artırır.

Alıştırmalar

1. "Çarpımı sıfır olan iki gerçek sayıdan en az biri sıfırdır." önermesi veriliyor.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Önermenin doğruluğunu ispatlayınız.

b) Yaptığınız cebirsel ispatın her bir adımını sözel olarak ifade ediniz. Önermenin doğruluğunu ispatlamak için kullandığınız mantık bağlaçları ve niceleyicilere yönelik çıkarımlarınız ne olur? Açıklayınız.

c) Elde ettiğiniz sözel ifadelerden faydalanarak ispatın aşamalarını ifade eden bir algoritmanın işleyişini sözde kod, algoritmik doğal dil ve akış şeması yardımıyla ifade ediniz.

Sözde Kod

Algoritmik Doğal Dil

Akış Şeması

Konu ile ilgili daha fazla soru çözmek için karekodu okutunuz.


Farklı Kaydet

Bu temada öğrendiğiniz bilgileri kendi hatırlayacağınız şekilde bu alana kısaca not edebilirsiniz.

Ölçme ve Değerlendirme

Bu bölümde cevaplamanız için farklı soru tiplerinde 10 adet soru bulunmaktadır.
Ölçme ve değerlendirme bölümünün sonunda verilen karekodu okutarak ek sorulara ulaşabilirsiniz.

1. Aşağıda 100 soruluk bir sınavın sonunda belirli ölçütlere göre alınacak puanı hesaplayan ve elde edilen puana göre dönüt veren algoritmanın işleyişi akış şemasıyla ifade edilmiştir.



Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.


a) Aşağıdaki tabloda üç öğrencinin sınav verileri paylaşılmıştır. Bu verilere göre öğrencilerin sınavdan aldıkları puanları ve algoritmanın verdiği çıktıları tabloda uygun yerlere yazınız.

	Sıla	Mesut	Ruhi
Doğru Sayısı	74	48	84
Yanlış Sayısı	15	21	10
Boş Sayısı	11	31	6
Puan			
Çıktı			

b) Algoritmanın işleyişini sözde kod ile ifade ediniz.

Sözde Kod

2. Aşağıda bir kırtasiyenin her bir kalem satışı sonrasında kâr mı, zarar mı ettiğini bulan algoritmanın işleyişi akış şemasıyla ifade edilmiştir.



Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Bir kalemin alış fiyatı 75 Türk lirası ve satış fiyatı 119 Türk lirası olduğuna göre kırtasiyenin kâr mı, zarar mı ettiğini akış şeması yardımıyla hesaplayınız.

b) Algoritmanın işleyişini sözde kod ile ifade ediniz.

Sözde Kod

3. Bir markette satılan tereyağının 700 gramlık paketinin fiyatı 280 TL'dir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Barkod hazırlama makinesinin yazılımının kullandığı, tereyağının 700 gramlık paket fiyatı girildiğinde 1 kilogramının fiyatını veren algoritmanın işleyişini algoritmik doğal dil, sözde kod ve akış şemasıyla ifade ediniz.

Algoritmik Doğal Dil

Sözde Kod

Akış Şeması

b)

TEREYAĞI 700 gr


280 TL

..... TL/kg

Yukarıda verilen etiket üzerindeki değerleri kullanarak algoritmayı test ediniz ve etiket üzerinde boş bırakılan yeri tamamlayınız.


4. Helmut Hasse [Helmut Hase (1898-1979)], sayı teorisi ve cebir alanlarında önemli katkılarda bulunmuş bir Alman matematikçidir. Hasse diyagramı, adını Helmut Hasse'den alır.

Hasse diyagramı, bir sayının asal çarpanlarını ve bu çarpanların birleşimlerini göstermek için kullanılabilir. Şekil 1'de verilen Hasse diyagramında 30 sayısının asal çarpanları 2, 3 ve 5 düğümleri olarak yer almaktadır. Yukarıya doğru çıkıldıkça bu çarpanların çeşitli kombinasyonları daha büyük çarpanları oluşturmaktadır.



Şekil 1

Şekil 2'de 30'un çarpanlarına eklenen yeni çarpanlarla birlikte 60 sayısının çarpanları Hasse diyagramı yardımıyla gösterilmektedir.



Şekil 2

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Şekil 1 ve 2 yardımıyla 30 ve 60'ın pozitif tam sayı bölenlerinin sayısının düğüm sayılarıyla olan ilişkisini açıklayınız.

b) 42 sayısının çarpanlarına eklenen yeni çarpanlarla 84 sayısının çarpanlarını Hasse diyagramı yardımıyla gösteriniz.

Çizge Çizim Alanı

c) 42 sayısının çarpanlarını Hasse diyagramıyla gösteriniz.

Çizge Çizim Alanı

ç) Deneme bölme algoritması yardımıyla 42 sayısının asal çarpanlarını bulunuz ve Hasse diyagramındaki çarpanlar ile aynı olup olmadığını karşılaştırınız.

5. Anatoly Alexeevitch Karatsuba (Anatoli Aleksiyeviç Karatsuba) tarafından 1960 yılında keşfedilen Karatsuba yöntemi, iki büyük sayıyı çarpmak için kullanılır. Bu yöntemde geleneksel çarpma yöntemlerine göre daha az çarpma işlemi yapılarak büyük sayılar daha verimli şekilde çarpılır. Bu durum özellikle kriptografi (şifreleme) gibi alanlarda verimliliği artırır.

Geleneksel yaklaşımla 87 ve 91'in çarpımının çözümlemesi aşağıda verilmiştir.

$a = 87$ ve $b = 91$ için $a = 10p + q$ ve $b = 10r + s$ olmak üzere $p = 8, q = 7, r = 9$ ve $s = 1$ elde edilir.

$$\begin{aligned} a \cdot b &= (10p + q) \cdot (10r + s) \\ &= 100pr + 10(ps + qr) + qs \end{aligned}$$

olduğundan

$$\begin{aligned} 87 \cdot 91 &= 100 \cdot 8 \cdot 9 + 10(8 \cdot 1 + 7 \cdot 9) + 7 \cdot 1 \\ &= 7200 + 710 + 7 \\ &= 7917 \text{ olur.} \end{aligned}$$

Karatsuba, geleneksel yaklaşımdaki çarpma işlemlerinin sayısını v değişkenini türeterek azaltmıştır.

$$u = p \cdot r$$
$$v = (q - p) \cdot (s - r)$$
$$y = q \cdot s$$

olmak üzere $a \cdot b = u \cdot 10^2 + (u + y - v) \cdot 10 + y$ olur. Buradan

$$u = 8 \cdot 9 = 72$$
$$v = (7 - 8) \cdot (1 - 9) = 8$$
$$y = 7 \cdot 1 = 7 \text{ bulunur.}$$

Bu durumda

$$\begin{aligned} 87 \cdot 91 &= 72 \cdot 10^2 + (72 + 7 - 8) \cdot 10 + 7 \\ &= 7917 \text{ elde edilir.} \end{aligned}$$

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) $96 \cdot 78$ ifadesinin eşitini Karatsuba yöntemiyle bulunuz.

b) Karatsuba yöntemiyle iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını bulan algoritmanın işleyişini akış şemasıyla ifade ediniz.

Akış Şeması

c) Karatsuba yöntemini kullanarak $99 \cdot 87$ işleminin sonucunu akış şeması üzerinde hesaplayınız.

6. Aşağıda katsayıları ekrandan girilen, sıfırdan farklı $\forall a \in \mathbb{R}$ ve $\forall b \in \mathbb{R}$ için $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = ax + b$ şeklinde tanımlı doğrusal fonksiyonun sıfırını, grafiğinin y eksenini kestiği noktanın ordinatını, eğimini ve fonksiyonun artan veya azalan olma durumunu ekrana yazdıran bir algoritmanın işleyişi algoritmik doğal dille verilmiştir.

Algoritmik Doğal Dil

1. adım: Başla.

2. adım: **Girdilerin alınması**

Kullanıcıdan bir fonksiyonun katsayılarını ($a \neq 0$, b) al.

3. adım: **Fonksiyonun sıfırının bulunması**

Fsıfır'ı bul. Bu işlem için Fsıfır'ı $-\frac{b}{a}$ değerine eşitle.

4. adım: **Fonksiyonun grafiğinin y eksenini kestiği noktanın ordinatının bulunması**

Fyeksen'i bul. Bu işlem için Fyeksen'i b değerine eşitle.

5. adım: **Fonksiyonun eğiminin bulunması**

Fegim'i bul. Bu işlem için Fegim'i a değerine eşitle.

6. adım: **Fonksiyonun azalanlığının kontrol edilmesi ve ekrana yazılması**

Fegim sıfırdan küçükse ekrana

"Fonksiyon azalan, sıfırı Fsıfır, y eksenini kestiği noktanın ordinatı Fyeksen ve eğimi Fegim olur." yaz ve 7. adıma git.

Fegim sıfırdan büyükse ekrana

"Fonksiyon artan, sıfırı Fsıfır, y eksenini kestiği noktanın ordinatı Fyeksen ve eğimi Fegim olur." yaz ve 7. adıma git.

7. adım: Bitir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Algoritmanın işleyişini akış şemasıyla ifade ediniz.

Akış Şeması

b) Elde ettiğiniz akış şeması yardımıyla tabloda verilen a ve b gerçek sayıları için algoritmanın ekran çıktılarını belirleyiniz.

Fonksiyon	a	b	Ekran Çıktısı
$k: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$	1	0	
$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$	2	6	
$h: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$	–5	10	

7. Rakamları toplamına kalansız olarak bölünen doğal sayılara Harshad (Harşat) sayıları denir. Aşağıda bir sayının Harshad sayısı olup olmadığını belirleyen bir algoritmanın işleyişi, algoritmik doğal dille ifade edilmiştir.

Algoritmik Doğal Dil

1. adım: Başla.
2. adım: Girdilerin alınması
Kullanıcıdan bir sayı girişi yapmasını iste.
3. adım: Rakamlar toplamının hesaplanması
Sayının rakamlarını topla.
4. adım: Sayının, rakamlarının toplamına bölünmesi
Sayıyı rakamlarının toplamına böl.
5. adım: Sonucun yazdırılması
4. adımda elde edilen kalan sıfıra eşitse ekrana "Sayı Harshad sayısıdır." yazdır.
Değilse ekrana "Sayı Harshad sayısı değildir." yazdır.
6. adım: Bitir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Algoritmanın işleyişini akış şemasıyla ifade ediniz.

Akış Şeması

b) 103, 116, 231, 402 ve 514 için algoritmayı akış şeması üzerinde test ediniz.

8. "abcd dört basamaklı bir doğal sayı ve $x, y \in \mathbb{N}$ olmak üzere $a + b + c + d = 9x \Rightarrow abcd = 9y$" önermesi için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Önermenin doğruluğunu ispatlayınız. Önermeyi ispatlamak için kullandığınız mantık bağlaçları ve niceleyicilere yönelik çıkarımlarınız ne olur? Açıklayınız.

b) Elde edilen ispat adımları yardımıyla dört basamaklı bir doğal sayının 9'a tam bölünüp bölünmediğini bulan bir algoritmanın işleyişini algoritmik doğal dille ifade ediniz.

Algoritmik Doğal Dil

9. Bir hastanede doktor olarak görev yapan Emre Bey, bağlı bulunduğu birimde yatan hastaları ziyaret edecektir. Bu ziyarette her bir hastasının açlık şekeri, tansiyon ve nabız değerlerine bakacak olan Emre Bey; bu değerlerin üçü de referans değer aralığında ise hastayı taburcu edecektir. Aşağıdaki tabloda Emre Bey'in hastalarına ait söz konusu değerler verilmiştir.

	Hastanın Adı		
	Ayşe	**Kemal**	**Orhan**
Açlık Şekeri (mg/dl)	50	70	80
Tansiyon Ölçümü (mmHg) (büyük/küçük)	120/80	110/70	125/75
Nabız Değeri (atım/dk.)	70	50	90

Bu değerlerin referans değer aralıkları ise aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Değer	Referans Değer Aralığı
Açlık Şekeri (mg/dl)	70-100
Büyük Tansiyon (mmHg)	120-130
Küçük Tansiyon (mmHg)	70-90
Nabız Değeri (atım/dk.)	60-100

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Hastaların değerlerini referans değer aralıkları ile karşılaştırarak Emre Bey'in taburcu edeceği hastaları belirleyiniz.


b) Emre Bey'in hastalarını taburcu etmek için kullanacağı algoritmanın işleyişini algoritmik doğal dille ifade ediniz.

Algoritmik Doğal Dil

c) Hasta taburcu etme algoritmasının işleyişini akış şemasıyla ifade ediniz.

Akış Şeması








10. Şekil 1'de verilen çizge; A noktasından başlanarak, kalem hiç kaldırılmadan, her ayrıttan bir kez geçilip başlangıç noktasına dönülmek şartıyla görselde numaralandırılmış ayrıtlar takip edilerek kâğıt üzerine çizilebilir.




Şekil 1

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Tabloda verilen her bir çizge için bir başlangıç noktası belirleyiniz ve çizgenin ayrıtlarını numaralandırınız. Belirlediğiniz başlangıç noktasından kaleminizi hiç kaldırmadan, verdiğiniz numaraları izleyerek ve her ayrıttan bir kez geçip başlangıç noktasına dönmek şartıyla çizgenin çizilebilme durumunu belirtiniz. Tabloyu örnekteki gibi doldurunuz.


Çizge	Çizilebilir./ Çizilemez.
	Çizilebilir.
	
	
	
	
	
	

b) Şekil 2'de verilen çizgede başlangıç noktası aynı kalacak şekilde Şekil 1'dekinden farklı bir rota izlenerek, kalem hiç kaldırılmadan ve her ayrıttan bir kez geçilerek başlangıç noktasına dönmek mümkündür.



Şekil 2

Buna göre aşağıda verilen çizgeleri başlangıç noktası aynı kalacak şekilde, kaleminizi hiç kaldırmadan, farklı bir rota izleyerek ve her ayrıttan bir kez geçip başlangıç noktasına dönmek şartıyla aşağıdaki çizge alanına çiziniz.



Çizge Çizim Alanı

Tema ile ilgili daha fazla soru çözmek için karekodu okutunuz.

6. TEMA

İstatistiksel Araştırma Süreci



6.1. Tek Nicel Değişkenli Veri Dağılımları ile Çalışma ve Veriye Dayalı Karar Verebilme

6.2. Başkaları Tarafından Oluşturulan Tek Nicel Değişkenli Veri Dağılımlarına Dayalı Sonuç veya Yorumları Tartışabilme

▶ Anahtar Kavramlar

- çeyrekler açıklığı
- değişebilirlik
- evren
- histogram
- kutu grafiği
- nicel veri dağılımı
- örneklem
- standart sapma

▶ Bu temada sizden

- tek nicel değişkenli veri dağılımları ile çalışabilmeniz ve tek nicel değişken içeren veriye dayalı karar verebilmeniz,
- başkaları tarafından oluşturulan tek nicel değişkenli veri dağılımlarına dayalı istatistiksel sonuç veya yorumları tartışabilmeniz

beklenmektedir.

Tema boyunca sizden çalışma kâğıtlarındaki soruları çözmeniz, performans görevlerini yerine getirmeniz, ölçme ve değerlendirme sorularını çözmeniz beklenmektedir.



Tema karekodu


Tema sunusuna ulaşmak için karekodu okutunuz.

Başlarken

İstatistiksel araştırmalar; verilerden bilgiye ulaşmak, bu bilgilerden yola çıkarak geleceğe yönelik tahminlerde bulunmak veya bu bilgilere dayalı karar verebilmek amacıyla yapılan araştırmalardır. İstatistiksel araştırmalar sayesinde gerçek yaşamda insanları ilgilendiren birçok soru; verilerin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanmasıyla cevaplanabilmektedir.

Ön Değerlendirme

1. Aşağıda yer alan döngüsel şemada istatistiksel araştırma süreci aşamalarından biri verilmiştir.



Diğer aşamaları istatistiksel araştırma sürecinin döngüsel yapısına uygun şekilde yazınız.

2. Bir grup öğrenci, Dünya Sağlık Haftası'nda (7-13 Nisan) şekerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla ambalajlı gıdalardaki şeker miktarlarını gösteren bir poster hazırlamaktadır. Gençlerin özellikle tercih ettiği ve şeker içeren 33 ambalajlı gıdayı belirleyen öğrenciler, bu gıdalarda bulunan şeker miktarlarını kaydederek aşağıdaki nokta grafiğini oluşturmuştur.



Grafikte verilenlere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Öğrencilerin planladığı araştırmaya kaynaklık eden istatistiksel araştırma sorusu ne olabilir?

b) Öğrenciler verileri nasıl toplamış olabilir? Açıklayınız.

c) Dağılımda yer alan verilerin eğilim gösterdiği merkez neresi olabilir? Merkezi bulabilmek için hangi veri özetleme değerlerine bakmak gerekir?

ç) Dağılımda yer alan verilerin geneline göre daha uzakta kalan veri veya veriler hangileri olabilir? Bu veriler, veri özetleme değerlerini nasıl etkiler? Açıklayınız.

d) Grafikte yer alan verilerden yola çıkılarak hangi veri özetleme değerlerine ulaşılabilir? Bu değerlerin sunduğu bilgileri açıklayınız.

3. Bir grup öğrenci, hayvanlarla ilgili araştırma projeleri için "Dünyanın en uzun hayvanı hangisidir?" sorusunu istatistiksel araştırma sorusu olarak belirlemek istiyor.


Bu sorunun istatistiksel araştırma sorusu olup olmadığını gerekçeleriyle değerlendiriniz.

4. Her sınıf seviyesinden altı şubenin bulunduğu bir lisede spor kulübündeki öğrenciler, kulüpleri için dört farklı logo tasarlamıştır. Öğrencilerden kulüp logosunu belirlemek üzere dört logodan birini seçmeleri istenmektedir. Spor kulübü öğrencileri, en beğenilen logoyu tespit etmek için aşağıdaki beş farklı yöntemi belirlemiştir.

1. Yöntem	Her sınıfın başkan ve başkan yardımcısına sormak
2. Yöntem	Spor kulübüne üye öğrencilerin tümüne sormak
3. Yöntem	9. sınıfların okula yeni başlaması ve 12. sınıfların okuldan ayrılacak olması nedeniyle 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden rastgele belirlenen 200 öğrenciye sormak
4. Yöntem	Her sınıf seviyesindeki tüm şubelerden rastgele belirlenen 10 öğrenciye sormak
5. Yöntem	Her sınıf seviyesinden belirlenen bir şubedeki öğrencilere sormak

Spor kulübünün amacı doğrultusunda kulüp logosunun belirlenmesinde hangi yöntemlerin öğrenci görüşlerini en iyi şekilde temsil edeceğine karar veriniz. Diğer yöntemlerin temsil etme gücünün neden düşük olduğunu düşünüyorsunuz? Açıklayınız.

5. Bir şehirde belediye başkanlığı seçimi için yapılan ankette vatandaşlara hangi adayı tercih ettikleri sorulmuş ve soruya cevap verirken birden fazla adayın ismini söyleyebilecekleri bilgisi verilmiştir. Anket sonuçları, araştırmacılar tarafından aşağıdaki daire grafiğiyle paylaşılmıştır.



Verilen daire grafiğindeki sonuçları inceleyiniz. Bilgilerde bir hata olup olmadığını belirleyiniz. Hata olduğunu düşünüyorsanız bu bilgileri doğru bir şekilde sunmak için ne yapılması gerektiğini açıklayınız.

6.1. TEK NİCEL DEĞİŞKENLİ VERİ DAĞILIMLARI İLE ÇALIŞMA VE VERİYE DAYALI KARAR VERME


Konuya Başlarken

Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama yüzey sıcaklığının arttığı bilinmektedir. Küresel ısınma; buzul miktarının azalmasına, deniz seviyesinin yükselmesine, aşırı hava olaylarının daha sık görülmesine neden olmaktadır. Aşağıdaki görselde küresel ısınmadan kaynaklanan bazı sorunlarla ilgili bilgiler yer almaktadır.



Araştırmacılar, küresel ısınmayla mücadele edebilmek için ısınmanın hangi hızla gerçekleştiğinin tespit edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Dünya'nın ortalama yüzey sıcaklığı ile ilgili ölçümlerin uzun yıllardan beri yapıldığı bilinmektedir. Bu ölçümlere göre Dünya'nın ortalama yüzey sıcaklığı 2021 yılında Sanayi Devrimi öncesi ortalamanın 1,1 °C üzerine çıkmıştır.

Grafik 1'de 1850-2023 yılları arasındaki küresel ortalama sıcaklık değerlerinin 1850-1900 yılları arası küresel ortalama sıcaklık değerlerinden ne kadar saptığına dair veriler yer almaktadır. Örneğin 2020 yılı küresel sıcaklık değerinin 1850-1900 yılları arası küresel ortalama sıcaklık değerinden yaklaşık 1,4 °C fazla olduğu görülmektedir.




Grafik 1: *1850-2023 yılları arasında küresel ortalama sıcaklıklarının sapma değerleri*

Grafikteki verileri göz önünde bulundurarak aşağıdaki soruları sınıf içinde tartışınız.

1. Küresel ortalama sıcaklık değerlerindeki sapmaların hangi değerlerde yoğunlaştığını görebilmek için hangi veri özetleme araçlarına ihtiyaç duyulur?
2. 1850 ile 2023 yılında gözlemlenen sıcaklık sapma değerleri arasındaki fark belirlendiğinde sıcaklık farkının neden olacağı olumsuz etkileri anlamlandırabilmek için hangi veri özetleme değerine bakılması gerekir?
3. Dağılımın merkezine yığılan küresel ortalama sıcaklık değerlerindeki sapmaların hangi aralıklarda yoğunlaştığını görebilmek için hangi veri görselleştirme aracı kullanılabilir?
4. Küresel ortalama sıcaklık değerlerindeki sapmaların dağılımına göre çok düşük ya da çok yüksek sıcaklık sapma değerleri olup olmadığını görebilmek için hangi veri görselleştirme aracı kullanılabilir?
5. Belli zaman aralıklarında sıcaklık değerlerinin sapmalarındaki değişimi görebilmek için hangi veri görselleştirme aracı kullanılabilir?

Nicel veri dağılımları ile yürütülecek istatistiksel araştırma süreci tek nicel değişkene odaklanılarak gerçekleştirilebilir. Bu durumda istatistiksel araştırma soruları tek nicel değişkene uygun olarak hazırlanır. Hazırlanan sorular doğrultusunda veri toplama planı yapılır ve verilere ulaşılır. Ulaşılan veriler analiz edilerek yorumlanır.

Tek Nicel Değişkenli Veriye Dayalı İstatistiksel Araştırmalarda Bağlam



Grafik 6.1: *Tek nicel değişkenli bir veri dağılımına yönelik nokta grafiği*

Grafik 6.1'de verilen tek nicel değişkenli veri dağılımına yönelik nokta grafiğini inceleyiniz. Bu verilerden anlamlı bir bilgi elde edebilmek mümkün müdür? Mümkün olmadığını düşünüyorsanız hangi bilgilere ihtiyaç olduğunu sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.

Nicel Veri


Nicel veriler, bir grubun özelliklerinin sayılması veya ölçülmesiyle elde edilen verilerdir.

İstatistiksel araştırmalarda bağlam, verilere dayalı bilgi üretme ihtiyacı duyulan gerçek yaşam durumlarıdır. İstatistiksel araştırma süreci, bağlama yönelik istatistiksel araştırma soruları oluşturmayla başlar ve bağlam sürecin tamamında önemli bir rol oynar. Bu nedenle gerçek yaşam durumlarından yola çıkılarak istatistiksel araştırmanın bağlamının belirlenmesi ve istatistiksel araştırma sürecinin bağlam doğrultusunda oluşturulması gerekmektedir.

1. Uygulama

İstatistiksel Bağlam Oluşturma

Aşağıdaki diyagramın kollarında gerçek yaşam durumlarına ve bu durumlardan yola çıkılarak oluşturulan tek nicel değişkenli veriye dayalı bilgi üretmeye yönelik istatistiksel bağlamlara örnekler verilmiştir. Dörder kişilik gruplara ayrılınız. Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.



1. Diyagramda yer alan gerçek yaşam durumlarından yola çıkılarak elde edilen istatistiksel bağlam örneklerini grupça inceleyiniz. Bu bağlamların tek nicel değişkenli veri toplamayı gerektiren bağlamlar olmasının nedeni üzerine tartışınız.

2. "Bir yılda üretilen narenciye miktarı" şeklinde verilen istatistiksel bağlam hangi gerçek yaşam durumundan yola çıkılarak oluşturulmuştur? Fikrinizi yazınız ve sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. Yakın çevrenizde veya dünyada ilginizi çeken, merak ettiğiniz, veri toplamayı gerektiren gerçek yaşam durumlarını belirleyiniz. Belirlediğiniz gerçek yaşam durumlarından birini boş bırakılan gerçek yaşam durumları kutucuğuna yazınız.

4. Diyagramda yer alan gerçek yaşam durumlarına ait kutucukları doldurduktan sonra bu durumlara yönelik belirleyeceğiniz tek nicel değişkenli veri toplamayı gerektiren istatistiksel bağlamları ilgili kutucuklara yazınız. Yazdığınız istatistiksel bağlamları sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. ÖRNEK

Aşağıdaki gerçek yaşam durumları için tek nicel değişkenli veri toplamayı gerektiren bağlamlar oluşturarak tabloya yazınız.

İklim Sorunu	
Sağlık	
Spor	

Çözüm

Yukarıda verilen durumlar için araştırmacılar araştırmak istediği, merak ettiği, ilgi duyduğu konularda tek nicel değişkenli veri toplamayı gerektiren bağlamlar oluşturabilir. Aşağıda tek nicel değişkenli veri toplamayı gerektiren örnek bağlamlar yer almaktadır. Bu bağlamlar istendiği kadar çoğaltılabilir.

İklim Sorunu	• Lise öğrencilerinin iklim değişikliğine ilişkin farkındalık düzeyleri • İklim değişikliği sebebiyle buzulların erime miktarındaki değişim
Sağlık	• Aile hekimliği uygulamasından faydalanan bireylerin aile hekimleriyle görüşme süreleri • Bireylerin aldığı günlük kalori miktarı
Spor	• 100 metre koşu dalında kırılan rekorların yıllara göre değişimi • Voleybol oyuncularının sıçrama yükseklikleri


1. Sıra Sizde

Aşağıdaki tabloda verilen gerçek yaşam durumlarına yönelik tek nicel değişkenli veri toplamayı gerektiren bağlamlar oluşturarak ilgili sütuna yazınız. Oluşturduğunuz bağlamların tek nicel değişkenli veri toplamayı gerektiren bağlamlar olup olmadığını sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. Boş bırakılan gerçek yaşam durumu kutucuğuna merak ettiğiniz, ilgi duyduğunuz bir gerçek yaşam durumu ve bu gerçek yaşam durumuna yönelik tek nicel değişkenli veri toplamayı gerektiren bir bağlam yazınız.

Gerçek Yaşam Durumları	Tek Nicel Değişkenli Veri Toplamayı Gerektiren Bağlam
Ekonomi	
Doğa	
Uzay	

Tek Nicel Değişkenli Veriye Dayalı İstatistiksel Araştırma Sorusu Oluşturma

Grafik 6.2'de yer alan nokta grafiği, bir ülkenin lunaparklarında bulunan hız trenlerinin maksimum hızlarının dağılımını göstermektedir.



Grafik 6.2: *Bir ülkenin lunaparklarında bulunan hız trenlerinin maksimum hızları*

Bu grafiği oluşturmayı gerektiren istatistiksel araştırma sorusu ne olabilir? İstatistiksel araştırma sorusu oluşturulurken nelere dikkat edilmesi gerektiğini sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.

2. Uygulama

Tek Nicel Değişkenli Veri Toplamayı Gerektiren Araştırma Sorusu Oluşturma

Dörder kişilik gruplara ayrılarak aşağıda verilen bilgileri okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

Küresel iklim değişikliği tüm dünya ülkelerini ve toplumları ilgilendiren bir sorundur. Araştırmacılar, farklı toplumların iklim değişikliği problemine yönelik farkındalıklarının aynı olmadığını söylemektedir. Türkiye Yüzyılı kapsamında yürütülen projelerden biri olan Türkiye'nin ilk dijital ve engelsiz "Çevre ve Çocuk Akademisi" platformu gençlerin çevre, şehir ve iklim konularında bilinçlenmesini ve gençlerde bu konularda farkındalık oluşturulmasını hedeflemektedir. Bu proje kapsamında 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Devrimi hedeflerine ulaşılması için gençlerin bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Gençler platformda yer alan "çevre", "şehircilik", "iklim değişikliği", "sıfır atık", "doğa ve sanat", "çevre ve iletişim" konularında istedikleri akademiye giriş yapabilmekte; videoları seyrederek topladıkları puanlarla "çevre market" bölümünden bisiklet, scooter (sıkutır), kaykay gibi hediyeler kazanabilmektedir.

Bu bağlamda bir araştırmacı grubu, öğrencilerin iklim sorununa yönelik farkındalıklarını belirlemek için bir araştırma yapmak istemektedir.

1. Grup çalışması yaparak bu araştırma grubunun araştırmasına yön verecek nicel veri toplamayı gerektiren birer adet betimleyen ve karşılaştıran araştırma sorusu oluşturunuz. Oluşturduğunuz soruları yazınız.

Betimleyen Araştırma Sorunuz:

Karşılaştıran Araştırma Sorunuz:

2. Araştırma sorularınızı aşağıda verilen istatistiksel araştırma sorusu ölçütlerine göre grup çalışmasıyla değerlendiriniz. Değerlendirmelerinizi diğer gruplarla tartışınız.

Araştırma sorusunun amacı net midir?

Araştırmaya değer midir?

İlgilenilen grup (evren) açıkça görülmekte midir?

Evren
Araştırma kapsamında ele alınan sonuçların genellendiği topluluktur.

Değişken açıkça görülmekte midir?

Değişken
Gözlemlenen elemanların birinden diğerine değişen veya farklılaşan özelliklerdir.

Veri toplanarak cevaplanabilir mi?

Değişebilirliği yansıtmakta mıdır?

Değişebilirlik
Bir dağılımdaki değerlerin değişkenlerden kaynaklı olarak birbirinden farklılaşmasıdır.

Odaklanılan grup araştırma yapılmasına imkân vermekte midir?

Nicel veri toplamayı gerektirir mi?

İstatistiksel araştırmalara yön verecek istatistiksel araştırma sorularını oluşturmak için dikkat edilmesi gereken ölçütler bulunmaktadır. Tek nicel değişkenli veri toplamayı gerektiren istatistiksel araştırma sorularında bulunması gereken ölçütler Bilgi Görseli 6.1'de yer almaktadır. Tek nicel değişkenli veri toplamayı gerektiren istatistiksel araştırma sorularında bu ölçütlerin görülmesi, istatistiksel araştırma sürecinin sonraki aşamalarının amaca uygun şekilde yürütülmesine katkıda bulunmaktadır.

1 Amacı net olmalıdır.

İstatistiksel araştırma sorularında amaç, net olarak görülmelidir. Araştırma sorusunun amacı sorunun "betimleyen" veya "karşılaştıran" türde olmasıyla ilgilidir.

2 Araştırmaya değer olmalıdır.

Araştırma sorusunun bir amacı vardır ve araştırmaya değerdir.

Örneğin bir sınıftaki kızların ve erkeklerin boylarının karşılaştırıldığı bir araştırma sorusu bağlama göre anlamlı bilgiler verebilir. Ancak bir grup öğrencinin göz rengi ile saç teli uzunluklarını karşılaştırmak anlamlı bir araştırma olmayabilir.

3 İlgilenilen grup (evren) açık olmalıdır.

"Soru kimin hakkında?" sorusunun cevabı, istatistiksel araştırma sorusunda görülmelidir.

4 Değişken açık bir şekilde görülmelidir.

"Soru hangi veriler hakkında?" sorusunun cevabı, istatistiksel araştırma sorusunda görülmelidir.

5 Veri toplanarak cevaplanabilmelidir.

Araştırma sorusu birincil veya ikincil verilerle cevaplanabilmelidir. Ayrıca ölçümün nasıl yapılacağı görülmelidir. Birincil veriler, araştırma sorusunu cevaplamaya yönelik verilerin araştırmacılar tarafından toplanmasıdır. İkincil veriler, başkaları tarafından önceden toplanmış mevcut verilerdir.

6 Değişebilirliği yansıtmalıdır.

Değişebilirlik dört farklı durumdan kaynaklanmaktadır.

- Doğal ortamdan kaynaklı değişebilirlik
- Ölçümden kaynaklı değişebilirlik
- Müdahaleden kaynaklı değişebilirlik
- Örneklemden kaynaklı değişebilirlik

7 Odaklanılan grup araştırma yapılmasına imkân vermelidir.

Soru, verileri tek tek ya da veri dağılımını bütüncül olarak incelemeye yönelik analize imkân vermelidir.

Örneğin bir grupta kimin en uzun olduğu şeklinde bir soru uygun değildir. Uygun olansa gruptaki öğrencilerin boylarının merkezinin nasıl eğilim gösterdiğine odaklanmaktır.

8 Nicel veri toplamaya uygun olmalıdır.

Tek nicel değişkenli veri toplamayı gerektiren araştırmalarda veriler, bir grubun belli bir özelliğinin sayılması veya ölçülmesiyle elde edilen veriler olmalıdır.

Bilgi Görseli 6.1: *İstatistiksel araştırma sorularında bulunması gereken ölçütler*

Değişebilirlik kavramı, istatistiksel araştırma sürecinin merkezinde yer alır. İstatistiksel araştırmalarda toplanan verilerden yola çıkarak sonuçlara ulaşmak, değişebilirliği anlamak ve anlamlandırmakla ilgilidir.

2. ÖRNEK

Aşağıda verilenleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

1. Bir deniz bilimcinin araştırmasında bulunduğu bölgedeki deniz suyu sıcaklığına (°C) dair aynı ay içinde farklı günlerde elde ettiği veriler, Tablo 1'de yer almaktadır.

Tablo 1

Ölçümler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Deniz Suyu Sıcaklığı (°C)	12,7	12,5	14,1	14,5	14,4	14,5	13,6	14,7	14,8	14,7
Ölçümler	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Deniz Suyu Sıcaklığı (°C)	14,8	14,9	14,4	13,6	13,9	14,3	14,2	14,5	13,9	14,1

Deniz bilimci her ölçümde deniz suyu sıcaklığını neden farklı bulmuştur?

2. Bir öğretmen, öğrencisinden 20 cm'lik bir cetvelle öğretmen masasının uzun kenarının ölçüsünü belirlemesi için 10 kez ölçüm yapmasını istemiştir. Öğrencinin ölçümlerden elde ettiği veriler Tablo 2'de verilmiştir. Masanın uzun kenarının ölçüsü 72,5 cm'dir ve öğrenci bu değeri bilmemektedir.

Tablo 2

Ölçümler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ölçüm Sonuçları (cm)	72,2	72,4	72,3	72,7	72,6	72,5	72,8	72,6	72,7	72,4

Öğrenci her ölçümde masanın uzun kenarının ölçüsünü neden farklı bulmuştur?

3. Bir lise öğrencisi, bitkilerin büyümesinde kompost gübrenin etkisini araştırdığı bir proje hazırlamıştır. Öğrenci, projesi için aynı türde 10 cm uzunluğundaki iki bitki fidesinden birinin toprağına kompost gübre eklerken diğerinin toprağına herhangi bir şey eklememiştir. Bunun dışında her iki bitkiye verilen su miktarı, her iki bitkinin maruz kaldığı ışık miktarı gibi bitkilerin büyümesini etkileyecek her şeyi sabit tutmuştur. Her iki bitkinin boylarını beşer gün arayla toplamda 10 kez ölçerek elde ettiği verilerle Tablo 3'ü oluşturmuştur.

Tablo 3

Ölçümler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Normal Toprakta Yetişen Bitkiden Alınan Boy Ölçümleri (cm)	12,5	13,2	14,0	14,8	15,9	17,0	18,5	19,9	21,8	23,4
Kompostlu Toprakta Yetişen Bitkiden Alınan Boy Ölçümleri (cm)	12,5	13,6	14,8	15,7	16,8	17,9	19,8	21,4	23,9	26,2

Öğrenci her ölçümde bitki boylarını neden farklı bulmuştur?

4. Bir okulun rehberlik servisi, matematik başarısı ile matematiğe yönelik tutumlar arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla rastgele yüz ellişer öğrenciden oluşan iki grup belirlemiştir. Daha sonra bu öğrenci gruplarının matematik dersi yıl sonu ortalamalarını hesaplamıştır. Rehberlik servisi rastgele belirlediği 150 öğrencinin matematik dersi yıl sonu ortalamasını 72,6 olarak hesaplarken farklı 150 öğrencinin matematik dersi yıl sonu ortalamasını 71,2 olarak hesaplamıştır.

Rehberlik servisi öğrencilerin matematik dersi yıl sonu ortalamalarını neden farklı bulmuştur?

Çözüm

1. Araştırmacının her ölçümde deniz suyu sıcaklığına ilişkin farklı değerler elde ettiği görülmektedir. Bu farklı değerler, doğada var olan bir değişkenin ölçümü sonucu elde edilmektedir. Değerlerdeki farklılıklar doğal ortamdan kaynaklı değişebilirliği ortaya çıkarmaktadır. Doğal ortamdan kaynaklı değişebilirlik, doğada var olan değişebilirliktir. Ölçülen değişken, doğada var olduğu biçimiyle ölçülür ve toplanan verilerde görülen değişebilirlik anlamlandırılarak sonuçlar elde edilir.

2. Öğrencinin masanın uzun kenarını ölçerken her seferinde farklı bir sonuç elde ettiği görülmektedir. Öğrencinin 20 cm'lik cetvelle her seferinde farklı bir sonuç elde etme durumu beklenebilir. Bu durum, ölçümden kaynaklanan değişebilirliğe örnek gösterilebilir. Bu veriler kullanılarak masanın uzun kenarının gerçek uzunluğuna en yakın değerin elde edilmesi istatistiksel olarak mümkündür. Ölçümden kaynaklı değişebilirlik, ölçüm için kullanılan araçlardan veya ölçüm yapan kişilerin ölçümlerinden kaynaklanan değişebilirliktir.

3. Öğrencinin aynı türden iki bitkinin boylarını ölçtüğü deneyde bitki boylarının 10. ölçüm sonunda aynı değerde olmadığı görülmektedir. Buradaki değişebilirlik, müdahaleden kaynaklı değişebilirliğe örnektir. Öğrenci, deneyinde tüm değişkenleri sabit tutarak bir değişkene müdahalede bulunmuştur. Bu müdahale ise bitkilerin boylarının farklılaşmasına, dolayısıyla değişebilirliğin oluşmasına neden olmuştur. Müdahaleden kaynaklı değişebilirlik, doğal ortama müdahale sonucu görülen değişebilirliktir.

4. Rehberlik servisinin matematik dersi yıl sonu ortalamalarını farklı bulması örneklemden kaynaklı değişebilirliğe örnektir. Farklılığın nedeni, rehberlik servisinin rastgele belirlediği yüz ellişer öğrencinin farklı öğrenciler olmasıdır. Örneklemden kaynaklı değişebilirlik, aynı evrenden farklı örneklemler alındığında görülen değişebilirliktir.

2. Sıra Sizde

Aşağıdaki durumlarda ortaya çıkabilecek değişebilirlik türünü belirleyerek tabloyu doldurunuz. Belirlediğiniz değişebilirlik türünü ve gerekçesini sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.

Durum	Değişebilirlik Türü ve Gerekçesi
Bir kişinin kronometre ile aynı yükseklikten 30 kez bırakılan bir topun düşme süresini belirlemesi	
Voleybol takımına seçilecek öğrencilerin kol uzunluklarının ölçülmesi	
İki gruba ayrılan aynı türden 40 balığın tuzluluk oranları farklı iki akvaryumda gelişimlerinin gözlemlenmesi	
500 kişilik bir gruptan rastgele belirlenen ellişer kişilik iki gruba aynı ölçeğin uygulanması	
Bir şehirdeki doğal su kaynaklarının kirlilik derecesini belirlemek için 70 farklı doğal su kaynağından alınan su numunelerindeki kirlilik derecesinin belirlenmesi	
Lise öğrencilerinin haftalık genel ağ kullanım sürelerinin belirlenmesi	

3. ÖRNEK

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Millî Eğitim Bakanlığıyla iş birliği yaparak Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı'nı başlatmıştır. Programın amacı; toplumda spor yapma kültürünü geliştirmek, sporun geniş kitleler arasında yaygınlaşmasını sağlamak, spora başlama yaşındaki yetenekli çocukları tespit ederek uygun spor branşlarına yönlendirmektir. Program kapsamında her yıl ilkokul 3. sınıf öğrencilerine yönelik test ve ölçümler yapılmaktadır.

Bu program doğrultusunda A ilkokulunun 3. sınıf öğrencilerinin yeteneklerini belirlemek amacıyla yapılan ölçümlerden biri de öğrencilerin boylarıdır. Buna yönelik belirlenen araştırma soruları aşağıdaki gibidir.

a) Öğrencilerin boyları ne kadardır?

b) Erkek öğrencilerin boyu, kız öğrencilerin boyundan daha mı uzundur?

Buna göre oluşturulan soruları istatistiksel araştırma sorusunda olması gereken ölçütlere göre inceleyiniz. Sorularda ilgili ölçütlerde uygun olmayan ifadeler bulunduğunu düşünüyorsanız soruları yeniden oluşturunuz.

Çözüm

a) Bağlamda verilen amaç doğrultusunda "Öğrencilerin boyları ne kadardır?" şeklinde oluşturulan istatistiksel araştırma sorusunun ilgili ölçütlere göre incelenmesi aşağıdaki gibidir.

Araştırma Sorusu Ölçütleri	Sorunun İlgili Ölçütü Karşılayıp Karşılamadığına Dair Fikirleriniz
Amaç açık mıdır?	Amaç açıktır. Soru, öğrencilerin boylarını betimlemeye yönelik hazırlanan betimleyen istatistiksel araştırma sorusudur.
Araştırmaya değer midir?	Soru, boyları belirlenen öğrencilerin ilgili spor dallarına yönlendirilebilmesi bakımından düşünülürse araştırmaya değerdir.
İlgilenilen grup (evren) açıkça görülmekte midir?	İlgilenilen grup öğrencilerdir ancak soruda bu öğrencilerin tek bir okuldan mı belirleneceği, farklı sınıf seviyelerinden mi olacağı belli değildir. Bağlam doğrultusunda öğrencilerin okulu ve sınıf seviyeleri soruda belirtilmelidir. ("A ilkokulunda okuyan 3. sınıf öğrencileri" gibi)
Değişken açıkça görülmekte midir?	Değişken açıkça görülmektedir. Araştırma sorusundaki değişken, öğrencilerin boyudur.
Veri toplanarak cevaplanabilir mi?	Soru, birincil verilerle cevaplanabilecek yapıdadır. Öğrencilerin boyları ölçülerek verilerin toplanması durumu söz konusudur.
Değişebilirliği yansıtmakta mıdır?	Araştırma sorusundaki değişebilirlik, doğal ortamdan kaynaklı değişebilirlik türündedir.
Odaklanılan grup araştırma yapılmasına imkân vermekte midir?	Soru, öğrencilerin boylarının ölçülmesi ile elde edilen verilerin tamamını analiz etmeye yöneliktir.
Nicel veri toplamayı gerektirir mi?	Araştırma sorusunda toplanması beklenen veriler, öğrencilerin boy ölçüm verileridir. Boy, bir ölçüm sonucu elde edilen veri olduğundan nicel veridir.

"Öğrencilerin boyları ne kadardır?" sorusunun istatistiksel araştırma sorusu ölçütlerinin tamamını yansıtmadığı görülmektedir. Soru bu ölçütlere uygun olarak aşağıdaki gibi yeniden oluşturulabilir.

"A ilkokulunda öğrenim gören 3. sınıf öğrencilerinin santimetre cinsinden boyları nasıl bir eğilim göstermektedir?"

b) Bağlamda verilen amaç doğrultusunda "erkek öğrencilerin boyu, kız öğrencilerin boyundan daha mı uzundur?" şeklinde oluşturulan istatistiksel araştırma sorusunun ilgili ölçütlere göre incelenmesi aşağıdaki gibidir.

Araştırma Sorusu Ölçütleri	Sorunun İlgili Ölçütü Karşılayıp Karşılamadığına Dair Fikirleriniz
Amaç açık mıdır?	Amaç açıktır. Soru, kız ve erkek öğrencilerin boylarını karşılaştırmaya yönelik bir istatistiksel araştırma sorusudur ancak soru, erkek öğrencilerin boyunun kız öğrencilerin boyundan daha uzun olduğunu öne süren bir yapıdadır. Soru, eğilim kavramı kullanılarak daha uygun şekilde ifade edilebilir.
Araştırmaya değer midir?	Soru, boyları belirlenen kız ve erkek öğrencilerin ilgili spor dallarına yönlendirilebilmesi bakımından düşünülürse araştırmaya değerdir.
İlgilenilen grup (evren) açıkça görülmekte midir?	İlgilenilen grup öğrencilerdir ancak soruda bu öğrencilerin tek bir okuldan mı belirleneceği, farklı sınıf seviyelerinden mi olacağı belli değildir. Bağlam doğrultusunda öğrencilerin okulu ve sınıf seviyeleri soruda belirtilmelidir. Ayrıca hangi gruplarla çalışılacağı açık olmalıdır. Burada kızların ve erkeklerin boylarına odaklanıldığı için gruplar bellidir. ("A ilkokulunda okuyan 3. sınıf öğrencileri" gibi)
Değişken açıkça görülmekte midir?	Değişken açıkça görülmektedir. Araştırma sorusundaki değişken öğrencilerin boyudur.
Veri toplanarak cevaplanabilir mi?	Soru birincil verilerle cevaplanabilecek yapıdadır. Öğrencilerin boyları ölçülerek verilerin toplanması durumu söz konusudur. Ölçümün nasıl yapılacağı görülmemektedir. Örneğin soruya eklenecek "... kaç cm'dir?" ifadesi ölçümle ilgili fikir verecektir.
Değişebilirliği yansıtmakta mıdır?	Araştırma sorusundaki değişebilirlik, doğal ortamdan kaynaklı değişebilirlik türündedir.
Odaklanılan grup araştırma yapılmasına imkân vermekte midir?	Soru, kız ve erkek öğrencilerin boylarının karşılaştırılması için boy ölçümü ile elde edilen verilerin tamamını analiz etmeye yöneliktir.
Nicel veri toplamayı gerektirir mi?	Araştırma sorusunda toplanması beklenen veriler, öğrencilerin boy ölçüm verileridir. Boy, bir ölçüm sonucu elde edilen veri olduğundan nicel veridir.

"Erkek öğrencilerin boyu, kız öğrencilerin boyundan daha mı uzundur?" sorusunun istatistiksel araştırma sorusu ölçütlerinin tamamını yansıtmadığı görülmektedir. Soru, bu ölçütlere uygun olarak aşağıdaki gibi yeniden oluşturulabilir.

"A ilkokulunda öğrenim gören 3. sınıf öğrencilerinin boyları, cinsiyete göre santimetre cinsinden nasıl farklılık göstermektedir?"

3. Sıra Sizde

- Dörder kişilik gruplara ayrılarak tabloda verilen örneği inceleyiniz.
- Tabloda yer alan diğer araştırma sorularını istatistiksel araştırma sorularında bulunması gereken ölçütlere göre inceleyiniz ve fikirlerinizi yazınız.
- Fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.
- Sınıf içi tartışma sonrası uzlaşarak düzenlediğiniz istatistiksel araştırma sorularını yeniden yazınız.

Araştırma Sorusu	Araştırma Sorusunun İstatistiksel Araştırma Sorusunda Bulunması Gereken Ölçütleri Karşılayıp Karşılamadığına Dair Fikirleriniz	Ölçütler Doğrultusunda Düzenlenmiş Araştırma Sorusu
Lise öğrencileri okul kantininde ne kadar harcama yapmaktadır?	• Amaç açıktır. Soru, lise öğrencilerinin harcama miktarlarını belirlemeye yönelik betimleyen bir araştırma sorusudur. Ancak lise öğrencilerinin ne kadarlık zaman diliminde harcama yaptıklarının incelendiği belirtilmelidir. • Soru araştırmaya değerdir. Örneğin öğrencilerin harcadıkları para miktarı belirlenerek finansal okuryazarlık becerilerini geliştirmeye yönelik bir çalışma yapılabilir. • İlgilenilen grup lise öğrencileridir ancak ilgilenilen grubun bir okulda, bir ilçede veya bir ilde öğrenim gören öğrenciler olup olmadığı belli değildir. • Değişken, harcanan para miktarıdır. • Soru, birincil verilerle cevaplanabilecek yapıdadır. • Araştırma sorusundaki değişebilirlik, doğal ortamdan kaynaklı değişebilirlik türündedir. • Soru, lise öğrencilerinin harcadığı para miktarını belirlemek amacıyla elde edilen verilerin tamamını analiz etmeye yöneliktir. • Öğrencilerin harcadığı para miktarı, sayılarak elde edilen bir veri olduğundan nicel veridir.	Altındağ ilçesinde öğrenim gören lise öğrencilerinin okul kantininde bir hafta boyunca yaptıkları harcamalar nasıl eğilim göstermektedir?
Maraton koşularında ilk üç dereceyi elde eden atletlerin koşuyu tamamlama süreleri yaklaşık kaç dakikadır?		
Dizel motorlu araçların karbon salınımı ile benzinli motorlu araçların karbon salınımı arasında ne kadar fark vardır?		
Kız öğrencilerin matematik dersi notları, erkek öğrencilerin matematik dersi notlarından daha yüksek midir?		

4. Sıra Sizde

Dörder kişilik gruplara ayrılınız ve aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Elektrik enerjisi üretiminde dengeli bir yapı sağlamak amacıyla yenilenebilir enerji kaynakları payının ve kaynak çeşitliliğinin artırılması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda Türkiye Yüzyılı projelerinden biri olan "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA)" yatırım modeliyle Türkiye hem kaynak bakımından hem de teknolojinin yerlileştirilmesi konusunda önemli bir adım atmıştır. Yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye; 2021 yıl sonu verilerine göre yenilenebilir enerjide kurulu güç bakımından Avrupa'da 5, dünyada 12. sıraya yükselmiştir.

Grupça yenilenebilir enerji kaynakları bağlamı doğrultusunda tek nicel değişkenli veri toplamayı gerektiren birer adet betimleyen ve karşılaştıran istatistiksel araştırma sorusu yazınız.

Betimleyen istatistiksel araştırma sorunuz:

Karşılaştıran istatistiksel araştırma sorunuz:

İstatistiksel araştırma sorusu ölçütleri kontrol formuna ulaşmak için karekodu okutunuz.

Yazdığınız istatistiksel araştırma sorularını diğer gruplara sununuz. Gruplar tarafından sunulan her iki istatistiksel araştırma sorusunu, karekoddaki kontrol formunda yer alan istatistiksel araştırma sorularında bulunması gereken ölçütler açısından ayrı ayrı inceleyiniz. İnceleme sonunda fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız ve uzlaştığınız istatistiksel araştırma sorularını yazınız.

Sınıfça uzlaştığınız betimleyen istatistiksel araştırma sorunuz:

Sınıfça uzlaştığınız karşılaştıran istatistiksel araştırma sorunuz:

b) Grupça ilgi duyduğunuz, merak ettiğiniz nicel veri toplamayı gerektiren bir gerçek yaşam durumu belirleyiniz. Belirlediğiniz bağlamda tek nicel değişkenli veri toplamayı gerektiren birer adet betimleyen ve karşılaştıran istatistiksel araştırma sorusu yazınız.

Betimleyen istatistiksel araştırma sorunuz:

Karşılaştıran istatistiksel araştırma sorunuz:

Yazdığınız istatistiksel araştırma sorularını diğer gruplara sununuz. Gruplar tarafından sunulan her iki istatistiksel araştırma sorusunu, karekoddaki kontrol formunda yer alan istatistiksel araştırma sorularında bulunması gereken ölçütler açısından ayrı ayrı inceleyiniz. İnceleme sonunda fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız ve uzlaştığınız istatistiksel araştırma sorularını yazınız.

Sınıfça uzlaştığınız betimleyen istatistiksel araştırma sorunuz:

Sınıfça uzlaştığınız karşılaştıran istatistiksel araştırma sorunuz:

Nicel Veri Toplama Planı Yapma, Verileri Toplama ve Analize Hazır Hâle Getirme

PISA [Programme for International Student Assessment (Pırogrem for İntırneyşinıl Sıtudınt Essısmınt)] adıyla bilinen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı; üç yılda bir yapılan, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazandığı bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırmadır. PISA'nın temel amacı, öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamlarında kullanma becerilerini ölçmektir. PISA araştırmasında okuma becerileri, matematik ve fen bilimlerine yönelik başarı testlerinin yanı sıra anketler de uygulanmaktadır. Başarı testinden elde edilen sonuçlarla anket sonuçları birlikte değerlendirilerek ülke raporları hazırlanmaktadır.



Görsel 6.1: *Ödev yapan öğrenciler*

2022 PISA Türkiye Raporu'na ulaşmak için karekodu okutabilirsiniz.

Bir lisenin rehberlik servisi, 2022 PISA Türkiye Raporu'nda ev ödevi yapmak için harcanan süreye ilişkin sonuçları incelemiştir. PISA Türkiye Raporu'ndan yola çıkan rehberlik servisi, kendi okulunda öğrencilerin ev ödevi yapmak için ayırdıkları günlük süreleri belirlemek için bir araştırma yapmaya karar vermiştir. Bu doğrultuda rehberlik servisinin oluşturduğu araştırma soruları aşağıdaki gibidir.

A lisesindeki öğrencilerin ev ödevi yapmak için ayırdığı günlük süre, dakika cinsinden nasıl bir eğilim göstermektedir?

A lisesindeki öğrencilerin ev ödevi yapmak için ayırdığı süre, cinsiyetlerine göre dakika cinsinden nasıl farklılaşmaktadır?

A lisesinde toplam 1670 öğrenci öğrenim görmektedir. A lisesi rehberlik servisi, öğrencilerin ev ödevi yapmak için ayırdığı günlük süreyi belirlemeye yönelik yapacağı araştırmada veri toplamaya başlamadan önce veri toplama planı oluşturmak için nelere dikkat etmelidir?

İstatistiksel araştırma sürecinde ikinci aşama, oluşturulan istatistiksel araştırma sorusu veya soruları doğrultusunda veri toplama planı yapma ve verileri analize hazır hâle getirme aşamasıdır. Veri toplama planı yapma ve verileri analize hazır hâle getirme süreci, oluşturulan istatistiksel araştırma sorularına göre yapılmalıdır.

Veri toplama planı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı özellikler Bilgi Görseli 6.2'de yer almaktadır.

1 Araştırma sorularına cevap bulmayı sağlayacak veri toplama araçları belirlenmelidir.

İstatistiksel araştırma sürecinde istatistiksel araştırma soruları oluşturulduktan sonra araştırmacıların araştırma sorularını cevaplamaya yönelik veri toplama araçlarını belirlemesi gerekmektedir. Bu doğrultuda araştırmacılar, birincil verilerle çalışacaksa araştırma soruları doğrultusunda anket oluşturabilir veya görüşmeler yapabilir. Ayrıca başka araştırmacılar tarafından geliştirilen anket, ölçek veya görüşme formlarını kullanabilir. İkincil verilerle çalışılacaksa başka araştırmacılar tarafından elde edilen veri setlerine ulaşabilir.

2 Evren ve örneklem belirlenmelidir.

Evren ve evreni yansıtacak örneklemin belirlenmesi, veri toplama planında dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Bir ilçedeki öğrencilerin boylarının araştırıldığı bir çalışmada ilçedeki tüm öğrenciler evreni oluşturur. Bu çalışmada zaman, maliyet, iş gücü gibi nedenlerden dolayı evrenin tamamına ulaşmak zor olacağından ilçedeki öğrenciler arasından belli ölçütlere göre belirlenen öğrenciler örneklemi oluşturur. Örneklem belirlenerek ilçedeki tüm öğrencilerin boylarının nasıl bir eğilim gösterdiğini görebilmek için örneklemin örneklem belirleme ölçütlerine göre seçilmesi önemlidir.

Örneklem

Evren içinden belirlenen ve evreni temsil etmesi için verilerin toplandığı kümedir.

3 Rastgelelik sağlanmalıdır.

Bir evrenden örneklem seçerken evrendeki her elemanın seçilme olasılığının eşit olmasını sağlamak önemlidir. Bu şekilde oluşturulmuş örneklemin evreni temsil etme gücü daha yüksektir.

Rastgelelik

Bir evrenden eleman seçimi yapılırken her elemanın eşit olasılıkla seçilmesi durumudur.

4 Değişkenler belirlenmelidir.

İstatistiksel bir araştırmada araştırılmak istenen değişkeni etkileyecek farklı değişkenlerin neler olduğunu belirlemek gerekir. Genellikle deney yoluyla veri toplanan çalışmalarda bu duruma dikkat edilir.

5 Verilerin nerede, ne zaman, nasıl ve kimler tarafından toplanacağı belirlenmelidir.

Verilerin nerede, hangi zaman diliminde, ne kadar sürede, kimler tarafından ve ne şekilde (yüz yüze, çevrim içi) toplanacağı belirlenmelidir.

6 Verilerin nasıl kaydedileceği belirlenmelidir.


Verilerin hangi araçlarla, ne şekilde kayıt altına alınacağı belirlenmelidir.

7 Verilerin gizliliğine dikkat edilmeli, dürüst ve nesnel olunmalıdır.

Veri toplama aşamasında kişisel verilerin korunmasına dikkat edilmeli, kişilerin haklarını ihlal edecek veriler toplanmamalıdır. İnsanların ve diğer canlıların sağlığını tehlikeye sokacak çalışmalar yapılmamalıdır. Araştırma için gerekliyse ilgili makamlardan resmî izin alınmalıdır. Ayrıca araştırmaya katılacak reşit olmayan katılımcının yasal vasisinden onay alınmalıdır. Araştırmacı veriler üzerinde oynama yapmamalı ve beklentisi doğrultusunda verileri değiştirmemelidir.

Bilgi Görseli 6.2: *Veri toplama planında bulunması gereken özellikler*

İstatistiksel araştırmalarda örneklemin evreni temsil etmesi gerekmektedir. Evrenin tamamına ulaşmak zaman, maliyet ve iş gücü bakımından zor olabilir. Ancak evren içinden örneklem belirlenirken rastgeleliğin sağlanması önemlidir çünkü belirlenecek örneklemden elde edilecek sonuçların evreni temsil etmesi gerekmektedir. Şekil 6.1'de rastgele örnekleme temsil edilmektedir.



Şekil 6.1: *Rastgele örnekleme*

Rastgeleliği sağlamanın en kolay yollarından biri basit rastgele örneklemedir. Basit rastgele örnekleme, bir evrenden evreni temsil edecek bir örneklem grubu belirleme yöntemidir. Basit rastgele örneklemede örneklem için seçilen her birimin seçilme olasılığı eşittir. Rastgeleliği sağlamak için izlenebilecek yöntemler bulunmaktadır. Örneğin evrende yer alan elemanların isimlerinin yazılı olduğu kâğıtlar veya elemanlara numara verilerek bu numaraların yazılı olduğu kâğıtlar bir torbaya konur. Örneklem için belirlenen sayı kadar kâğıt çekilerek örneklem belirlenebilir.

3. Uygulama

İstatistiksel Araştırma Sorusu Oluşturma ve Veri Toplama Planı Hazırlama

Dörder kişilik gruplara ayrılınız ve aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Grup olarak ilgi duyduğunuz, merak ettiğiniz nicel veri toplamayı gerektiren bir gerçek yaşam durumu belirleyiniz.

   Belirlediğiniz nicel veri toplamayı gerektiren gerçek yaşam durumu:

2. Grup olarak belirlediğiniz nicel veri toplamayı gerektiren gerçek yaşam durumunu diğer gruplarla paylaşınız (Her grubun belirlediği gerçek yaşam durumu, liste hâlinde öğretmen tarafından tahtaya yazılacaktır.).

3. Tahtada yazılı olan nicel veri toplamayı gerektiren gerçek yaşam durumlarından birini sınıfça oylama yoluyla belirleyiniz.

   Sınıfça belirlenen nicel veri toplamayı gerektiren gerçek yaşam durumu:

4. Grubunuzla sınıfça belirlenen nicel veri toplamayı gerektiren gerçek yaşam durumuna yönelik tek nicel değişkenli veri toplamayı gerektiren birer adet betimleyen ve karşılaştıran istatistiksel araştırma sorusu yazınız. Sorularınızı yazarken istatistiksel araştırma sorusu ölçütlerini dikkate alınız.

   Betimleyen istatistiksel araştırma sorunuz:

   Karşılaştıran istatistiksel araştırma sorunuz:

5. Grupça oluşturduğunuz soruları diğer gruplara sununuz. Diğer grupların araştırma sorularının istatistiksel araştırma sorusu kriterlerini taşıyıp taşımadığını karekodda verilen kontrol listesi yardımıyla inceleyiniz ve gruplarla tartışınız.

İstatistiksel araştırma sorusu ölçütleri kontrol formuna ulaşmak için karekodu okutunuz.

6. Sınıfça üzerinde tartışıp uzlaştığınız araştırma sorularını yazınız. İlk yazdığınız sorularla sınıfça uzlaşarak yazdığınız sorular arasındaki benzerlik ve farklılıkları değerlendiriniz.

Sınıfça uzlaştığınız betimleyen istatistiksel araştırma sorusu:

Sınıfça uzlaştığınız karşılaştıran istatistiksel araştırma sorusu:

7. Araştırma sorularınız doğrultusunda grubunuzla veri toplama planınızı hazırlayınız.

Veri Toplama Planı

8. Hazırladığınız veri toplama planını diğer gruplarla paylaşınız. Diğer grupların paylaştığı planları ise karekoddaki kontrol formunda yer alan veri toplama planında bulunması gereken özellikler açısından inceleyiniz. İnceleme sonunda fikirlerinizi diğer gruplarla paylaşarak tartışınız. Tartışma sonunda sınıfça uzlaştığınız tek bir veri toplama planı oluşturunuz.

Sınıfça uzlaştığınız veri toplama planı:

Veri toplama planı kontrol formuna ulaşmak için karekodu okutunuz.

9. Oluşturduğunuz veya hazır edindiğiniz veri toplama aracı ile verilerinizi toplayınız.

10. Elektronik tablolama programına veya istatistik yazılımına topladığınız verilerin girişini yapınız ve bu verileri 7. Uygulama bölümünde kullanmak için saklayınız.

4. ÖRNEK

Okulda ve iş yerinde gün boyu fiziksel ve bilişsel olarak zinde kalabilmenin verimlilik açısından önemi araştırmacılar tarafından ifade edilmektedir. Araştırmalar; bir önceki gün uykuda geçirilen sürenin, sabah tüketilen besinlerin ve bir önceki gün yapılan fiziksel etkinliklerin kişilerin gün içerisinde zinde olma durumlarını etkilediğini göstermektedir.

Bir ilçenin gençlik ve spor ilçe müdürlüğü, gençlere yönelik fiziksel etkinlik çalışmaları başlatmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda ilçedeki bir lisenin beden eğitimi öğretmenleriyle iş birliği yaparak okuldaki 9. sınıf öğrencilerinin fiziksel etkinlik yapma durumlarını incelemek istemektedir. Bunun için öncelikle öğrencilerin günlük fiziksel etkinlik sürelerini belirlemeyi planlamaktadır. A lisesinde öğrenim gören 9. sınıf öğrenci sayısı 620'dir. Gençlik ve spor ilçe müdürlüğünce kurulan ekip, gerçekleştirilecek araştırma doğrultusunda araştırma sorularını aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

- "A lisesinde öğrenim gören 9. sınıf öğrencilerinin haftalık fiziksel etkinlik süreleri, dakika cinsinden nasıl bir eğilim göstermektedir?"
- "A lisesinde öğrenim gören 9. sınıf öğrencilerinin yaklaşık haftalık fiziksel etkinlik süreleri, cinsiyete göre dakika cinsinden nasıl farklılık göstermektedir?"
- Gençlik ve spor ilçe müdürlüğü toplam 100 öğrenciye ulaşarak veri toplamak istemektedir.
- Buna göre veri toplama planında bulunması gereken özellikleri dikkate alarak araştırmaya yönelik bir veri toplama planı hazırlayınız.

Çözüm

Araştırmanın amacı ve veri toplama planında bulunması gereken özellikler dikkate alınarak veri toplama planı aşağıdaki gibi oluşturulabilir.

1. Adım: Araştırma sorularına cevap bulmayı sağlayacak veri toplama aracının belirlenmesi

Araştırmada biri betimleyen, diğeri karşılaştıran iki adet istatistiksel araştırma sorusu bulunmaktadır. Araştırma, birincil veriler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu amaçla araştırma sorularına cevap almaya yönelik bir anket, veri toplama aracı olarak kullanılabilir. Araştırma soruları doğrultusunda öğrencilerin cinsiyetlerinin ve haftalık fiziksel etkinlik sürelerinin öğrenilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda anket aşağıdaki gibi oluşturulabilir.

Cinsiyetiniz: Kız ( ) Erkek ( )

Rutin hareketleriniz dışında haftada kaç dakika fiziksel etkinlik (düzenli spor, dans, egzersiz vb.) yapıyorsunuz?

Cevabınız:

2. Adım: Evren ve örneklemin belirlenmesi

Araştırma, A lisesinde öğrenim gören 9. sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilecektir. Bu nedenle araştırmanın evreni bu okulda 9. sınıf seviyesinde öğrenim gören öğrencilerin tamamıdır. Örneklemi ise bu öğrenciler arasından belirlenen 100 öğrencidir.

3. Adım: Rastgeleliğin sağlanması

İstatistiksel araştırmalarda örneklemin evreni temsil etmesi gerekmektedir. Okulda bulunan tüm öğrencilere anketi uygulamak zaman, maliyet ve iş gücü bakımından mümkün olmayabilir ancak 620 öğrenci içinden örneklem olarak 100 öğrencinin belirlenmesinde rastgeleliğin sağlanması önemlidir. Zira seçilecek öğrencilerden elde edilecek sonuçların tüm okuldaki öğrencileri temsil etmesi gerekmektedir. Öğrencilerin isimlerinin veya numaralarının yazılı olduğu kâğıtların bir torbaya konulması ve bu kâğıtlardan 100 tanesinin çekilmesiyle örneklem belirlenebilir.

4. Adım: Değişkenlerin belirlenmesi

Bu araştırmada değişken, fiziksel etkinlik süresidir. Veriler toplanırken bu değişkeni etkileyecek farklı değişkenler bulunmamaktadır.

5. Adım: Verilerin nerede, ne zaman, nasıl ve kimler tarafından toplanacağının belirlenmesi

Veriler, yüz yüze uygulama ile anket formlarının öğrencilere dağıtılması ve doldurulması yoluyla toplanabileceği gibi dijital anket araçları ile de toplanabilir. Veriler yüz yüze toplanacaksa bir araştırmacı tarafından öğrencilere araştırmanın amacı ve uygulama süreci ile ilgili bilgi verilir. Dijital araçlarla veri toplanacaksa bir yönergeyle araştırmanın amacı ve süreç hakkında bilgi verilir. Örneklemdeki öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak verilerin toplanması planlanabilir.

6. Adım: Verilerin kaydedilmesi


Veriler elektronik tablolama programına, istatistik yazılımlarına kaydedilebilir.

7. Adım: Verilerin gizliliğinin sağlanması, nesnel ve dürüst olunması

Veri toplama aşamasında kişisel verilerin korunmasına dikkat edilmeli, kişilerin haklarını ihlal edecek verilerin toplanmasından kaçınılmalıdır. Ayrıca toplanan veriler araştırmacının beklentileri doğrultusunda değiştirilmemeli, veriler üzerinde değişiklik yapılmamalıdır.

5. Sıra Sizde

T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün hazırladığı Türkiye İsraf Raporu'nun "Enerji Tüketimi ve İsrafı" bölümünde bireylerin evde elektrik tasarrufu sağlamaya yönelik davranışları ele alınmıştır. Bu doğrultuda elde edilen sonuçlar (%) aşağıdaki grafikte yer almaktadır.



Grafikte elektrik tasarrufuna ilişkin tüm davranışları her zaman gerçekleştirme oranının %50'nin oldukça altında olduğu görülmektedir.

TÜİK verilerine göre 2021 yılında Türkiye'de kişi başı elektrik tüketimi yıllık 3386 kilovatsaattir. Bu bilgiden yola çıkarak okulunuzdaki öğrencilerin evlerindeki yıllık elektrik tüketim miktarını belirlemeye yönelik bir araştırma tasarladığınızı varsayınız. Araştırma sorunuz "..... Lisesinde öğrenim gören öğrencilerin evlerindeki yıllık elektrik tüketim miktarı kilovatsaat cinsinden nasıl bir eğilim göstermektedir?" olsun (Boşluğa okulunuzun adını yazınız.).

Bu araştırma sorusu doğrultusunda nasıl bir veri toplama planı hazırlarsınız? Dörder kişilik gruplara ayrılınız. Aşağıda adımları verilen veri toplama planında bulunması gereken özellikleri dikkate alarak bir veri toplama planı yazınız.

Veri Toplama Planınız

1. Adım: Araştırma sorularına cevap bulmayı sağlayacak veri toplama aracının belirlenmesi veya oluşturulması

2. Adım: Evren ve örneklemin belirlenmesi

3. Adım: Rastgeleliğin sağlanması

4. Adım: Değişkenlerin belirlenmesi

5. Adım: Verilerin nerede, ne zaman, nasıl ve kimler tarafından toplanacağının belirlenmesi

6. Adım: Verilerin kaydedilmesi

7. Adım: Verilerin gizliliğinin sağlanması, nesnel ve dürüst olunması

Oluşturduğunuz veri toplama planını diğer gruplarla paylaşarak tartışınız. Üzerinde uzlaştığınız veri toplama planının son hâlini tekrar yazınız.

Üzerinde Uzlaştığınız Veri Toplama Planınız

1. Adım: Araştırma sorularına cevap bulmayı sağlayacak veri toplama aracının belirlenmesi veya oluşturulması

2. Adım: Evren ve örneklemin belirlenmesi

3. Adım: Rastgeleliğin sağlanması

4. Adım: Değişkenlerin belirlenmesi

5. Adım: Verilerin nerede, ne zaman, nasıl ve kimler tarafından toplanacağının belirlenmesi

6. Adım: Verilerin kaydedilmesi


7. Adım: Verilerin gizliliğinin sağlanması, nesnel ve dürüst olunması

Kontrol Noktası

İstatistiksel araştırma sürecinde veri toplamaya başlamadan önce verinin nasıl toplanacağına dair planlama yapmak önemlidir.

Nicel Veriye Dayalı İstatistiksel Araştırmalarda Veri Analizi Yapma ve Sonuçları Yorumlama

Lise öğrencisi Meltem, protein ve protein kaynakları konulu bir araştırma ödevi hazırlamaktadır. Araştırma raporunda aşağıdaki ifadeler yer almaktadır.



Görsel 6.2: *Bazı ülkelerde kişi başı tüketilen yıllık ortalama balık miktarı (kg)*

Proteinler insan vücudu için oldukça önemlidir. Dengeli bir şekilde tüketilen proteinin kaslar için olduğu kadar sinir sistemi için de önemi büyüktür. Protein kaynakları, bitkisel ve hayvansal protein kaynakları şeklinde ikiye ayrılmaktadır.

Hayvansal kaynaklı proteinlerden biri de balıktır. Özellikle Omega-3 yağı bakımından zengin olan balıklar başta cilt, kalp ve sinir sistemi olmak üzere vücut için oldukça faydalıdır.

Bu bilgilerden yola çıkan Meltem, bazı ülkelerde kişi başı tüketilen yıllık ortalama balık miktarını merak etmiş ve araştırması doğrultusunda Görsel 6.2'de yer alan bilgilere ulaşmıştır.

Meltem görseldeki bilgilere nasıl ulaşıldığını merak etmektedir. Sizce görselde yer alan bilgiler nasıl elde edilmiş olabilir? Sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.


4. Uygulama

Veri Analizi Yapma

Aşağıdaki soruları verilen bilgilere göre cevaplayınız.

Türkiye'de iç su balıkları üretim çalışmaları "Türkiye İç Sularını Balıklandırma Projesi" kapsamında 1981 yılında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünce başlatılmıştır. Sazan balığı üretimiyle başlatılan çalışmalar, tatlı su kaynaklarına özgü farklı tür balıkların üretimiyle devam etmiştir. Enstitüde üretilen sazanların yaklaşık %90'ı yaklaşık 50 il, 500 göl ve göletin balıklandırılmasında kullanılmaktadır.

İç sularda yapılan balıklandırma çalışmaları için üretilen balık miktarı ile avlanan balık miktarını incelemeye yönelik araştırma yapan bir su ürünleri mühendisinin araştırmasında ulaştığı verilerden biri de 2022 yılında avlanan sazan balığı miktarıdır.




Grafik 1


1. Su ürünleri mühendisi Türkiye'de 2022 yılında 71 ilde avlanan sazan balığı miktarlarına TÜİK verilerinden ulaşmış ve bu verileri analiz etmek için istatistik yazılımına verilerin girişini yapmıştır. Girişini yaptığı verilerle Grafik 1'de yer alan nokta grafiğini oluşturmuştur.

Grafik 1'deki dağılımı inceleyen su ürünleri mühendisi, bu dağılıma bakarak 2022 yılında Türkiye'nin 71 ilinde avlanan sazan balığı miktarı ile ilgili ne gibi bilgilere ulaşmış olabilir? Sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.

2. Su ürünleri mühendisi istatistik yazılımıyla Grafik 1'deki dağılımdan yola çıkarak Grafik 2 ve Grafik 3'ü oluşturmuştur.




Grafik 2




Grafik 3

Su ürünleri mühendisi, Grafik 2 ve Grafik 3'te yer alan verilerden hareketle 2022 yılında Türkiye'nin 71 ilinde avlanan sazan balığı miktarı ile ilgili ne tür bilgilere ulaşmış olabilir? Bu grafikleri Grafik 1 ile karşılaştırdığınızda iki grafik arasında ne gibi farklılıklar gördüğünüzü sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.

3. Grafik 4 ve Grafik 5'i inceleyiniz.




Grafik 4



Grafik 5

Grafik 4 ve Grafik 5'te Türkiye'nin 71 ilinde avlanan sazan balığı miktarının iki farklı şekilde gösterimi yer almaktadır. İki grafiği karşılaştırarak nelerin farklı göründüğünü belirleyiniz. Bu farklılıklar, grafiklerin sunduğu bilgileri nasıl farklılaştırmaktadır? Sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.

4. Grafik 4 ve Grafik 5'teki bilgilerle sütun grafiğindeki bilgiler arasında ne gibi benzerlik ve farklılıklar bulunmaktadır? Sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.



Veri görselleştirmede kullanılan araçlardan biri histogramdır. Histogram, verilerin belli aralıklardaki sıklığını sütunlarla gösteren bir grafiktir.

Grafik 6.3'te örnek bir histogram grafiği yer almaktadır.

Grafik 6.3'te histogram grafiğinin yatay ekseninde yer alan matematik dersi notlarının hangi sıklıkla yirmişer puanlık aralıklarda gözlendiği görülmektedir. Dikey eksen, her bir aralıkta gözlenen veri sayısını (frekans) göstermektedir.

Grafik 6.3: *Bir grup öğrencinin matematik dersi notlarına ait histogram grafiği*


5. Uygulama

Veri Analizi Yapma

Aşağıdaki soruları verilen bilgilere göre cevaplayınız.


Araştırmacılar hayat döngüsünü anlayabilmek için canlıları gözlemleyerek sınıflandırmakta ve canlıların özelliklerini belirlemek için çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar, canlıların davranışları ve gelişimleri hakkında insanlara bilgiler sunmaktadır.

Bir grup araştırmacı, memeli türlerinin günlük uyku sürelerinin nasıl eğilim gösterdiğini görebilmek için 24 memeli türünün günlük uyku sürelerini belirlemiştir. Araştırmacıların elde ettiği verilerle oluşturduğu nokta grafiği, Grafik 1'de yer almaktadır.



Grafik 1


Araştırmacılar Grafik 1'deki verileri analiz etmek için Grafik 2'de görülen veri görselleştirme aracını kullanmıştır.



Grafik 2

Grafik 2'de yer alan veri görselleştirme aracı, dağılımın hangi değerlerini temsil ediyor olabilir? Sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.

Dağılımları karşılaştırmak için kullanılan farklı bir görselleştirme aracı da kutu grafiğidir. Kutu grafiği; bir dağılımın en küçük (minimum) değer, alt çeyrek değer (Ç1 veya %25'lik dilim), ortanca (Ç2 veya %50'lik dilim), üst çeyrek değer (Ç3 veya %75'lik dilim) ve en büyük (maksimum) değerden oluşan beş sayılı özetinin görselleştirilmesidir. Başka bir deyişle beş sayılı özet verileri ile çeyrekler oluşturulur (Her grup verilerin yaklaşık %25'ini içerir.) ve ardından bu değerler kutu grafiği çizmek için kullanılır. Beş sayılı özetle oluşturulan bir kutu grafiği örneği Grafik 6.4'te yer almaktadır.



Grafik 6.4: *Kutu grafiği üzerinde beş sayılı özet değerlerinin gösterilmesi*


Çeyreklikleri bulmak için veriler sıralanır ve sıralanan veriler her grupta yaklaşık aynı sayıda veri noktası olacak şekilde dört parçaya bölünür. Verilerin yaklaşık %25'i alt çeyreklik (Ç1) değerinin, yaklaşık %50'si ikinci çeyreklik (Ç2 aynı zamanda ortanca) değerinin ve yaklaşık %75'i üst çeyreklik (Ç3) değerinin altındadır. Kutu grafiğinde üst uç değer (maksimum) ile alt uç değer (minimum) arasındaki fark, açıklığı vermektedir. Açıklık, verilerin yayılımı hakkında fikir veren ve yaygın olarak kullanılan bir yayılım ölçüsü olsa da aykırı değerlerden etkilenmektedir. Bu nedenle aykırı değerlerden daha az etkilenen çeyrekler açıklığının kullanılması açıklığa göre daha güvenilir bilgi sunmaktadır. Çeyrekler açıklığı, sıralanmış bir veri dizisinin ortanca etrafında toplanmış %50'sini diğer bir deyişle Ç3 ile Ç1 aralığını (Ç3-Ç1) gösteren bir yayılım ölçüsüdür.

6. Uygulama

Veri Analizi Yapma

Memeli türlerinin gelişim özelliklerinin incelendiği araştırmada araştırmacılar, 27 memeli türünün boyunu da kaydetmiştir. Araştırmacıların elde ettiği verilerle oluşturduğu aşağıdaki grafiklere göre soruları cevaplayınız.


1. Araştırmacıların verileri analiz etmek için kullandığı veri görselleştirme araçlarından biri Grafik 1'de görülmektedir.



Grafik 1

Grafik 1'deki veri görselleştirme aracında verilen değerler, dağılımın hangi değerlerini temsil ediyor olabilir? Sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.


2. Araştırmacıların dağılımın ortalama mutlak sapma değerini ve bu değerden yola çıkarak dağılımın nasıl yayıldığını görebilmek için kullandığı veri özetleme aracı Grafik 2'de verilmiştir.



Grafik 2

Grafik 2'deki veri özetleme aracında verilen ortalama mutlak sapma değeri, nokta grafiği ile verilen dağılımın hangi değerlerini temsil ediyor olabilir? Sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.

3. Araştırmacıların dağılımın nasıl yayıldığını görebilmek için kullandığı bir diğer veri özetleme aracı Grafik 3'te görülmektedir.



Grafik 3


Grafik 2 ve Grafik 3'ü karşılaştırarak iki veri özetleme aracının sunduğu bilgileri düşününüz. Her iki veri görselleştirme aracında oluşan boyalı alanların sınırlarının yaklaşık olarak hangi değerler arasında olduğunu inceleyiniz. Sınırlar arasında kalan alanların hangi bilgileri sunduğunu ve bölge sınırları arasındaki farkın nedenlerini sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.

Ortalama mutlak sapma ve standart sapma ölçüleri, verilerin yayılımına ilişkin bilgi verir ve verileri ortalama ile karşılaştırır. Ortalama mutlak sapma, bir dağılımdaki her bir verinin ortalamadan ne kadar saptığına odaklanır. Bu sapmaların mutlak değerlerinin ortalaması ortalama mutlak sapma değerini verir. Ortalama mutlak sapma, dağılımdaki verilerin nasıl yayıldığına ilişkin bilgi verse de dağılımın bütününü temsil etmekte yetersiz kalabilir. Bu noktada verilerin nasıl yayıldığını belirleyebilmek için dağılımdaki tüm verileri dikkate alarak daha hassas bir özetleme aracı olan standart sapma kullanılabilir. Standart sapma, verilerin ortalamaya göre yayılımını gösteren istatistiksel bir ölçüdür. Standart sapma aralığı, ortalama mutlak sapma aralığına göre daha fazla değeri kapsar ve ortalama sapma aralığından daha güvenilirdir.

5. ÖRNEK

Atletizm sporu için Olimpiyat Oyunları'ndan sonraki en önemli organizasyon olarak görülen ve iki yılda bir düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'na 200'ün üzerinde ülke katılmaktadır.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nın erkekler 100 metre koşusuna katılmak isteyen bir ülkenin atletizm federasyonu, koşuya hazırlanacak erkek atletlerin performanslarını değerlendirebilmek için 2023 yılındaki şampiyonada bu kategoride yarışmış atletlerin performanslarını incelemek istemektedir. Bu amaçla 2023 yılında yapılan Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre koşusunda yarışan 55 atletin birinci tur elemelerinde elde ettiği dereceleri kaydetmiştir. Şampiyonada birinci olan atletin derecesi 9,86 saniye, sonuncu olan atletin derecesi 11,58 saniyedir. Elde edilen verilere ait nokta grafiği aşağıda yer almaktadır.



Atletizm federasyonu, 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 100 metre koşusuna katılan 55 atletin derecelerinden yola çıkarak aşağıdaki soruları hazırlamıştır. Hazırlanan soruları uygun görselleştirme ve/veya özetleme araçlarını seçerek cevaplayınız.

a) 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 100 metre yarışmasına katılan atletlerin koşu dereceleri arasında en yüksek performans ile en düşük performans arasındaki fark kaç saniyedir?

b) 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 100 metre yarışmasına katılan atletlerin koşu dereceleri saniye cinsinden nasıl bir eğilim göstermektedir?

c) 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 100 metre yarışmasına katılan atletlerin koşu derecelerine ait veri dağılımının merkezine yığılan performans dereceleri hangi aralıklarda yoğunlaşmaktadır?

ç) 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 100 metre yarışmasına katılan atletlerin dereceleri 0,2 santisaniye zaman aralıklarında nasıl yoğunlaşmaktadır?


d) 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 100 metre yarışmasına katılan atletlerin elde ettiği dereceler, tüm atletlerin derecelerinin ortalama değerine göre nasıl yayılım göstermektedir?

e) Bulgularınızdan hareketle farklı bir organizasyon olan Olimpiyat Oyunları 100 Metre Atletizm Müsabakaları'na katılan erkek atletlerin koşu derecelerinin eğilimi hakkında ne söyleyebilirsiniz? 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılan erkek atletlerin derecelerinin eğilimiyle benzerlik ve farklılıklarına yönelik ne gibi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

İstatistik yazılımı ile ilgili videoya ulaşmak için karekodu okutunuz.

Çözüm


a) 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 100 metre yarışmasına katılan atletlerin koşu dereceleri değerlendirilirken üst uç değer olan en yüksek performans ile alt uç değer olan en düşük performans arasındaki farkı belirlemek için yayılım ölçülerinden açıklık değerine bakılması gerekmektedir. Grafik 1'de atletlerin en düşük ve en yüksek performans değeri görülmektedir.



Grafik 1


Grafik 1'de görüldüğü üzere atletler içinde en yüksek performansı göstererek birinci olan atletin derecesi 9,86 saniye iken en düşük performansı göstererek sonuncu olan atletin derecesi 11,58 saniyedir. Bu verilerden yola çıkılarak dağılımın açıklığının $11,58 - 9,86 = 1,72$ saniye olduğu görülmektedir. Bu değer, en yüksek performansa sahip atletle en düşük performansa sahip atlet arasındaki derece farkını ve atletlerin performans derecelerinin 1,72 saniyelik bir aralıkta yer aldığını göstermektedir.

b) 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 100 metre yarışmasına katılan atletlerin koşu derecelerini yaklaşık olarak belirleyebilmek için merkezî eğilim ölçülerinden aritmetik ortalama ve ortanca değerine bakılmalıdır. Atletlerin aritmetik ortalama ve ortanca değerleri Grafik 2'de yer almaktadır.




Grafik 2

Değerler incelendiğinde aritmetik ortalama değerinin 10,299 saniye ve ortanca değerinin 10,2 saniye olduğu görülmektedir. Her ne kadar değerler birbirine yakın görünüyor olsa da 100 metre koşularında santisaniyelik farkların oldukça önemli ve belirleyici olduğu bilinmektedir. Bunun için dağılımdaki aykırı değerlerin belirlenmesi, aritmetik ortalama ve ortanca değerlerinin buna göre yorumlanması gerekmektedir. Çünkü aritmetik ortalama değeri, aykırı değerlerden etkilenmektedir. Bir dağılımda aykırı değerlerin görüldüğü veri görselleştirme araçlarından biri kutu grafiğidir. Grafik 3'te dağılıma ait kutu grafiği yer almaktadır.




Grafik 3

Nicel veri dağılımı, kutu grafiği ile incelendiğinde verilerin yoğunlaştığı bölgenin sağında ve görece uzağında kalan verilerin aykırı veriler olduğu söylenebilir ancak teknoloji desteğiyle kutu grafiği üzerinden aykırı değerleri görmek mümkündür. Grafik 4'te kutu grafiğinin aykırı değerlerinin görüldüğü hâli yer almaktadır.



Grafik 4

Kutu grafiğinin bu formunda aykırı değerler ★ ile işaretlenen değerlerdir. Bu değerler, dağılımın aritmetik ortalama değerini etkilemektedir. Aykırı değerler ihmal edildiğinde dağılıma ait aritmetik ortalama ve ortanca değerleri Grafik 5'te yer almaktadır.




Grafik 5

Grafik 5'te görüldüğü üzere aykırı değerler dikkate alındığında dağılımın aritmetik ortalaması 10,299 saniyeyken aykırı değerler dikkate alınmadığında bu değerin 10,173 saniye olduğu, aykırı değerler dikkate alındığında dağılımın ortancası 10,2 saniyeyken aykırı değerler dikkate alınmadığında bu değerin 10,17 saniye olduğu görülmektedir. Diğer bir deyişle ortancanın aykırı değerlerden aritmetik ortalamaya göre daha az etkilendiği ancak ortancanın etkilenmediği söylenebilir.

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda "2023 Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 100 metre yarışmasına katılan atletlerin koşu dereceleri saniye cinsinden nasıl bir eğilim göstermektedir?" sorusunu dağılımdaki aykırı değerleri göz önünde bulundurarak Grafik 3'te yer alan ortanca değeri ile cevaplamak daha doğru olacaktır. Bu durumda araştırma sorusunun cevabı aşağıdaki gibidir.

"2023 Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 100 metre yarışmasına katılan atletlerin koşu dereceleri yaklaşık 10,2 saniyedir."

c) 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 100 metre yarışmasına katılan atletlerin koşu derecelerine ait veri dağılımının merkezine yığılan performans derecelerinin hangi aralıklarda yoğunlaştığını görebilmek için kutu grafiği incelenmelidir. Grafik 6'da dağılıma ait kutu grafiği yer almaktadır.




Grafik 6

Kutu grafiğindeki bilgilerden yola çıkılarak 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 100 metre yarışmasına katılan atletlerin koşu derecelerine ait veri dağılımının merkezine yığılan performans derecelerinin hangi aralıklarda yoğunlaştığını görebilmek için kutu grafiğinde yer alan beş sayılı özetlerden alt çeyrek ve üst çeyrek arasındaki değerlere bakılabilir. Bu değerler, dağılımdaki verilerin %50'sinin bu aralıkta yoğunlaştığını göstermektedir. Bu durumda araştırma sorusunun cevabı aşağıdaki gibidir.

"2023 Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 100 metre yarışmasına katılan atletlerin %50'sinin elde ettiği dereceler 10,11 saniye ile 10,32 saniye arasındadır."

ç) 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 100 metre yarışmasına katılan atletlerin 0,2 saniyelik zaman aralıklarında derece elde etme durumlarını görebilmek için incelenmesi gereken veri görselleştirme aracı histogram grafiğidir. Histogram grafiği; verilerin seçilen hangi aralıklarda, hangi sıklıklarda gözlemlendiğini gösteren bir veri görselleştirme aracıdır. Grafik 7'de 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 100 metre yarışmasına katılan atletlerin 0,2 saniyelik zaman aralıklarında derece elde etme durumlarını gösteren histogram grafiği yer almaktadır.




Grafik 7


Grafik 7'deki bilgilerden yararlanılarak atletlerin derecelerinin 0,2 saniyelik aralıklara nasıl dağıldığı görülebilir. Örneğin 23 atletin dereceleri 10 saniye ile 10,2 saniye arasında, 4 atletin dereceleri 10,4 saniye ile 10,6 saniye arasındadır.

Araştırma sorusuyla elde edilmek istenen bilgi doğrultusunda histogram grafiğinde aralıklar değiştirilebilir. Örnekte 0,2 saniye olarak belirlenen aralık örneğin 0,1 saniye veya 1 saniye olarak değiştirilerek dağılıma ait yeni histogram grafikleri oluşturulabilir.

d) 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 100 metre yarışmasına katılan atletlerin elde ettiği derecelerin tüm atletlerin derecelerinin ortalama değerine göre nasıl yayılım gösterdiğini görebilmek için bakılabilecek yayılım ölçüleri, ortalama mutlak sapma ve standart sapma ölçüleridir. Grafik 8'de dağılımın ortalama mutlak sapması ve Grafik 9'da standart sapması yer almaktadır.



Grafik 8



Grafik 9

Grafik 8'de yer alan verilerin ortalama mutlak sapma değerinin 0,24 sn. olduğu görülmektedir. Bu değer, ortalama mutlak sapma aralığının dağılımın aritmetik ortalaması olan 10,299 sn. değerinin 0,24 sn. eksiği ve 0,24 sn. fazlası ile oluşan aralıkta olduğunu göstermektedir. Bu durumda ortalama mutlak

sapma aralığı, 10,299 ± 0,24 sn. aralığındadır. Yani atletlerin çoğunluğu 10,059 sn. ile 10,539 sn. arasında dereceler elde etmiştir ancak bu aralık, standart sapma değerine göre farklılaşmaktadır. Grafik 9'da görülen standart sapma aralığı ise 10,299 ± 0,349 sn. aralığındadır. Yani atletlerin çoğunluğu, 9,95 sn. ile 10,648 sn. aralığında dereceler elde etmiştir. Her ne kadar ortalama mutlak sapma ile standart sapma aralıkları birbirine çok yakın görünse de Grafik 8 *ve* Grafik 9'a bakıldığında standart sapma aralığındaki atlet sayısının daha fazla olduğu görülmektedir.


e) 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılan erkek atletlerin 100 metre koşu derecelerine yönelik histogram grafiği incelendiğinde atletlerin çoğunluğunun 10-10,4 saniye aralığında yoğunlaştığı görülmektedir. Bu bulgudan hareketle Olimpiyat Oyunları 100 metre atletizm yarışmasına katılan erkek atletlerin koşu derecelerinin de benzer bir dağılım göstermesi beklenir.

6. ÖRNEK

Dünya Bankası, dünya genelinde evsel katı atık miktarının yıllık yaklaşık 2 milyar ton olduğunu belirtmektedir. Kişi başına günlük katı atık miktarı yaklaşık 0,75 kilogramdır. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre kişi başı günlük katı atık miktarı 0,1 kg ile 4,5 kg arasında değişmektedir.


Bu bilgilerden hareketle aşağıda 2018, 2020 ve 2022 yıllarında Türkiye'nin 81 ilinde kişi başı günlük katı atık miktarlarına ait TÜİK verileri yer almaktadır. Verilen bilgiler doğrultusunda uygun görselleştirme ve/veya özetleme araçlarını seçerek soruları cevaplayınız.

a) Aşağıdaki grafikte 2018, 2020 ve 2022 yıllarında Türkiye'nin 81 ilinde kişi başı günlük katı atık miktarları yıl ayrımı yapılmadan verilmiştir. Üç yıllık verilerin tamamı incelendiğinde Türkiye'deki kişi başı günlük katı atık miktarı kilogram cinsinden nasıl eğilim göstermektedir?



Grafik 1

b) Aşağıdaki grafikte 2018, 2020 ve 2022 yıllarında Türkiye'nin 81 ilinde kişi başı günlük katı atık miktarları yıllar bazında yer almaktadır. Türkiye'deki kişi başı günlük katı atık miktarı yıllara göre kilogram cinsinden nasıl eğilim göstermektedir?




Grafik 2

c) Elde ettiğiniz bulgulardan hareketle 2024 yılında Türkiye'nin 81 ilindeki kişi başı günlük katı atık miktarının kg cinsinden nasıl bir eğilim göstermesi beklenir?

Çözüm


a) Verilerin merkezinin nereye eğilim gösterdiğini görebilmek için grafik üzerinde merkezî eğilim değerlerinden aritmetik ortalama ve ortancaya bakmak gerekmektedir. Aşağıdaki grafikte dağılımın aritmetik ortalama ve ortanca değerleri yer almaktadır.



Grafik 3

Grafikteki değerler incelendiğinde aritmetik ortalamanın 1,123 kg ve ortancanın 1,07 kg olduğu görülmektedir. Dağılımda 2 kg civarında yığılan verilerin ortalamayı etkilediği öngörülebilir. Bu durumda dağılımın eğilim gösterdiği merkezin 1,07 kg olduğu söylenebilir. Dolayısıyla 2018, 2020 ve 2022 yıllarında Türkiye'nin kişi başı günlük katı atık miktarının yaklaşık olarak 1,07 kg olduğu söylenebilir.

b) Verilerin merkezinin nereye eğilim gösterdiğini görebilmek için grafik üzerinde merkezî eğilim değerlerinden aritmetik ortalama ve ortancaya bakmak gerekmektedir. Aşağıdaki grafikte her üç yıla ait dağılımların aritmetik ortalama ve ortanca değerleri yer almaktadır.




Grafik 4

Grafikteki değerler incelendiğinde 2018 yılına ait verilerin aritmetik ortalamasının 1,158 kg ve ortancanın 1,09 kg, 2020 yılına ait verilerin aritmetik ortalamasının 1,144 kg ve ortancanın 1,09 kg, 2022 yılına ait verilerin aritmetik ortalamasının 1,069 kg ve ortancanın 0,96 kg olduğu görülmektedir. Her üç yıla ait verilerin dağılımında 1,8 kg civarında yığılan verilerin ortalamayı etkilediği öngörülebilir.

Dolayısıyla 2018 ve 2020 yıllarında Türkiye'nin kişi başı günlük katı atık miktarının yaklaşık olarak 1,09 kg, 2022 yılında Türkiye'nin kişi başı günlük katı atık miktarının yaklaşık olarak 0,96 kg olduğu söylenebilir.

c) 2024 yılında Türkiye'nin 81 ilindeki kişi başı günlük katı atık miktarının kg cinsinden nasıl bir eğilim gösterdiğini görebilmek için dağılımların aritmetik ortalama ve ortanca değerleri ile birlikte kutu grafiklerine de bakmak gerekmektedir.



Grafik 5

Türkiye'nin kişi başı günlük katı atık miktarının 2018, 2020 ve 2022 yıllarına ait kutu grafikleri üzerinden yayılımları incelendiğinde dağılımların yayılımlarının benzerlik gösterdiği görülmektedir. Buna dayanarak 2024 yılına ait dağılımın da benzer bir yayılım göstermesi muhtemeldir.

7. Uygulama

Veri Analizi Yapma ve Sonuçları Yorumlama

Üçüncü uygulamada grupça topladığınız ve kaydettiğiniz verileri istatistik programı yardımıyla açınız.

Belirlediğiniz istatistiksel araştırma sorularına cevap bulabilmek için uygun görselleştirme ve/veya özetleme araçlarını seçerek verilerinizi analiz ediniz.

Analizleriniz doğrultusunda sorularınıza cevap veriniz. Cevaplarınızı sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

6. Sıra Sizde

Turizm sektörü, ülkelerin ekonomik kalkınmasında önemli bir yere sahiptir. Türkiye, sahip olduğu tarihî ve doğal zenginlikler sayesinde turizm bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyel, Türkiye Yüzyılı projeleri kapsamında "Doğa Turizmi" programının geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Program; korunan alanlarda (millî park, tabiat parkı, sulak alanlar gibi) yapılacak altyapı ve üstyapı düzenlemeleri ile Türkiye'nin tanınırlığının artırılmasını, yöre halkının doğa turizminden elde ettiği gelirlerin artırılarak ekonomik yönden desteklenmesini amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı yönetimindeki millî park, tabiat parkı gibi korunan alanların bulunduğu 81 ilde Doğa Turizmi Stratejisi Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu plana bağlı olarak hazırlanan Doğa Turizmi Uygulama Eylem Planları ile her alanda uygulanabilir doğa turizmi faaliyetleri, rotaları ve etkinliklerinin planlaması sağlanmıştır.

Türkiye'de doğa turizmi ile ilgili araştırma projesi yapan bir grup lise öğrencisi, 2020-2023 yılları arasında Türkiye'nin turizm gelirlerini belirlemek istemektedir. TÜİK verilerine ulaşan öğrenciler, Türkiye'nin 2020-2023 yılları arasındaki turizm gelirlerinin aylara göre dağılımını içeren aşağıdaki tabloyu oluşturmuştur.

Aylar	2020 Yılı Turizm Gelirleri (x1000 Dolar)	2021 Yılı Turizm Gelirleri (x1000 Dolar)	2022 Yılı Turizm Gelirleri (x1000 Dolar)	2023 Yılı Turizm Gelirleri (x1000 Dolar)
Ocak	2 085 858	854 475	2 255 632	3 314 265
Şubat	1 682 608	722 424	1 875 432	2 513 934
Mart	895 926	1 059 071	2 439 132	2 930 860
Nisan	175 638	1 198 135	2 460 332	3 181 209
Mayıs	196 363	1 035 086	3 596 132	4 294 508
Haziran	275 473	1 870 861	4 480 917	5 539 501
Temmuz	711 042	3 844 761	5 485 658	6 321 338
Ağustos	2 054 698	5 641 288	6 742 144	7 616 302
Eylül	2 356 564	4 640 682	5 647 309	6 330 953
Ekim	2 301 315	4 678 158	5 844 119	6 241 932
Kasım	1 178 102	2 511 421	3 255 279	3 398 887
Aralık	903 685	2 117 226	2 395 784	2 631 854

Karekodda yer alan veri dosyasını istatistik yazılımına aktarınız. Araştırmayı gerçekleştiren öğrencilerin hazırladığı istatistiksel araştırma soruları doğrultusunda uygun görselleştirme ve/veya özetleme araçlarını seçerek analizlerinizi yapınız. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.

Türkiye turizm gelirleri veri dosyasına ulaşmak için karekodu okutunuz.

a) Tablo incelendiğinde turizm gelirinin en düşük ve en yüksek olduğu aylar arasındaki gelir farkı kaç dolardır?

b) Türkiye'nin 2020-2023 yılları arası dört yıllık turizm geliri nasıl bir eğilim göstermektedir?

c) Türkiye'nin 2020-2023 yılları arası dört yıllık turizm gelirinin merkezine yığılan turizm gelirleri hangi aralıklarda yoğunlaşmaktadır?

ç) Türkiye'nin 2020-2023 yılları arası dört yıllık turizm gelirinin 500 000 dolarlık aralıklarda değişimi nasıldır?

d) Türkiye'nin 2020-2023 yılları arası dört yıllık turizm geliri, ortalama turizm gelir değerine göre nasıl yayılım göstermektedir?

e) Türkiye'nin 2025 yılı turizm geliri kaç dolar olabilir?

Kontrol Noktası

İstatistiksel araştırma sürecinde veri analizi, araştırma sorularına cevap verecek uygun görselleştirme veya özetleme araçları seçilerek yapılmalıdır.

Performans Görevi

Bilimsel araştırmalar, araştırmacıların ilgi duyduğu alanlarda merak ettiği sorularla başlar. Araştırmacıların merak ettikleri sorulara cevap bulabilmeleri için bir araştırma süreci yürütmeleri gerekmektedir.

Bu görevde sizden ilgi duyduğunuz bir gerçek yaşam durumuna yönelik istatistiksel araştırma süreci yürütmeniz, süreci ilgili ölçütlere uygun şekilde tamamlamanız ve süreç sonunda hazırladığınız raporu sınıf arkadaşlarınıza sunmanız beklenmektedir.

Göreve başlamadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

- Dört kişilik bir çalışma grubu oluşturunuz.
- Grup çalışmasında kimlerin hangi görevleri alacağına dair planınızı yapınız.

Görev esnasında aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

- Grupça ilgi duyduğunuz bir gerçek yaşam durumuna yönelik nicel veri toplamayı gerektiren istatistiksel bir bağlam belirleyiniz.
- Belirlediğiniz bağlama yönelik tek nicel değişkenli veri dağılımlarını betimleyen ve karşılaştıran birer adet istatistiksel araştırma sorusu yazınız.
- Veri toplama planınızı hazırlayınız.
- Verileri toplayınız ve analize hazır hâle getiriniz.
- Araştırma sorularınız doğrultusunda topladığınız verileri analiz etmek için uygun görselleştirme veya özetleme araçlarını seçiniz.
- Seçtiğiniz araçlarla verilerinizi analiz ediniz.
- Analizler sonunda verilerin arasını ve ötesini yorumlayarak sonuçlar çıkarınız.
- Elde ettiğiniz sonuçları araştırma sorularınız doğrultusunda yorumlayınız.
- İstatistiksel araştırma sürecinizin tamamını rapor hâline getirerek sınıfınızdaki diğer gruplara sununuz.
- Karekodlarda verilen akran değerlendirme formu ile sınıf arkadaşlarınızı, grup değerlendirme formu ile de grup arkadaşlarınızı değerlendiriniz.

Görev bitiminde aşağıdaki hususa dikkat ediniz.

- Raporunuzu öğretmeninize teslim ediniz.

Performans göreviniz, aşağıdaki karekodda yer alan analitik dereceli puanlama anahtarı ile öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir.

Akran değerlendirme formuna ulaşmak için karekodu okutunuz.

Analitik dereceli puanlama anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

Grup değerlendirme formuna ulaşmak için karekodu okutunuz.

Alıştırmalar

1. Bir araştırma grubu, 27 memeli türünün bazı özelliklerini belirleyerek bunları aşağıdaki tabloya işlemiştir.

Verilen özellikleri inceleyiniz ve verilenlere göre öncüllerdeki soruları cevaplayınız.

Sıra	Memeli Türü	Yaşam Süresi (Yıl)	Kütle (kg)	Maksimum Hız (km/sa.)
1.	Afrika fili	70	6400	40
2.	Asya fili	70	5000	40
3.	Büyük kahverengi yarasa	19	0,02	40
4.	Şişe burunlu yunus	25	635	37
5.	Çita	14	50	110
6.	Şempanze	40	68	-
7.	Ev kedisi	16	4,5	50
8.	Eşek	40	187	50
9.	Zürafa	25	1100	50
10.	Gri kurt	16	80	64
11.	Gri fok balığı	30	275	19
12.	Yer sincabı	9	0,1	19
13.	At	25	521	69
14.	Ev faresi	3	0,03	13
15.	İnsan	80	80	45
16.	Jaguar	20	115	60
17.	Katil balina	50	4000	48
18.	Aslan	15	250	80
19.	Amerikan keseli sıçanı	5	5	-
20.	Dokuz kemerli armadillo	10	7	1
21.	Baykuş maymunu	12	1	-
22.	Patas maymunu	20	13	55
23.	Domuz	10	192	18
24.	Çatal boynuzlu antilop	10	70	98
25.	Tavşan	5	3	56
26.	Kızıl tilki	7	5	48
27.	Benekli sırtlan	25	70	64

a) Her bir memeli türüne ait özellikler nasıl belirlenmiş olabilir? Fikirlerinizi yazınız ve sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

b) Tablodaki verilerden yola çıkarak tek nicel değişken içeren veri toplamayı gerektiren birer adet betimleyen ve karşılaştıran istatistiksel araştırma sorusu yazınız. Sorularınızı yazarken istatistiksel araştırma sorusu ölçütlerini dikkate alınız.

Betimleyen istatistiksel araştırma sorunuz:

Karşılaştıran istatistiksel araştırma sorunuz:

c) İstatistiksel araştırma sorularını sınıf arkadaşlarınıza sununuz. Sınıf arkadaşlarınızın sunduğu soruların istatistiksel araştırma soruları ölçütlerine uygun olup olmadığını karekodda yer alan kontrol formu ile değerlendiriniz. Değerlendirmelerinizi sınıfça tartışınız.

İstatistiksel araştırma sorusu ölçütleri kontrol formuna ulaşmak için karekodu okutunuz.

ç) Sınıf içi tartışma sonrası istatistiksel araştırma sorularınızın değişmesi gerektiğini düşünüyorsanız sorunuzun son hâlini yazınız.

Betimleyen istatistiksel araştırma sorunuz:

Karşılaştıran istatistiksel araştırma sorunuz:

d) Verilerin toplanmasından önce araştırmacılar nasıl bir veri toplama planı oluşturmuştur? Araştırmacıların oluşturduğunu varsaydığınız planı aşağıya yazınız.

Plan:

e) Planı sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. Arkadaşlarınızın oluşturduğu planları dinleyiniz ve sundukları planların veri toplama planında bulunması gereken özelliklere uygunluğunu karekodda verilen kontrol formu ile değerlendiriniz. Değerlendirmelerinizi sınıfça tartışınız. Üzerinde uzlaştığınız planı yeniden yazınız.

Plan:

Veri toplama planı kontrol formuna ulaşmak için karekodu okutunuz.

f) Karekodda verilen veri setini istatistik yazılımına yükleyiniz. Veri setinin analizini yapınız ve araştırma sorularınızı cevaplayınız. Cevabınızı sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

Memeli türü veri dosyasına ulaşmak için karekodu okutunuz.

2. Dünya için en önemli ve stratejik kaynaklardan biri sudur. Suyun sınırsız bir kaynak olmadığı gerçeği, su tüketimi konusunda gerek bireylerin gerekse toplumların bilinçli olmasını gerekli kılmaktadır. Bu gereklilik son yıllarda su okuryazarlığı kavramını ortaya çıkarmıştır. Su okuryazarlığı; suyun tüm canlılar için önemi, çevresel etkenler nedeniyle su kaynaklarının kirlenmesi, su tüketimi gibi konularda bireysel veya toplumsal düzeyde bilinç oluşması olarak tanımlanabilir.

Türkiye'de içme ve kullanma amaçlı su; akarsu, baraj, göl, gölet, kaynak veya kuyulardan temin edilmektedir. Dünya Su Günü (27 Mart) etkinliği kapsamında bir lisedeki bir grup öğrenci, Türkiye'de içme ve kullanma suyu için su kaynaklarından çekilen su miktarlarını belirlemek ve bilinçli su tüketimi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla araştırma yapmaya karar vermiştir. Bu doğrultuda ulaştığı TÜİK verilerinden 2020 ve 2022 yıllarında akarsu, baraj, göl, gölet, kaynak veya kuyulardan temin edilerek illere dağıtılan su miktarlarını (ton) tespit etmiş ve aşağıdaki karekodda yer alan tabloyu oluşturmuştur.

Su kaynaklarından çekilen su miktarı veri dosyasına ulaşmak için karekodu okutunuz.

Tablodaki verilerden yola çıkarak

a) Tek nicel değişken içeren veri toplamayı gerektiren birer adet betimleyen ve karşılaştıran istatistiksel araştırma sorusu oluşturunuz. Sorularınızı yazarken istatistiksel araştırma sorusu ölçütlerini dikkate alınız.

Betimleyen istatistiksel araştırma sorunuz:

Karşılaştıran istatistiksel araştırma sorunuz:

b) Sorularınızı sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. Karekodda yer alan kontrol formu ile sınıf arkadaşlarınızın sorularının istatistiksel araştırma soruları ölçütlerine uygun olup olmadığını değerlendiriniz. Değerlendirmelerinizi sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.

İstatistiksel araştırma sorusu ölçütleri kontrol formuna ulaşmak için karekodu okutunuz.

c) Sınıfça üzerinde tartıştığınız ve uzlaştığınız araştırma sorularını yazınız. İlk yazdığınız sorularla sınıfça uzlaşarak yazdığınız sorular arasındaki benzerlik ve farklılıkları değerlendiriniz.

Sınıfça uzlaştığınız betimleyen istatistiksel araştırma sorusu:

Sınıfça uzlaştığınız karşılaştıran istatistiksel araştırma sorusu:

ç) Tablodaki verileri elde edebilmek için nasıl bir veri toplama planı hazırlanmıştır? Fikrinizi yazınız.

Plan:

d) Planınızı sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. Sınıf arkadaşlarınızın sunduğu planları karekoddaki kontrol formunda verilen veri toplama planında bulunması gereken özellikler açısından değerlendiriniz. Değerlendirmelerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. Sınıfça üzerinde uzlaştığınız veri toplama planını yazınız.

Plan:

Veri toplama planı kontrol formuna ulaşmak için karekodu okutunuz.

e) Karekodda verilen dosyayı istatistik yazılımına yükleyiniz ve analiz için hazır hâle getiriniz.

Su kaynaklarından çekilen su miktarı veri dosyasına ulaşmak için karekodu okutunuz.

f) Sınıfça uzlaştığınız istatistiksel araştırma sorularına cevap bulabilmek için uygun görselleştirme ve/veya özetleme araçlarını seçerek veri analizlerini yapınız.

g) Analiz sonuçlarını yorumlayarak araştırma sorularınıza cevap veriniz.

Konu ile ilgili daha fazla soru çözmek için karekodu okutunuz.

6.2. BAŞKALARI TARAFINDAN OLUŞTURULAN TEK NİCEL DEĞİŞKENLİ VERİ DAĞILIMLARINA DAYALI SONUÇ VEYA YORUMLARI TARTIŞABİLME

Konuya Başlarken

Bir lise öğrencisi, suyun sağlık açısından faydaları üzerine bir araştırma yapmıştır. Gündelik bilgi sunan genel ağ sitelerinden elde ettiği bilgilerden yola çıkarak su tüketiminin insan sağlığına faydası üzerine oluşturduğu aşağıdaki paragrafı araştırma raporuna eklemiştir.

"Su tüketimi sağlık açısından oldukça faydalıdır. Düzenli olarak yeterli miktarda su içmek, cilt sağlığını ve sindirimi destekler. Bununla birlikte kilo kontrolüne yardımcı olur, vücudun enerji seviyesini artırır. Sağlıklı bir yetişkinin **kilo başına** her gün yaklaşık **40 mililitre su** tüketmesi gerekmektedir. Sağlık açısından günde yaklaşık **3,5-4 litre su** içilmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir."

İstatistiksel araştırma süreci aşamalarını dikkate alarak öğrencinin raporda yer alan bu ifadeleri elde etme yöntemine ve raporda yer alan çıkarımlara eleştirel gözle bakınız. Sizce öğrenci raporda yer alan bu bilgilere ulaşırken nelere dikkat etmelidir? Raporda yer alan ifadelerde hangi bilgilerin ayrıntılı bir şekilde verilmesi gerekir?

Günlük hayatta gazete, dergi gibi basılı yayın organlarında ve genel ağ siteleri, sosyal medya gibi dijital ortamlarda başkaları tarafından oluşturulan birçok istatistiksel bilgi ile karşılaşılmaktadır. Günlük hayatta karşılaşılan istatistiksel bilgileri eleştirel gözle incelemeden olduğu gibi doğru kabul etmek gerek bireyleri gerekse toplumları yanlış yönlendirebilmektedir.

8. Uygulama

Aşağıda Erdem ve Sevinç arasında geçen bir konuşma verilmiştir.

Erdem: Duydun mu Sevinç? Bizim mahallenin muhtarlık seçimlerini gözde olan aday kazanıyormuş. Az önce kendisini gördüm. Oy oranının çok yüksek olduğunu söyledi.

Sevinç: Öyle mi? Nasıl böyle bir kanıya varmış?

Erdem: Pazarda yaklaşık 30 kişiyle sohbet etmiş. Bu kişilerin neredeyse tamamı ona oy vereceğini söylemiş. Büyük ihtimalle kazanır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İstatistiksel araştırma süreci aşamalarını göz önünde bulundurarak Erdem ve Sevinç arasında geçen konuşmayı inceleyiniz. Erdem'in muhtar adayı tahmininin dayanağı sizce nedir?

2. Tahmine yönelik tespit ettiğiniz bir hata varsa tartışınız ve hatayı yazınız.

3. Tespit ettiğiniz bir hata varsa hatayı çürütmek için Sevinç, Erdem'e ne söylemelidir?

Konu ile ilgili çalışma kâğıdına ulaşmak için karekodu okutunuz.

Konu ile ilgili etkileşimli içeriğe ulaşmak için karekodu okutunuz.

Konu ile ilgili daha fazla soru çözmek için karekodu okutunuz.


Farklı Kaydet

Bu temada öğrendiğiniz bilgileri kendi hatırlayacağınız şekilde bu alana kısaca not edebilirsiniz.

Ölçme ve Değerlendirme

Bu bölümde cevaplamanız için farklı soru tiplerinde 6 adet soru bulunmaktadır.
Ölçme ve değerlendirme bölümünün sonunda verilen karekodu okutarak ek sorulara ulaşabilirsiniz.

1. Aşağıda istatistiksel araştırma süreci aşamalarının yer aldığı döngüsel şema yer almaktadır.



Bir öğrenci grubunun gerçekleştirdiği istatistiksel araştırma sürecinin adımları karışık şekilde aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablodaki adımları inceleyiniz. Her bir adımın istatistiksel araştırma sürecinde hangi aşamaya karşılık geldiğini yazınız.

İstatistiksel Araştırma Adımları	İstatistiksel Araştırma Süreci Aşaması
İstatistik yazılımına verilerin girişini yaptılar.	
Öğrenciler, lise öğrencilerinin stres düzeylerinin cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığına cevap aramaya karar verdiler.	
Analizlerini tamamladılar.	
Sonuca ulaştılar.	
Araştırma grubundaki öğrencilerin psikoloji bilimine duydukları merak, öğrencileri lise öğrencilerinin stres düzeyleri ile ilgili bir çalışma yapmaya götürdü.	
Elde ettikleri sonucu araştırma sorusu bağlamında yorumladılar.	
Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış bir ölçeği araştırmaya karar verdiler. Basit rastgele örneklemeyle evren içinden örneklemlerini belirlediler.	
Verilerden bir sonuç çıkarabilmek için kullanacakları veri görselleştirme aracını belirlediler.	

2. Bir grup lise öğrencisi ilçelerindeki ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin kitap ve kırtasiye giderlerini araştırmak için 737 öğrenciye anket uygulamıştır. Anket uygulaması sonucunda elde edilen verilerin bir kısmı aşağıdaki tabloda, tamamı ise yandaki karekodda verilmiştir.

Kitap ve kırtasiye giderleri veri dosyasına ulaşmak için karekodu okutunuz.

Cinsiyet	Aylık Kitap ve Kırtasiye Gideri (TL)	Okul
Erkek	660	Ortaokul
Kız	915	Üniversite
Erkek	894	Ortaokul
Kız	834	Ortaokul
Erkek	814	Lise
Erkek	762	Ortaokul
Kız	453	Lise

Karekodda yer alan veri setini dinamik istatistik programına yükleyiniz ve aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) A ilçesindeki öğrencilerin aylık kitap ve kırtasiye giderleri nasıl bir eğilim göstermektedir?

b) A ilçesindeki öğrencilerin aylık kitap ve kırtasiye giderleri cinsiyetlerine göre nasıl farklılık göstermektedir?

c) A ilçesindeki öğrencilerin aylık kitap ve kırtasiye giderleri okul türlerine göre nasıl farklılık göstermektedir?

3. Aşağıda verilen durumlarda dağılımları oluşturan değerlerin değişkenden kaynaklı değişebilmesi söz konusudur.

I. 100 metrelik bir parkurda 10 tur atan bir atletin parkuru tamamlama süresinin kronometre ile belirlenmesi
II. Kivinin Türkiye'nin farklı bölgelerindeki gelişiminin izlenmesi
III. Aynı bakteri türünün oksijenli ve oksijensiz ortamda üremesinin incelenmesi
IV. Bir okuldan belirli sayıda seçilen bir grup öğrencinin yıl sonu not ortalamalarının incelenmesi

Buna göre verilen durumlara uygun değişebilirlik türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

	I. Durum	II. Durum	III. Durum	IV. Durum
A)	Örneklemden kaynaklı	Doğal ortamdan kaynaklı	Örneklemden kaynaklı	Müdahaleden kaynaklı
B)	Ölçümden kaynaklı	Müdahaleden kaynaklı	Örneklemden kaynaklı	Doğal ortamdan kaynaklı
C)	Müdahaleden kaynaklı	Doğal ortamdan kaynaklı	Ölçümden kaynaklı	Doğal ortamdan kaynaklı
D)	Örneklemden kaynaklı	Müdahaleden kaynaklı	Doğal ortamdan kaynaklı	Ölçümden kaynaklı
E)	Ölçümden kaynaklı	Doğal ortamdan kaynaklı	Müdahaleden kaynaklı	Örneklemden kaynaklı

4. Bilim insanları, önceki gece normal uyku süresinden daha uzun uyuyan kişilerin sonraki gün belirgin bir şekilde daha uyanık hissettiği sonucuna varmıştır. Bu durumun trafikte yaşanan kazaları azaltmasına, iş ve okuldaki verimliliği artırmasına, tehlikeli işlerde çalışan kişilerin iş kazasıyla karşılaşma riskini azaltmasına katkı sunacağı belirtilmiştir.

Bu bağlamda bir okulun rehberlik servisi, öğrencilerin uykuya ayırdıkları süreleri öğrenmek için bir araştırma yapmaya karar vermiştir. Rehberlik servisi belirlediği bağlam doğrultusunda "Öğrencilerin uyku süreleri ortalama kaç saattir?" şeklinde bir istatistiksel araştırma sorusu oluşturmuştur.

Buna göre aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

a) Rehberlik servisinin hazırladığı araştırma sorusunu aşağıda verilen istatistiksel araştırma sorusunda bulunması gereken ölçütlere göre inceleyiniz ve tablodaki boşlukları doldurunuz.

İstatistiksel Araştırma Sorusu Ölçütleri	Sorunun İlgili Ölçütü Karşılayıp Karşılamadığına Dair Fikirleriniz
Amaç açık mıdır?	
Araştırmaya değer midir?	
İlgilenilen grup (evren) açıkça görülmekte midir?	
Değişken açıkça görülmekte midir?	
Veri toplanarak cevaplanabilir mi?	
Değişebilirliği yansıtmakta mıdır?	
Odaklanılan grup araştırma yapılmasına imkân vermekte midir?	
Nicel veri toplamayı gerektirir mi?	

b) Rehberlik servisi tarafından yazılan araştırma sorusunda istatistiksel araştırma sorusu ölçütlerine göre eksiklikler olduğunu düşünüyorsanız soruyu yeniden yazınız.

5. Bir lisenin 9. sınıf öğrencileri, okullarında üniversite sınavına giren 12. sınıf öğrencilerinin sınav puanlarını belirlemeye yönelik bir araştırma yapmak istemektedir. Bu doğrultuda araştırma sorusunu "Üniversite sınavına giren öğrencilerin sınav puanları nasıl bir eğilim göstermektedir?" şeklinde oluşturmuştur.

Buna göre öğrencilerin oluşturduğu istatistiksel araştırma sorusu, aşağıda verilen istatistiksel araştırma sorusunda bulunması gereken ölçütlerden hangisini karşılamaz?

A) Nicel veri toplamaya uygun olması

B) Değişkenlerin açık bir şekilde görülmesi

C) Araştırma sorusunun veri toplanarak cevaplanabilmesi


D) İlgilenilen grubun açıkça görülmesi

E) Amacın açıkça görülmesi

6. Uçakların kalkış saatinden geç havalanmasına veya iniş saatinden geç iniş yapmasına rötar denmektedir. Hava yolu firmalarının rötarlı uçuşlar için yolculara karşı bazı sorumlulukları bulunmaktadır. Hava yolu firmalarının gecikme süresine bağlı olarak yolculara ücretsiz yiyecek içecek, ücretsiz konaklama hizmeti verme zorunluluğu vardır. Bir hava yolu firması, rötarlı uçuşlar nedeniyle karşılaması gereken hizmetlerin oluşturacağı bütçeyi öngörebilmek için bir araştırma yapmıştır. Araştırmada bir ay boyunca gerçekleşen 78 uçuşun gecikme süreleri belirlenmiş ve bu veriler istatistik programına girilmiştir.

Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.


a) Hava yolu firması istatistik yazılımına girdiği verilerle aşağıdaki nokta grafiğini oluşturmuştur.



i. Grafikte yer alan veriler 78 uçuşun gecikme süreleri ile ilgili hangi bilgileri sunmaktadır?

ii. Grafikte yer alan veriler kimler için önemli olabilir? Fikirlerinizi yazınız.

b) Hava yolu firması istatistik programına girdiği verilerle aşağıdaki kutu grafiğini oluşturmuştur.



i. Grafikte yer alan veriler 78 uçuşun gecikme süreleri ile ilgili hangi bilgileri sunmaktadır?

ii. Hava yolu firması bu kutu grafiğini neden oluşturmuş olabilir? Fikirlerinizi yazınız.

Tema ile ilgili daha fazla soru çözmek için karekodu okutunuz.

7. TEMA Veriden Olasılığa

7.1. Olayların Olasılığını Gözleme Dayalı Tahmin Etme
7.2. Olayların Olasılığına İlişkin Tümevarımsal Akıl Yürütme

▶ Anahtar Kavramlar

- ayrık olay
- ayrık olmayan olay
- çıktı
- deney
- deneysel olasılık
- olay
- örnek uzay
- teorik olasılık

▶ Sembol ve Gösterimler

- $P(A)$
- $P(B)$
- $P(A \cap B)$
- $P(A \cup B)$

▶ Bu temada sizden

- olayların olasılığını gözleme dayalı tahmin edebilmeniz,
- olayların olasılığına ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilmeniz

beklenmektedir.

Tema boyunca sizden çalışma kâğıtlarındaki soruları çözmeniz, performans görevlerini yerine getirmeniz, ölçme ve değerlendirme sorularını çözmeniz beklenmektedir.



Tema karekodu

Tema sunusuna ulaşmak için karekodu okutunuz.

Başlarken

Günlük hayatta meteorolojik tahminler, tıp alanındaki öngörüler, spor müsabakalarının sonucuna yönelik beklentiler gibi sonucu henüz belli olmayan durumların olasılığı hakkında yorumlar yapılabilir. Sonucu belli olmayan bu durumlara ilişkin doğru kararlar alabilmek için daha önce ortaya çıkan benzer durumların olasılıkları incelenmeli ve yorumlanmalıdır.

Ön Değerlendirme

1. Aşağıda verilen ifadelerin başındaki noktalı yerlere doğru ifadeler için "D", yanlış ifadeler için "Y" yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz önermenin doğrusunu altına yazınız.

(……) "Ahmet'in gittiği lokantada içtiği içeceğin ayran olması" ifadesi bir olay belirtir.

(……) "Yarın okul var mı?" ifadesi bir olay belirtir.

(……) "Kitaplıktan seçilen bir kitabın kuşe kâğıdına basılmış olması" ifadesi bir olay belirtir.

(……) "Kırmızı ışığa dikkat et!" ifadesi bir olay belirtir.

2. Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılı ve "/" sembolü ile ayrılmış ifadelerden doğru olanın altını çiziniz.

I. Rastgele seçilen bir kolonyanın limon kolonyası olma olayında deney, **kolonya seçme/parfüm seçme** işidir.

II. Rastgele seçilen bir kitabın sayfa sayısının asal sayı olması olayında deney, **kitabın sayfalarını sayma/kitap seçme** işidir.

3. Aşağıdaki olaylara ait çıktıları ilgili alanlara yazınız.

Olay	Olaya Ait Çıktılar
Haftanın günlerinden birinin rastgele seçilmesi deneyinde seçilen günün p harfi ile başlaması	
Kış aylarından birinin rastgele seçilmesi deneyinde seçilen ayın yıl içindeki sırasının çift sayı olması	

4. Aşağıdaki deneylerin örnek uzaylarını yazınız.

I. Türkiye'ye kıyısı olan denizlerden birinin rastgele seçilmesi deneyi

II. Duyu organlarından birinin rastgele seçilmesi deneyi

5. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere "ayrık" ve "ayrık olmayan" ifadelerinden uygun olanları yazınız.

I. Bir mağazadan rastgele ayakkabı seçme deneyinde "beyaz ayakkabı seçme" ve "spor ayakkabı seçme" olayları …….. olaylardır.

II. Bir kahve otomatından rastgele kahve seçme deneyinde "sütlü kahve seçme" ve "sade kahve seçme" olayları …….. olaylardır.

III. Bir gözlükçüden rastgele bir gözlük seçme deneyinde "güneş gözlüğü seçme" ve "numaralı gözlük seçme" olayları …….. olaylardır.

IV. Bir galeriden rastgele bir araç seçme deneyinde "otomatik vitesli araba seçme" ve "düz vitesli araba seçme" olayları …….. olaylardır.

6. Aşağıda verilen olaylardaki olasılık değerlerinin hangi olasılık yaklaşımı (deneysel, teorik) ile hesaplandığını belirleyerek cümlelerin başında yer alan kutucuğa olasılık yaklaşımı deneysel ise "D", teorik ise "T" yazınız.


☐ Renkleri dışında özdeş kırmızı, mavi ve yeşil üç arabadan mavi arabayı seçme olasılık değeri $\frac{1}{3}$'tür.

☐ Havaya 27 kez atılan hilesiz bir madenî paranın üst yüzeyine 10 kez tura gelmiştir. Bu olayda üst yüzeye tura gelme olasılık değeri $\frac{10}{27}$'dir.

☐ A ve B şehirleri arasında 5 yol bulunmaktadır. A şehrinden B şehrine giden bir yolcunun 1. yolu kullanma olasılık değeri $\frac{1}{5}$'tir.

☐ Bir toptancıdan alınan 300 ampulden 12 tanesi bozuk çıktığına göre bu toptancıdan alınan bir ampulün bozuk çıkma olasılık değeri %4'tür.

7. Yandaki grafik, her yüzeyinde 1'den 6'ya kadar farklı bir rakam bulunan hilesiz bir sayı küpünün defalarca havaya atılması sonrasında üst yüzeye gelen sayılar dikkate alınarak oluşturulmuştur. **Buna göre**



a) Sayı küpü kaç kez havaya atılmıştır?

b) Üst yüzeye 5 gelme olayının sıklığı kaçtır?

c) Üst yüzeye 5 gelme olayının göreli sıklığı kaçtır?

ç) Üst yüzeye 5 gelme olayının olasılık değerini bulunuz.

d) Üst yüzeye çift sayı gelme olayının olasılık değerini bulunuz.

e) Sayı küpünün 5000 defa havaya atılması durumunda sizce sıklık dağılımı nasıl değişir?

f) Sayı küpünün 5000 defa havaya atılması durumunda üst yüzeyine 5 gelme olayının olasılık değeri sizce nasıl değişir?

8. Görseldeki gibi yüzeylerinde 1'den 6'ya kadar farklı rakam bulunan hilesiz bir sayı küpünün havaya atılması durumunda üst yüzeyine çift sayı gelme olayı ele alınsın. **Buna göre**



a) Bu deneyin olası tüm çıktıları nelerdir?

b) Bu olaya ait çıktılar nelerdir?

c) Bu olayın olasılık değerini bulunuz.

ç) Bu olayın tümleyeninin olasılık değerini bulunuz.

d) Bu olay ile sayı küpünün üst yüzeyine tek sayı gelme olaylarının çıktılarını karşılaştırarak ayrık olaylar olup olmadıklarını belirleyiniz.

e) Bu olay ile sayı küpünün üst yüzeyine asal sayı gelme olaylarının çıktılarını karşılaştırarak ayrık olaylar olup olmadıklarını belirleyiniz.


7.1. OLAYLARIN OLASILIĞINI GÖZLEME DAYALI TAHMİN ETME

Konuya Başlarken



Görsel 1

Görsel 1'i inceleyiniz. Bu görselden hareketle "sınıf başkanı seçilen bir öğrencinin bilim veya sanatta başarılı olması" gibi birden çok olay içeren örnekler oluşturulabilir mi? Tartışınız.



Görsel 2

Şehir içi ulaşım ağını temsil eden Görsel 2'yi inceleyiniz. Bu görseldeki otobüs, tren ve konum sembolleri durakları temsil etmektedir. Gösterilen iki konum arasında seçilebilecek kaç farklı güzergâh olabilir?

Günlük hayatta karşılaşılan belirsiz durumlar her zaman tek bir olay içermeyebilir. Genelde birden çok olay içeren durumlarla karşılaşılır. Örneğin tatile gidecek birinin karar vermesi gereken olaylar hakkında neler söylenebilir?

1. Uygulama

Olayları İnceleme

Aşağıda bir ve birden çok olay içeren durumlar verilmiştir. Bu durumları karşılaştırarak soruları cevaplayınız.

Bir Olay İçerenler		Birden Çok Olay İçerenler	
Toplu taşıma ile gitme	Müstakil bir yerde konaklama	Arkadaşlar ile birlikte ve toplu taşıma ile gitme	Deniz kenarında veya müstakil bir yerde konaklama
Arkadaşlar ile gitme	Deniz kenarına gitme	Müstakil bir yere toplu taşıma ile gitme	

1. Birden çok olay içeren olayları nasıl tanımlarsınız?

2. Oluşturduğunuz tanımın daha önce öğrendiğiniz olay tanımı ile benzerlik ve farklılıkları nelerdir?

1. Sıra Sizde

Deney	Deneydeki Olay Sayısı	Açıklama
Bir kişinin hava yolu, kara yolu ya da demir yolundan birini seçerek seyahat etmesi		
Atılan hilesiz iki sayı küpünün üst yüzeylerine çift ve asal sayı gelmesi		
Bir hastanenin çalışanları arasından üç meslеğe (doktor, hemşire, laborant) mensup birer temsilci seçilmesi		
Bir okçunun kırmızı, yeşil ve mavi oklar arasından rastgele bir ok seçmesi		

Verilen tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Verilen dört deneyin bir veya birden çok olaydan oluşup oluşmadığını belirleyerek tespitinize ilişkin açıklamayı ilgili alana yazınız.

b) Deney kısmında boş bırakılan alanlara bir ve birden çok olay içeren deneyler yazınız. Diğer alanlara ise istenenleri yazınız.

c) Ulaştığınız sonuçları sınıfça tartışınız.

2. Uygulama

Veri İhtiyacı

Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Bir kafe işletmecisi, menüsüne yeni bir tost çeşidi eklemek ve bu ürünün satılma olasılığını belirlemek istemektedir. Buna göre işletmeci,

1. Tostların hangi özelliklerini göz önünde bulundurmalıdır?

2. Bu özelliklere ait hangi verilere ihtiyaç duymaktadır?


3. Ekmek, peynir ya da sucuğun yalnızca birinin çeşitlerine dair satış verilerinin elinde olması hâlinde menüsüne ekleyeceği tost çeşidine karar verebilir mi? Nedenleriyle açıklayınız ve sınıfça tartışınız.

Günlük hayatta hava durumu, sporcu başarıları (penaltıyı gole çevirme, üç sayılık basket atışı vb.) gibi olaylarda tekrarlar sonucu elde edilen veriler olasılık tahmini için oldukça önemlidir. Böyle durumlarda söz konusu olayın olasılık değerini tahmin edebilmek için eldeki verilerle **göreli sıklıklar** hesaplanır. Göreli sıklıklar, deneysel olasılık olarak adlandırılır.


3. Uygulama

Bir Deneyde Tekrar Sayısının Artmasıyla Deneysel Olasılık Değerinin Değişimi

Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.



1. Çark



2. Çark

Yanda verilen çarklardan birincisi sarı (S), yeşil (Y) ve mor (M); ikincisi turuncu (T) ve mavi (V) olmak üzere kendi içinde eş parçalara ayrılmıştır.

- Dörder kişilik gruplara ayrılınız. Çarklardaki oklar aynı anda çevrildiğinde 1. çarkın yeşil, 2. çarkın mavi alanları göstererek durmalarının deneysel olasılığını inceleyiniz.
- Çarkları sınıfınızda oluşturunuz.
- Grubunuzda bir kişinin deneyi gerçekleştirmesine, bir kişinin çıktıları kaydetmesine, bir kişinin sıklık grafiğini oluşturmasına ve bir kişinin göreli sıklık grafiğini oluşturmasına özen gösteriniz. Diğer görev ve yorumlamaları grupça yapınız.

Çalışmanız, uygulama sonundaki kontrol listesi ve grup değerlendirme formu ile değerlendirilecektir.

Yandaki karekodda bulunan belgede çarklar ve oklar daha büyük boyutlarda verilmiştir. Çark deneyi bu belgenin çıktısı alınarak gerçekleştirilebilir.

1. Çarklardaki oklar 25 kez çevrildiğinde oluşan çıktıları tablonun ilgili sütununa örnekteki gibi yazarak çetele, sıklık ve göreli sıklık bölümlerini çıktılara uygun ifadelerle tamamlayınız. Boş grafik şablonlarında sıklık ve göreli sıklıklara ait sütun grafiklerini oluşturunuz.

Çıktılar	Çetele	Sıklık	Göreli Sıklık
Sarı-Mavi (S-V)			

Sıklık

Çıktılar

S-V

Göreli sıklık

Çıktılar

S-V

2. Bu deneyde tekrar sayısı 50'ye çıkarılırsa grafiklerdeki dağılımda nasıl bir değişim olmasını beklersiniz?

3. Çarklardaki oklar 50 kez çevrildiğinde oluşan çıktıları, çıktıların çetelelerini, sıklık ve göreli sıklıkları aşağıdaki tabloda ilgili alanlara yazınız. Boş grafik şablonlarında sıklık ve göreli sıklıklara ait sütun grafiklerini oluşturunuz.

Çıktılar	Çetele	Sıklık	Göreli Sıklık

Sıklık

Çıktılar

Göreli sıklık


Çıktılar


4. Tekrar sayısı 50'ye çıkarıldığında elde edilen grafiklerdeki değişim, beklentinizi karşıladı mı?

5. Bu deneyde tekrar sayısı 100'e çıkarıldığında oluşabilecek sıklık ve göreli sıklık dağılımının nasıl olmasını beklersiniz?

6. Tekrar sayısının 50'ye çıkarılması durumunda oluşturduğunuz çıktıların üzerine başka bir grubun 50 tekrara ait çıktılarını ekleyerek aşağıdaki tabloyu doldurunuz ve grafikleri oluşturunuz.

Çıktılar						
Sıklık						
Göreli Sıklık						







7. Bu deneyde tekrar sayısı 500'e çıkarıldığında oluşabilecek dağılımın nasıl olmasını beklersiniz?

8. Karekodda verilen simülasyon kullanılarak tekrar sayısı 500'e ayarlandığında oluşan çıktıları, sıklık ve göreli sıklıkları aşağıdaki tablonun ilgili alanlarına yazınız. Boş grafik şablonlarında sıklık ve göreli sıklıklara ait sütun grafiklerini oluşturunuz.

Soru ile ilgili simülasyona ulaşmak için karekodu okutunuz.

Çıktılar						
Sıklık						
Göreli Sıklık						





9. Çarklardaki oklar aynı anda çevrildiğinde okların yeşil ve mavi alanlarda durmasının olasılık değerinin daha kararlı hâle gelmesi için sizce kaç tekrar yeterli olacaktır? Sınıfça tartışınız.

10. Tekrarlar sonrası (25, 50, 100 ve 500) oluşturduğunuz sıklık ve göreli sıklıklara ait sütun grafiklerindeki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

11. Yaptığınız deneyde tekrar sayısı arttıkça nelerin değiştiğini gözlemlediniz? Elde ettiğiniz sıklık ve göreli sıklıklara ait sütun grafiklerinden yararlanarak (yeşil-mavi gelmesi olayının olasılık değerine ilişkin veya göreli sıklığın değişebilirliğine ilişkin) hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? (Bir yargıya varabilmek için tekrar sayısını simülasyonla artırabilirsiniz.)

Grup değerlendirme formuna ulaşmak için karekodu okutunuz.

Kontrol listesine ulaşmak için karekodu okutunuz.

Gözleme dayalı tahmin edebilmede gerçek yaşamda sınırlılık olduğu için istatistik yazılımı yardımıyla tekrar sayısı istendiği kadar artırılabilir.

1. ÖRNEK

Aşağıdaki tabloda hilesiz iki sayı küpünün havaya atılması deneyinde üst yüzeye gelen sayıların toplamının sıklığı ve deneyin tekrar sayısı verilmiştir.

Tekrar Sayısı	Toplam										
	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
50	0	3	5	3	7	9	9	2	6	2	4
100	1	6	11	9	16	15	17	8	11	3	3
500	14	17	44	55	73	90	74	61	30	33	9
1000	32	51	77	110	132	151	137	128	96	54	32

Bu tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) 50, 100, 500 ve 1000 tekrarda oluşan sıklıklara ait sütun grafiklerini çiziniz veya istatistik yazılımları, tablolama programları gibi araçlar yardımıyla oluşturunuz.


b) Hilesiz iki sayı küpünün üst yüzeyine gelen sayıların toplamının 5 olma olayının deneysel olasılık değerini 50, 100, 500 ve 1000 tekrarda elde edilen sıklıklara göre bulunuz.

c) Tekrar sayısı arttıkça dağılımda ve ele alınan olayın deneysel olasılık değerinde oluşan değişimler nelerdir?


ç) Bu değişimlere göre bir olayın deneysel olasılık değerinin daha kararlı hâle gelmesi için kaç tekrarın yeterli olacağı söylenebilir?

▶ Çözüm


a)




Grafik 1: *50 tekrarda oluşan sıklıklara ait sütun grafiği*



Grafik 2: *100 tekrarda oluşan sıklıklara ait sütun grafiği*



Grafik 3: *500 tekrarda oluşan sıklıklara ait sütun grafiği*



Grafik 4: *1000 tekrarda oluşan sıklıklara ait sütun grafiği*

b) Hilesiz iki sayı küpünün üst yüzeyine gelen sayıların toplamının 5 olma olayının deneysel olasılık değeri,

50 tekrarda $\frac{3}{50} = 0,06$

100 tekrarda $\frac{9}{100} = 0,09$

500 tekrarda $\frac{55}{500} = 0,11$

1000 tekrarda $\frac{110}{1000} = 0,11$ olur.

c) Tekrar sayısı arttıkça dağılımda ve ele alınan olayın deneysel olasılık değerinde oluşan değişebilirlik azalmıştır. Hilesiz iki sayı küpünün üst yüzeyine gelen sayıların sıklığına ait grafik, kararlı hâle gelmiştir. Hilesiz iki sayı küpünün üst yüzeyine gelen sayıların toplamının 5 olma olayının deneysel olasılık değeri 0,11'e yaklaşma eğilimindedir.

ç) Bu değişimlere göre bir olayın deneysel olasılık değerinin daha kararlı hâle gelmesi için o deneye ait tekrar sayısının mümkün olduğunca fazla olması gerekmektedir.

Konu ile ilgili çalışma kâğıdına ulaşmak için karekodu okutunuz.

2. Sıra Sizde

Aşağıdaki tabloda üzerinde 1'den 4'e kadar sayıların yazılı olduğu iki düzgün dört yüzlünün havaya atılması deneyinde alt yüzeyine gelen sayıların toplamının sıklığı ve deneyin tekrar sayısı verilmiştir.

Tekrar Sayısı	Toplam						
	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
50	0	6	14	16	6	5	3
100	6	12	23	32	14	10	3
500	31	77	97	124	84	59	28
1000	68	118	201	229	176	139	69

Bu tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) 50, 100, 500 ve 1000 tekrarda oluşan sıklıklara ait sütun grafiklerini çiziniz veya istatistik yazılımları, tablolama programları gibi araçlar yardımıyla oluşturunuz.

Soru ile ilgili simülasyona ulaşmak için karekodu okutunuz.

b) İki düzgün dört yüzlünün alt yüzeyine gelen sayıların toplamının 4 olma olayının deneysel olasılık değerini 50, 100, 500 ve 1000 tekrardaki sıklıklara göre bulunuz.

c) Tekrar sayısı arttıkça dağılımda ve ele alınan olayın deneysel olasılık değerinde oluşan değişimler nelerdir?

Araştırma ödevi ile ilgili simülasyona ulaşmak için karekodu okutunuz.

Bütüncül dereceli puanlama anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

Araştırma Ödevi

Hilesiz bir madenî para ve hilesiz bir sayı küpünün aynı anda havaya atılması deneyine ait çıktıların 100, 200, 500, 1000 ve 10 000 kez tekrarında oluşan sıklıklarını ve göreli sıklıklarını simülasyon yardımıyla bulunuz. Buna göre

- Elde ettiğiniz göreli sıklıklara ait sütun grafiklerini istatistik yazılımı yardımıyla oluşturunuz.
- Elde ettiğiniz grafikleri değişebilirlik bağlamında değerlendiriniz.
- 100, 200, 500, 1000 ve 10 000 kez tekrar sonucunda hilesiz madenî paranın yazı ve hilesiz sayı küpünün üst yüzeyine 4 gelme olayının deneysel olasılık değerini bulunuz. Elde ettiğiniz deneysel olasılık değerlerini tekrar sayılarını göz önünde bulundurarak değerlendiriniz.
- Değerlendirme sonuçlarını sizden istenen zamanda raporlaştırınız ve arkadaşlarınızla paylaşınız.

Araştırma ödeviniz, karekod içinde verilen bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir.

Kontrol Noktası

Bir olayın aynı tekrar sayısına ait sıklık ve göreli sıklık grafiklerinin şekli, eksenlerdeki değerler hariç aynıdır.

Deneme sayısı ne kadar çok olursa ortaya çıkan olasılık değeri o kadar kararlı olur (büyük sayılar yasası). Az sayıda denemenin sonuçları, uzun vadede (tekrar sayısının artmasıyla) görülen sonuçlardan oldukça farklı olabilir.

Alıştırmalar

1. Aşağıdaki görselde çark 12 eşit bölüme ayrılmıştır. Çark rastgele çevrildiğinde çarkın ibresinin geldiği bölüm dikkate alınacaktır.



Buna göre

a) çark bir kez çevrildiğinde beyaz gelme,

b) çark bir kez çevrildiğinde 200 puan gelme,

c) çark iki kez çevrildiğinde mavi ve sarı gelme,

ç) çark bir kez çevrildiğinde 900 puan gelme,

d) çark iki kez çevrildiğinde toplam 500 puan gelme,

e) çark üç kez çevrildiğinde toplamda en az 1000 puan gelme

olaylarından hangileri birden çok olay içerir? Gerekçesiyle belirtiniz.

2. Pili doğru yönde takmayı bilmeyen bir çocuğun pili oyuncağına rastgele takması ve oyuncakta bulunan renkler dışında özdeş mavi ve yeşil tuşlardan birine rastgele basması deneyinde 50 tekrar sonucunda oluşan çıktılar ve bu çıktılara ait sıklıklar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

	Yeşil Tuşa Basma	Mavi Tuşa Basma
Pili Yanlış Takma	15	17
Pili Doğru Takma	12	6

Buna göre çocuğun gerçekleştirdiği

a) pili doğru takma ve yeşil tuşa basma,

b) pili doğru takma ve mavi tuşa basma,

c) pili yanlış takma ve yeşil tuşa basma,

ç) pili yanlış takma ve mavi tuşa basma

olaylarının olasılık değerlerini bulunuz.

3. Hilesiz üç madenî paranın havaya atılması deneyi 1500 kez tekrar edilmiştir.

Buna göre üst yüze gelen tura sayılarının göreli sıklıklarına ait sütun grafiğinin nasıl olmasını beklersiniz? Beklediğiniz grafiği çiziniz.

Konu ile ilgili daha fazla soru çözmek için karekodu okutunuz.

7.2. OLAYLARIN OLASILIĞINA İLİŞKİN TÜMEVARIMSAL AKIL YÜRÜTME

Konuya Başlarken

Ersan Ankara'dan İstanbul'a otobüs, tren veya uçak ile gitmekte; İstanbul içinde ise dolmuş veya metro kullanmaktadır. Ankara'dan yola çıkan Ersan, İstanbul içinde gitmek istediği yere 2 araç ile ulaşmıştır. Buna göre Ersan'ın Ankara'dan İstanbul içinde bir yere gitme deneyinde

a) Olası tüm çıktıların görselleştirilebileceği temsil biçimleri neler olabilir?

b) Olası tüm çıktılar görselleştirilirken nasıl bir yol izlenebilir?

c) Kişilerin seyahat seçeneklerini belirlerken ihtiyaç duydukları bilgiler neler olabilir?

4. Uygulama


Hilesiz Üç Madenî Paranın Havaya Atılması Deneyinde Oluşan Çıktıların Görselleştirilmesi

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Hilesiz üç madenî paranın havaya atılması deneyinde olası tüm çıktıları görselleştiriniz.

2. Tüm çıktıları görselleştirmek için nasıl bir yöntem kullandınız? Kullanılabilecek farklı yöntemleri arkadaşlarınızla tartışınız.

3. Hilesiz üç madenî paranın havaya atılması deneyinde bazı çıktılar aşağıdaki ağaç şemasında gösterilmiştir. Şemada boş bırakılan yerleri örnekteki gibi doldurunuz.



4. İlk adımda yaptığınız görselleştirmeyi ağaç şemasındaki çıktılara göre kontrol ediniz.

5. Hilesiz üç madenî paranın havaya atılması deneyinde olası tüm çıktıların sayısı kaçtır?

6. İstenen çıktıları oluşturmadan önce ağaç şeması oluşturmanın ne gibi faydaları olabilir?

7. Herhangi bir olayda çıktı sayısı çok daha fazla olduğunda olası tüm çıktıları görselleştirmek için nasıl bir yol izlenebilir?

Matematik Tarihinden Notlar

Kindi (801-873)

MS 801 yılında babasının vali olduğu Küfe'de doğan Kindi, eğitimini Bağdat'ta almıştır. Felsefe, tıp, astronomi, matematik, dil bilimi, müzik gibi birçok alanda başarı göstermiştir. Farklı alanlarda zengin bir bilgi birikimine sahip olan Kindi, şifrelenmiş metinlerin çözümlenmesini konu alan el yazması bir eser bırakmıştır. Günümüzde İstanbul'daki Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesinde yer alan bu eserde Kindi, başlıca şifreleme sistemi türlerini ağaç şeması kullanarak sınıflandırmıştır. Bu yönüyle Kindi, ağaç şemalarını ilk kullanan bilim insanı olmuştur.

5. Uygulama

Havaya Atılan Hilesiz İki Sayı Küpünün Üst Yüzeyine Gelen Sayılar

Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Havaya atılan hilesiz iki sayı küpünün üst yüzeyine gelen sayıların toplamının asal sayı olması olayında tüm çıktıları görselleştirmek için aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.

1. Tabloda boş bırakılan alanları örnekteki gibi doldurunuz.

Hilesiz Sayı Küpleri						
	(1, 1)					
	(2, 1)				(2, 5)	
		(3, 2)				(3, 6)
			(4, 3)	(4, 4)		
					(5, 5)	
						(6, 6)

2. Hilesiz iki sayı küpünün havaya atılması deneyinde olası tüm çıktılar kaç tanedir?


3. Hilesiz iki sayı küpünün havaya atılması deneyinde üst yüzeyine gelen sayıların toplamının asal sayı olması olayında olası tüm çıktıları listeleyiniz.

2. ÖRNEK




Yanda verilen özdeş torbaların birinde 2 sarı, 1 mavi, 1 yeşil; diğerinde 2 gri, 1 siyah, 1 turuncu renkte toplar bulunmaktadır. Torbalardaki toplar renkleri dışında özdeştir. Bu torbaların ikisinden aynı anda birer top çekilecektir. Çekilen toplardan birinin mavi, diğerinin gri olma olayına ait tüm çıktıları görselleştiriniz. Görselleştirdiğiniz tüm çıktılar arasından istenen çıktıları belirtiniz.

Çözüm




Yandaki görselde I. torbadaki toplardan II. torbadaki toplara çekilen 16 $(4 \cdot 4)$ çizgi yer almaktadır. Bu 16 çizgi tüm çıktıları gösterirken farklı renkte çekilen iki çizgi istenen çıktıları göstermektedir. (Sistematik liste oluşturma aşamasında bu şekilde bir gösterim yapmak, çıktıları fark etmek açısından kolaylık sağlayabilir.)

Olası tüm çıktılar sistematik liste yöntemiyle aşağıdaki şekilde görselleştirilebilir. Bu gösterimde çerçeve içine alınmış çıktılar, istenen çıktıları göstermektedir.




3. ÖRNEK

"Aşağıdaki deneylerde olası tüm çıktıları belirlemek amacıyla görselleştirme araçlarından (sistematik liste, tablo ve ağaç şeması) hangisini seçersiniz?", "Söz konusu seçimi yapmanızın nedeni nedir?" sorularına cevap vererek tablodaki ilgili alanları doldurunuz.

Deney		Görselleştirme Aracı	Açıklama
	Yüzeylerinde farklı sayılar yazan düzgün dört yüzlünün ve sayı küpünün atılması		
	3 torbadan topların çekilmesi		
	Biri 12, diğeri 8 eş bölüme ayrılmış iki çarkın çevrilmesi		

Çözüm

Deney		Görselleştirme Aracı	Açıklama
	Yüzeylerinde farklı sayılar yazan düzgün dört yüzlünün ve sayı küpünün atılması	Tablo	Ele alınan deney bağlamında yalnızca 2 olay ve bu olayların çıktı sayılarının az olması nedeniyle tablo yapılması kolaylık sağlayabilir.
	3 torbadan topların çekilmesi	Ağaç Şeması	Ele alınan deney bağlamında 3 olay olduğundan her olay için bir dalın çizilebileceği ağaç şeması kolaylık sağlayabilir.
	Biri 12, diğeri 8 eş bölüme ayrılmış iki çarkın çevrilmesi	Sistematik Liste	Ele alınan deney bağlamında çıktı sayısı fazla olduğu fakat genelde çıktılar tekrar ettiği için sistematik liste kolaylık sağlayabilir.

3. Sıra Sizde



Yukarıda kendi içinde eş bölmelere ayrılmış çarklardan birinin bölmeleri yeşil, mor ve mavi; diğerinin bölmeleri ise pembe ve gri renklerle boyanmıştır. Bu çarklardaki oklar aynı anda çevrilecektir.

a) Bu deneye ait olası tüm çıktıları ağaç şeması, tablo ve sistematik liste yöntemleri ile görselleştirerek aşağıdaki ilgili alanları doldurunuz. Çarklardaki oklardan birinin yeşil, diğerinin pembe gelme olayına ait çıktıları belirleyiniz.

Ağaç Şeması

Tablo

Sistematik Liste

b) Kullandığınız farklı görselleştirme yöntemlerinin sağladığı kolaylıkları tartışınız.

Konu ile ilgili çalışma kâğıdına ulaşmak için karekodu okutunuz.

Olayların teorik olasılık değeri hesaplanırken olası tüm çıktılar görselleştirilir. Görselleştirilen olası tüm çıktılar içinden istenen çıktılar belirlenir. İstenen çıktıların sayısının olası tüm çıktıların sayısına oranı, incelenen olayın teorik olasılık değerini verir.

$$\text{Olayın teorik olasılık değeri} = \frac{\text{Olaya ait çıktıların sayısı}}{\text{Olası tüm çıktıların sayısı}}$$

4. ÖRNEK

Havaya atılan hilesiz iki sayı küpünün üst yüzeyine gelen sayıların çarpımının 6'ya kalansız bölünebilme olayının teorik olasılık değerini bulunuz.

Çözüm

Havaya atılan hilesiz iki sayı küpünün üst yüzeyine gelen sayıların çarpımının 6'ya kalansız bölünebilme olayının teorik olasılık değerini hesaplayabilmek için olası tüm çıktılar yandaki tabloda görselleştirilmiştir. Tabloda maviye boyanmış hücreler, istenen çıktıları belirtmektedir.

Hilesiz Sayı Küpleri	1	2	3	4	5	6
1	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	(1, 5)	(1, 6)
2	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	(2, 4)	(2, 5)	(2, 6)
3	(3, 1)	(3, 2)	(3, 3)	(3, 4)	(3, 5)	(3, 6)
4	(4, 1)	(4, 2)	(4, 3)	(4, 4)	(4, 5)	(4, 6)
5	(5, 1)	(5, 2)	(5, 3)	(5, 4)	(5, 5)	(5, 6)
6	(6, 1)	(6, 2)	(6, 3)	(6, 4)	(6, 5)	(6, 6)

Tablo incelendiğinde olası tüm çıktıların sayısının 36, istenen çıktıların sayısının 15 olduğu görülür. Buna göre havaya atılan hilesiz iki sayı küpünün üst yüzeyine gelen sayıların çarpımının 6'ya kalansız bölünebilme olayının olasılık değeri

$\frac{15}{36} = \frac{5}{12}$ şeklinde bulunur.

4. Sıra Sizde

	Gözlüklü	Gözlüksüz	Toplam
Kız			
Erkek			
Toplam			

Bir sınıftaki 48 öğrenciden 28'i kızdır. Kızların 8'i, erkeklerin 6'sı gözlüklüdür.

Buna göre bu sınıftan seçilecek bir öğrencinin gözlüklü veya erkek öğrenci olma olayı ile gözlüksüz ve erkek öğrenci olma olayının olasılık değerlerini yanda verilen tablo gösteriminden yararlanarak ayrı ayrı bulunuz.

6. Uygulama

Olayların Olasılık Değerlerini Hesaplama

Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Görselde 8 eşit parçaya ayrılmış ve her parçasında sırasıyla 1'den 8'e kadar rakamların yazılı olduğu bir çark ve üzerinde 1, 2, 3, 4, 6 yazan 5 özdeş topun bulunduğu bir kutu verilmiştir.





1. Çark bir kez çevrildiğinde ibrenin gösterdiği yere gelen sayıya ve kutudan çekilen topa ait deneyin tüm çıktılarını görselleştiriniz.

2. Çarktaki parçalardan herhangi birinin ibrenin gösterdiği parça olma olasılık değeri, diğer parçaların gösterilme olasılık değerine ya da kutudaki toplardan herhangi birinin seçilme olasılık değeri, diğer topların seçilme olasılık değerine göre farklı mıdır? Açıklayınız.

3. Çark bir kez çevrildiğinde okun gösterdiği yere gelen sayının asal sayı olma olayı veya kutudan çekilen topun üzerinde tek sayı yazma olayı A olsun. A olayını oluşturan olayları B ve C olayı olarak ifade ediniz.

4. B ve C olaylarının istenen çıktılarını bulunuz.

5. Çark bir kez çevrildiğinde ibrenin gösterdiği yere gelen sayının asal sayı olma olayı ve kutudan çekilen topun üzerinde tek sayı yazma olayı D olsun. B, C ve D olaylarının olasılık değerlerini elde ediniz.

6. A olayının istenen çıktılarını elde ediniz ve bu olayın olasılık değerini hesaplayınız.

7. Bu deneyde incelenen B, C ve D olaylarının olasılık değerleri kullanılarak A olayının olasılık değeri bulunabilir mi? Açıklayınız.

8. Hangi olayların ortak çıktısı vardır, hangilerinin yoktur? Ortak çıktısı olan olaylardan oluşan olayın olasılık değerini hesaplarken neler fark ettiniz? Açıklayınız.

A ile B **ayrık olmayan olaylar** ve E olası tüm çıktıların kümesi olmak üzere

$$\frac{s(A \cup B)}{s(E)} = \frac{s(A)}{s(E)} + \frac{s(B)}{s(E)} - \frac{s(A \cap B)}{s(E)} \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \text{ olur.}$$

A ve B **ayrık olaylar** olmak üzere

$$\frac{s(A \cup B)}{s(E)} = \frac{s(A)}{s(E)} + \frac{s(B)}{s(E)} \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B) \text{ olur.}$$

Ayrık Olay ve Ayrık Olmayan Olay

Aynı örnek uzaya ait iki olayın ortak çıktısı yoksa bunlar **ayrık olaylar**, ortak çıktısı varsa **ayrık olmayan olaylar** olur.

5. ÖRNEK

	Pazartesi	Salı	Çarşamba
Resim Kursları	Yağlı Boya	Ebru	Grafiti
Spor Kursları	Futbol	Basketbol	Voleybol
Müzik Kursları	Bağlama	Gitar	Keman

Yandaki listede bir halk eğitim merkezinin verdiği kurslar ve kursların günleri yer almaktadır. Resim kursları mavi, spor kursları yeşil, müzik kursları mor renk ile yazılmıştır. Buna göre yalnızca 1 kursa giden Kerim'in pazartesi günü veya spor kurslarından birine gitmesinin olasılık değerini bulunuz.

Çözüm

1. Yol

Tabloda görüldüğü üzere halk eğitim merkezinde toplam 9 kurs bulunmaktadır. Kerim'in pazartesi günü olan kurslardan birine gitmesi olayı A, spor ile ilgili kurslardan birine gitmesi olayı B olsun. Buna göre pazartesi günü 3 kurs olduğundan $P(A) = \frac{3}{9}$, spor ile ilgili 3 kurs olduğundan $P(B) = \frac{3}{9}$ olur.

Kerim'in pazartesi günü ve spor kurslarından birine gitmesi $A \cap B$ olarak ifade edilebilir. Buna göre $A \cap B = \{\text{Futbol}\}$ olduğundan $P(A \cap B) = \frac{1}{9}$ olur. Buradan

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= \frac{3}{9} + \frac{3}{9} - \frac{1}{9} \\ &= \frac{5}{9} \text{ bulunur.} \end{aligned}$$

2. Yol

	Pazartesi	Salı	Çarşamba
Resim Kursları	Yağlı Boya	Ebru	Grafiti
Spor Kursları	Futbol	Basketbol	Voleybol
Müzik Kursları	Bağlama	Gitar	Keman

Yandaki tabloda sarıya boyanmış hücreler pazartesi günü veya spor kurslarını göstermektedir. Görüldüğü üzere sarıya boyanmış hücrelerin sayısı 5'tir. Buna göre Kerim'in pazartesi günü veya spor kurslarından birine gitmesinin olasılık değeri $\frac{5}{9}$ bulunur.

5. Sıra Sizde

Yandaki tabloda bir firmanın tanıtım amaçlı ürettiği 15 aracın benzinli veya elektrikli modellerinde var olan özellikler "X" ile gösterilmiştir. Araçlar yalnızca İstanbul, Ankara ve İzmir şubelerinde beşer adet olmak üzere satışa sunulmuştur. Şubelerdeki 5 aracın her biri farklı donanımlara sahiptir.

Donanım	Yakıt Tipi	
	Benzinli	Elektrikli
Deri Koltuk	X	
Koltuk Isıtma-Soğutma		X
Cam Tavan	X	X
Hayalet Gösterge		X

Buna göre

a) Satın alınan bir aracın elektrikli olma ve İzmir şubesinden alınma olasılık değerini bulunuz.

b) Satın alınan bir aracın benzinli olma veya İstanbul şubesinden alınma olasılık değerini bulunuz.

c) Satın alınan bir aracın cam tavanlı olma veya Ankara şubesinden alınma olasılık değerini bulunuz.

6. ÖRNEK

Cihaz	Marka		
	A Marka	B Marka	C Marka
Tablet	12	14	8
Telefon	15	11	14
Televizyon	10	0	9
Akıllı Saat	15	13	0
Kablosuz Kulaklık	0	16	9

Yandaki tabloda bir teknoloji mağazasının 2024 Kasım ayında sattığı A, B ve C markalarına ait cihazların adetleri verilmiştir. Buna göre mağazadan alınan bir ürünün B marka veya televizyon olma olayının olasılık değerini bulunuz.

Çözüm

Cihaz	Marka		
	A Marka	B Marka	C Marka
Tablet	12	14	8
Telefon	15	11	14
Televizyon	10	0	9
Akıllı Saat	15	13	0
Kablosuz Kulaklık	0	16	9

Mağazadan alınan bir ürünün B marka olma olayı K, televizyon olma olayı L olsun. Mağazada B marka televizyon satılmadığından K ve L olayları ayrık olaylardır.

Tabloda yeşile boyanmış hücreler B marka ürünlere ait olduğundan $P(K) = \frac{54}{146}$ olur.


Maviye boyanmış hücreler televizyonlara ait olduğundan $P(L) = \frac{19}{146}$ olur.

Böylece mağazadan alınan bir ürünün B marka veya televizyon olma olayının olasılık değeri

$$P(K \cup L) = P(K) + P(L)$$
$$= \frac{54}{146} + \frac{19}{146} = \frac{73}{146} = \frac{1}{2} \text{ bulunur.}$$

6. Sıra Sizde





Yanda kendi içinde eş bölmelere ayrılmış çarklardan birinin bölmelerine 1, 1, 2, 2, 3; diğerinin bölmelerine ise 1, 2, 3 sayıları yazılmıştır. Bu çarklardaki oklar aynı anda çevrilecektir.

Buna göre okların gösterdiği sayıların çarpımının 3 veya 4 ile tam bölünebilme olayının olasılık değerini bulunuz.

Konu ile ilgili etkileşimli içeriğe ulaşmak için karekodu okutunuz.

Deneysel Olasılıktan Teorik Olasılığa

7. Uygulama


Deneysel ve Teorik Olasılık Değerlerinin Karşılaştırılması

Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Bu uygulamada havaya atılan hilesiz üç madenî paranın üst yüzlerine 2 yazı, 1 tura gelme olayı incelenecektir. Bu incelemede hilesiz madenî paralar ya da paraların havaya atış simülasyonu kullanılmaktadır. Buna göre

Uygulama ile ilgili simülasyona ulaşmak için karekodu okutunuz.

1. Verilen olayın teorik olasılık değerini incelemek için ağaç şemasını doldurunuz ve istenen çıktıları belirtiniz.



2. Deneye ait tekrar sayısı arttıkça deneysel olasılık değeri ile teorik olasılık değeri arasındaki farkın yaklaştığı değerin kaç olmasını beklersiniz?

3. Verilen olayın deneyine ait 50 tekrar sonucu oluşan çıktılara göre tabloyu doldurunuz.

Sıklık	Göreli Sıklık (Deneysel Olasılık Değeri)	Teorik Olasılık Değeri	Deneysel ve Teorik Olasılık Değerlerinin Farkı

4. Verilen olayın deneyine ait 150 tekrar sonucu oluşan çıktılara göre tabloyu doldurunuz.

Sıklık	Göreli Sıklık (Deneysel Olasılık Değeri)	Teorik Olasılık Değeri	Deneysel ve Teorik Olasılık Değerlerinin Farkı

5. Verilen olayın deneyine ait 500, 1500 ve 5000 tekrar sonucu oluşan çıktılara göre tabloyu doldurunuz.

Tekrar Sayısı	Sıklık	Göreli Sıklık (Deneysel Olasılık Değeri)	Teorik Olasılık Değeri	Deneysel ve Teorik Olasılık Değerlerinin Farkı
500				
1500				
5000				

6. Deneyin tekrar sayısı arttıkça verilen olayın deneysel ve teorik olasılık değerleri arasındaki fark, beklediğiniz değere yaklaştı mı? Yukarıda yer alan işlem adımlarını tekrar gözden geçirerek bu durumu sorgulayınız.

7. ÖRNEK

Bezelyelerde sarı tohum rengi aleli (S), yeşil tohum rengi aleline (s); düzgün tohum şekli aleli (D), buruşuk tohum şekli aleline (d) tam baskındır.

	SD	Sd	sD	sd
sD	SsDD	ssDd	ssDD	ssDd
sd	SsDd	Ssdd	ssDd	ssdd
sD	SsDD	SsDd	ssDD	ssDd
sd	SsDd	Ssdd	ssDd	ssdd

SsDd genotipine sahip bezelye tohumu ile ssDd genotipine sahip bezelye tohumunun çaprazlanması sonucu oluşan tohumların genotipleri yandaki tabloda gösterilmiştir.

SsDd genotipine sahip bezelye tohumu ile ssDd genotipine sahip bezelye tohumunun çaprazlanması sonucu oluşan tohumların sarı ve düzgün fenotipte olma olasılık değeri $\frac{5}{16}$ olur. Buna göre SSDd genotipine sahip bezelye tohumu ile Ssdd genotipine sahip bezelye tohumunun çaprazlanması sonucu oluşan tohumların sarı ve düzgün fenotipte olma olasılık değerini bulunuz.

Çözüm

SSDd genotipine sahip bezelye tohumu ile Ssdd genotipine sahip bezelye tohumunun çaprazlanması sonucu oluşan tohumların genotipleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	SD	Sd	SD	Sd
Sd	SSDd	SSdd	SSDd	SSdd
sd	SsDd	Ssdd	SsDd	Ssdd
Sd	SSDd	SSdd	SSDd	SSdd
sd	SsDd	Ssdd	SsDd	Ssdd

Buna göre SSDd genotipine sahip bezelye tohumu ile Ssdd genotipine sahip bezelye tohumunun çaprazlanması sonucu oluşan tohumların sarı ve düzgün fenotipte olma olasılık değeri $\frac{8}{16} = \frac{1}{2}$ bulunur.


7. Sıra Sizde

Yatırım Araçları	Eğitim Durumu		
	Lise ve Altı	Ön Lisans	Lisans ve Üzeri
Gayrimenkul	3	5	21
Altın	12	10	50
Banka Mevduatı	16	28	83
Menkul Kıymetler	41	51	176

Yandaki tabloda 496 kişinin eğitim durumlarına göre hangi yatırım aracını seçtiği gösterilmektedir.

Buna göre rastgele seçilen bir kişinin ön lisans mezunu veya altına yatırım yapan biri olma olasılık değerini bulunuz.

8. Sıra Sizde



Bir gübreleme şirketinden salı günü haber alan Esma Hanım, salıdan sonraki 10 günün herhangi birinde tarlasının gübreleneceğini öğrenmiştir. Bu 10 günün hava tahmin raporu yandaki görselde verilmiştir.

Buna göre Esma Hanım'ın tarlasının gübrelendiği gün havanın yağmursuz veya 17 °C'tan sıcak olma olayının olasılık değerini bulunuz.

9. Sıra Sizde

Marka	A	B	C	D	E
Arz	5000	4000	6000	5500	4500
Talep	5000	6000	4000	4500	5500

Bir toptancı 5 farklı markadan aynı fiyata sahip siyah, beyaz ve kırmızı renklerde çantalar almıştır. Çantaların markalara göre arz talep durumları (adet) yandaki tabloda gösterilmiştir.

Buna göre mağazasına rastgele bir çanta alacak mağaza sahibinin aldığı çantanın arzının talepten az olmama ve çantanın kırmızı olma olasılık değerini ağaç şeması kullanarak bulunuz.

Performans Görevi

Yeni Bir Sayı Küpü

Bu görevde sizden yüzeylerinde 1, 1, 2, 3, 3, 4 yazan hilesiz iki sayı küpü simülasyonu kullanarak sayı küplerinin üst yüzeylerine gelen sayıların toplamına ait sıklık, göreli sıklık ve ağaç şemasını elde etmeniz; bunları kullanarak oluşturduğunuz raporu sunmanız beklenmektedir.

Performans görevi ile ilgili simülasyona ulaşmak için karekodu okutunuz.

Göreve başlamadan önce aşağıdaki hususa dikkat ediniz.

- Teknoloji kullanımında sınıf arkadaşlarınız ile iş birliği yapınız.

Görev esnasında aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

- Simülasyonu kullanarak 50, 150, 300, 900, 1800 ve 3000 tekrardan oluşan sıklıkları ve göreli sıklıkları hesaplayınız.
- Hesapladığınız göreli sıklıklara ait grafikleri oluşturunuz.
- Oluşturduğunuz grafikleri değişebilirlik bağlamında değerlendiriniz.
- Teorik olasılık değerini elde etmek için yaptığınız deneyi görselleştiriniz ve küplerin üst yüzeylerine gelen sayıların toplamının 5 olma olayına ait çıktıları belirtiniz.
- Küplerin üst yüzeylerine gelen sayıların toplamının 5 olma olayına ait aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Tekrar Sayısı	Deneysel Olasılık Değeri	Teorik Olasılık Değeri	Deneysel ve Teorik Olasılık Değeri Arasındaki Fark
50			
150			
300			
900			
1800			
3000			

- Tablo ve grafikleri eksiksiz oluşturunuz.
- Çalışma sırasında yapılanları kaydediniz.
- Tekrar sayısı arttıkça deneysel ve teorik olasılık değeri arasındaki fark nasıl değişmektedir? Nedenleriyle açıklayınız.

Görev bitiminde aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

- Çalışma notlarını, tabloları ve grafikleri sınıf arkadaşlarınız ile paylaşınız.
- Bu görevi zamanında öğretmeninize teslim ediniz.

Performans göreviniz, karekod içinde verilen analitik dereceli puanlama anahtarı ile öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir.

Öz değerlendirme formuna ulaşmak için karekodu okutunuz.

Analitik dereceli puanlama anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

Kontrol Noktası

Bir olayın deneyine ait tekrar sayısı arttıkça olaya ait deneysel olasılık değeri, teorik olasılık değerine yaklaşma eğilimindedir.

Alıştırmalar

1. Valizinde üst giyim olarak 2 gömlek, 3 kazak; alt giyim olarak 2 kot, 1 kumaş pantolonu olan Yavuz 1 üst ve 1 alt giyimi rastgele seçip giyecektir.

Buna göre Yavuz'un bir gömlek veya bir kumaş pantolon giyme olayının olasılık değerini bulunuz.

2. Aşağıda diyet yapan birinin dolabındaki besinlerin 100 gramındaki kalori değerleri verilmiştir.

Meyve	Sebze	İçecek
Kivi (30 kcal)	Siyah Turp (30 kcal)	Şalgam (30 kcal)
Kavun (33 kcal)	Pazı (33 kcal)	Ihlamur (42 kcal)
Nar (63 kcal)	Roka (33 kcal)	Limonata (21 kcal)
	Tere (33 kcal)	Portakal Suyu (45 kcal)
	Brüksel Lahanası (63 kcal)	
	Haşlanmış Mısır (91 kcal)	

Buna göre listeden rastgele seçilen bir besinin meyve olma veya kalori değerinin 33 kcal olma olayının olasılık değerini bulunuz.


3.

	Futbol	Hentbol
Alfa Spor Kulübünün Kazanma Sayısı	24	34
Beta Spor Kulübünün Kazanma Sayısı	32	47
Berabere Bitme Sayısı	13	23

Yukarıdaki tabloda Alfa ve Beta spor kulüplerinin geçmişte futbol ve hentbol branşlarında yaptıkları maçların sonuçları verilmiştir.

Buna göre aynı anda yapılan futbol ve hentbol maçlarının berabere bitme olasılık değerini bulunuz.

4. Galip Bey, arabasını aşağıda görseli verilen 10 araçlık otoparka park edecektir.



Buna göre arabanın P yazan yerlerden birine ve arka farlarının çim tarafına denk gelmesinin olasılık değerini bulunuz.

5. $x, y \in \mathbb{N}$; $0 \leq x \leq 4$, $0 \leq y \leq 4$ olan x ve y değerlerinden rastgele seçilen (x, y) noktasının $y = 5x$ veya $2y = x$ doğrusu üzerinde olma olayına ait deneyin istatistik yazılımları yardımıyla 50, 150, 250, 500 ve 1000 tekrarında oluşan sıklıkların bazıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tekrar Sayısı	50	150	250	500	1000
Seçilen Noktanın $y = 5x$ veya $2y = x$ Doğrusu Üzerinde Olma Sıklığı	7			57	
Seçilen Noktanın $y = 5x$ veya $2y = x$ Doğrusu Üzerinde Olmama Sıklığı		126	210		879

Seçilen (x, y) noktasının $y = 5x$ veya $2y = x$ doğrusu üzerinde olma olayına ait deneysel ve teorik olasılık değerleri ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Aşağıdaki tabloyu verilen tekrar sayılarına göre hesaplama yaparak doldurunuz.

Tekrar Sayısı	50	150	250	500	1000
Deneysel Olasılık Değeri					
Teorik Olasılık Değeri					
Deneysel ve Teorik Olasılık Değerleri Arasındaki Fark					

b) Deneyin tekrar sayısı arttıkça verilen olayın deneysel ve teorik olasılık değerleri arasındaki fark hangi sayıya yaklaşmaktadır? Nedenleriyle açıklayınız.

6. A Rh+ (A0Rr) kan grubuna ait bir anne ile B Rh+ (B0Rr) kan grubuna ait bir babanın çocuğunun AB Rh+ kan grubuna ait olma olasılık değerini bulunuz (R geni r genine baskın, A geni 0 genine baskın ve B geni 0 genine baskındır.).

Konu ile ilgili daha fazla soru çözmek için karekodu okutunuz.


Farklı Kaydet

Bu temada öğrendiğiniz bilgileri kendi hatırlayacağınız şekilde bu alana kısaca not edebilirsiniz.


Ölçme ve Değerlendirme

Bu bölümde cevaplamanız için farklı soru tiplerinde 6 adet soru bulunmaktadır.
Ölçme ve değerlendirme bölümünün sonunda verilen karekodu okutarak ek sorulara ulaşabilirsiniz.


1. Bir şirket alacağı gülen yüz çıkartma makinesinin baskı performansını değerlendirmek için 4 deneme yapmış ve bu denemelerde 11 gülen yüz çıkartmasından sırasıyla rastgele 50, 150, 1500 ve 5000 adet çıkartma bastırmıştır. Yaptığı denemelerde sırası ile 3, 5, 77 ve 217 kez hatalı baskı tespit etmiştir. Şirket çalışanları her denemede elde ettikleri 11 ürün ve 1 hatalı ürün için göreli sıklık grafikleri oluşturmuştur. Şirketin bilgisayarında oluşan bir hata sonucu grafiklerdeki dikey eksende yer alan değerler silinmiştir. Şirketin elinde kalan grafikler aşağıda verilmiştir.




Grafik 1



Grafik 2



Grafik 3



Grafik 4

Buna göre

a) Hangi grafiğin hangi deneme sayısına ait olduğunu belirleyiniz.

b) Makinenin hatalı çıkartma basma olayına ait teorik olasılık değeri hakkında yorum yapınız.

2. Bir mağaza, 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bu mağazadan alışveriş yapan müşterilerin kaydını tutan bir mağaza çalışanı, aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır.

Zaman Aralığı	Kişi Sayısı			
	30 Kişi	80 Kişi	150 Kişi	300 Kişi
10.00-11.59	2	9	17	38
12.00-13.59	11	15	40	61
14.00-15.59	10	23	43	95
16.00-17.59	4	26	33	69
18.00-19.59	3	7	17	37

Buna göre


a) 30, 80, 150 ve 300 kişinin alışveriş yaptığı saatlerin dağılımına uygun sütun grafikleri oluşturunuz.

b) Bu mağazadan alışveriş yapan bir kişinin 12.00-13.59 saatleri arasında alışveriş yapma olasılık değerini 30, 80, 150 ve 300 kişiye göre hesaplayınız.


c) Yeni çıkan ürünlerinizin tanıtımını yapmak için mağazadan 2 saatliğine stant kurma talebinde bulunduğunuzu varsayınız. **30 kişi ile oluşan sıklıkları ele aldığınızda tanıtımı hangi zaman aralıklarında yaparsınız?**


ç) c seçeneğinde belirlediğiniz zaman aralığı, 300 kişinin sıklığı göz önüne alındığında doğru bir karar mıdır? Nedenleriyle açıklayınız.


3. Aşağıdaki çarklar eş parçalara ayrılmıştır. Bu çarkların çevrilmesi sonucunda okların gösterdiği sayıların çarpımları incelenecektir.





Bu deneyin 6500 tekrarında oluşacak dağılımın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir?

A)


B)


C)


D)


E)


4. Bir içecek otomatında özdeş şişeler içinde şerbet, limonata ve maden suyu bulunmaktadır. 17 şerbetin 8'i, 22 limonatanın 12'si ve 20 maden suyunun 9'u sıcaktır. Bu otomat, içeceklerden birini rastgele vermektedir.


Buna göre

a) Otomatın verdiği içeceğin soğuk bir içecek veya limonata olma olayının olasılık değerini görselleştirerek bulunuz.


b) Otomata bu içeceklerden en az kaç tane daha eklenirse otomatın rastgele vereceği bir içeceğin şerbet, limonata ve maden suyu olma olaylarının olasılık değeri eşit olur?


c) Otomata bu içeceklerden en az kaç tane daha eklenirse otomatın rastgele vereceği bir içeceğin sıcak ve soğuk olma olaylarının olasılık değeri eşit olur?


5. Aşağıdaki görselde üzerinde a, b, c ve d yazan özdeş dört topun bulunduğu bir kutu ve üzerinde 1, 2, 3 rakamlarının yazılı olduğu üç eş dilime ayrılmış bir çark yer almaktadır.





Çekilen topun geri atılması şartıyla kutudan bir top çekme ve çark çevirme deneyinin 5000 tekrarı sonucunda oluşan çıktıların sıklık dağılımının aşağıdaki grafiklerden hangisi gibi olmasını beklersiniz?

A)


B)


C)


D)


E)


6. Aşağıdaki tabloda Sibel Hanım'ın işe giderken kullanabildiği caddeler ve o caddelerde bir yıl boyunca (365 gün) trafiğin durma noktasına geldiği gün sayıları verilmiştir. Sibel Hanım işe gitmek için bu caddelerden herhangi ikisini kullanmak zorundadır.

Cadde	Gün
Yalnız 1. Cadde	21
Yalnız 2. Cadde	18
Yalnız 3. Cadde	22
Yalnız 1 ve 2. Cadde	7
Yalnız 2 ve 3. Cadde	6
Yalnız 1 ve 3. Cadde	8
1, 2 ve 3. Cadde	4

Buna göre Sibel Hanım'ın kullanabileceği cadde çiftlerinden hangisinde trafiğin durma noktasına gelme olasılık değerinin en çok olduğunu bulunuz.

Tema ile ilgili daha fazla soru çözmek için karekodu okutunuz.

SÖZLÜK

A-D-F

alel : Homolog kromozomların özel bir loküsünde yerleşmiş bir genin alternatif biçimleri.

arz : Piyasaya mal sürülmesi; sunu.

deniz feneri : Kıyıların tehlikeli yerlerinde, bazı kaya ve adacıkların üzerinde geceleri deniz taşıtlarına yol gösteren, tepesinde güçlü bir ışık kaynağı olan ışık kulesi; fener.

desen : Görsel bir etki yaratmak amacıyla yapılmış çizgi resimlerin hepsi.

dönme : Biçimi değişmeyen bir şeklin ekseni çevresindeki hareketi.

fenotip : Bir organizmanın genetik yapısına bağlı olarak, dış etkenlerin de etkisiyle ortaya çıkan görünüşü.

fırkateyn : Üç direkli, bir tür yelkenli savaş gemisi.

G-I-K

gayrimenkul : Taşınmaz.

genotip : Bir canlının genlerinin bütünü.

gölet : Birikinti suların sulamak amacıyla genellikle bir set ardında toplandığı küçük göl; gölcük, gölek, büvet (I), büğet.

gönye : Dik açıları ölçmeye ve çizmeye yarayan dik üçgen biçiminde araç.

grafiti : Duvarlara özel yazı teknikleri kullanılarak yazılan yazı.

ışık ışını : Yayılan ışığın izlediği doğru.

ışık yılı : Işığın bir yılda aldığı yol.

kompost : Bitki artıklarından yapılan gübre.

L-M-P

laborant : Araştırmalarda, laboratuvar deneylerinde yardımcı olarak çalıştırılan kimse.

lazer : Çok güçlü pırıltılar oluşturan, değişik alanlarda kullanılan yoğunlaşmış ışık kaynağı.

lisans : Bu öğrenim sonunda elde edilen ve diploma ile belgelendirilen akademik derece.

mekanizma : Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi; tertibat, düzenek, sistem.

menkul kıymetler : Senet, bono, tahvil, hisse senedi vb. taşınır değerler; kâğıt.

mevduat : Belli bir süre sonunda veya istenildiğinde çekilmek üzere bankalara faizle yatırılan para, tevdiat.

mikrofon : Elektrik akımı etkisiyle sesi uzakta bulunan alıcıya ulaştıran araç.

parsel : İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçası.

pervane : Döndüğünde bir mekanizmayı işleten bir eksene dikey olarak bağlanmış, iki veya ikiden çok kanattan yapılmış alet; uskur.

R-S-T

rafting : Özel botlarla debisi yüksek ırmaklarda yapılan bir spor türü.

resif : Su düzeyindeki sıra kayalar.

rüzgâr türbini : Rüzgârın gücü kullanılarak oluşturulan enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren sistem.

sera : Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer; limonluk, ser (II), tavhane.

simülasyon : Sanayi, bilim ve eğitimde gerçek olayları, işlemleri deney koşulları altında oluşturarak bu olayları inceleme ve araştırmaya yönelik çözümleme tekniği; öğrence.

teorem : Doğruluğu kanıtlanabilen önerme.

KAYNAKÇA

Akkuş, R., Boz Yaman, B., Duatepe Paksu, A., Bulut, S., ve Toluk Uçar, Z. (Ed.). (2022). *Geometri öğretim bilgisi*. Ankara: Pegem Akademi.

Allen, J. D., Anderson, D., Becker, J., Cook, R., Davis, M., Edberg, P., ... & Jenkins, J. H. (2012). *The unicode standard version 7.0* – Core specification. Mountain View, CA: Unicode Consortium.

al-Jazarī, I. A. R. (1973). *The book of knowledge of ingenious mechanical devices: (Kitāb Fī Ma'rifat Al-hiyal Al-handasiyya)*. Netherlands: Springer.

Al-Kadit, I. A. (1992). Origins of cryptology: The Arab contributions. *Cryptologia*, *16*(2), 97-126.

Arkhipov, G. I., & Chubarikov, V. N. (2016). Anatoly Alekseevich Karatsuba. *Chebyshevskii Sbornik*, *16* (1), 32-51.

Baraka, A., Salem, R. M., & Joseph, N. J. (1998). The origin of the "algorithm". *The Journal of the American Society of Anesthesiologists*, *89* (1), 277-277.

Conway, J. H., & Guy, R. (1998). *The book of numbers*. New York, NY: Springer Science & Business Media.

Creţ, O., Mathe, Z., Grama, C., Văcariu, L., Roman, F., & Dărăbant, A. (2006, July). Solving the maximum subsequence problem with a hardware agents-based system. *Proceedings of the 10th WSEAS international conference on Circuits* (s. 75-80) içinde.

Crossley, J. N., & Henry, A. S. (1990). Thus spake al-Khwārizmī: A translation of the text of Cambridge University Library Ms. Ii. vi. 5. *Historia Mathematica*, *17* (2), 103-131.

Desurvire, E. (2009). *Classical and quantum information theory: An introduction for the telecom scientist*. New York, NY: Cambridge University Press.

Dode, A., & Hasani, S. (2017). PageRank algorithm. *IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE), 19*(1), 01-07.

Dwivedi, S. P. (2013, Eylül). An efficient multiplication algorithm using Nikhilam method. *Fifth International Conference on Advances in Recent Technologies in Communication and Computing (ARTCom)* konferansında sunulan bildiri. Bangalore, IET.

Eren, Z. ve Taşarsu, N. (2023). Katı atıkların geri dönüşümü için depozito iade sisteminin önemi: Kızılcahamam pilot uygulaması örneği, *Çevre, İklim ve Sürdürülebilirlik, 24*(2), 65–74.

Hegde, N., & Deepthi, P. (2015). Pollard RHO algorithm for integer factorization and discrete logarithm problem. *International Journal of Computer Applications*, *121* (18), 14-17.

Jungnickel, D., & Jungnickel, D. (2005). *Graphs, networks and algorithms* (Vol. 3). Berlin: Springer.

Keys, A., Fidanza, F., Karvonen, M. J., Kimura, N., & Taylor, H. L. (1972). Indices of relative weight and obesity. *Journal of Chronic Diseases*, *25* (6-7), 329-343.

Maurer, U. M., & Wolf, S. (2000). The diffie–hellman protocol. *Designs, Codes and Cryptography, 19*(2), 147-171.

Murty, M. N., Padhy, B., & Rao, B. J. (2020). Some fascinating observations on Harshad numbers and amicable pairs. *IOSR Journal of Mathematics (IOSR-JM), 16*(3), 60-66.

Rivest, R. L., Shamir, A., & Adleman, L. (1978). A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems. *Communications of the ACM*, *21* (2), 120-126.

Shallit, J. (1994). Origins of the analysis of the Euclidean algorithm. *Historia Mathematica*, *21* (4), 401-419.

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı. (2019). *PISA Türkiye Raporu (Yayın no. 10)*. Ankara.

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar)*. Ankara.

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni.* Ankara

T.C. Ticaret Bakanlığı. (2018). *Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Türkiye İsraf Raporu.* Ankara: Kalkan Matbaacılık.

Ullrich, B., & Riffel, M. (1993). New evidence for the occurrence of the Anatolian leopard, Panthera pardus tulliana (Valenciennes, 1856), in western Turkey. *Zoology in the Middle East, 8*(1), 5-14.

Waters, I. (2021). Ascii table. I. Waters (Ed.) *PowerShell for Beginners: Learn PowerShell 7 Through Hands-On Mini Games* (s. 127-132) içinde. Berkeley, CA: Apress.

Weissman, M. H. (2020). *An illustrated theory of numbers* (Vol. 105). Providence, Rhode Island: American Mathematical Society.

Kaynakça, APA 6'ya göre hazırlanmıştır.

Cevap anahtarlarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

Genel ağ ve görsel kaynakçasına ulaşmak için karekodu okutunuz.


25°D
30°D
35°D
40°D
45°D
50°D
40°K
35°K
ROMANYA
Bükreş
UKRAYNA
RUSYA FEDERASYONU
HAZAR DENİZİ
Sofya
BULGARİSTAN
KARADENİZ
GÜRCİSTAN
Tiflis
ACARA Ö.C.
ERMENİSTAN
AZERBAYCAN
Erivan
NAHÇIVAN Ö.C. (AZERBAYCAN)
İRAN
YUNANİSTAN
EGE DENİZİ
MARMARA DENİZİ
Gökçeada
Bozcaada
Çanakkale
Edirne
Kırklareli
Tekirdağ
İstanbul
Bursa
Balıkesir
Yalova
Kocaeli
Sakarya
Düzce
Bolu
Bilecik
Eskişehir
Kütahya
Manisa
İzmir
Afyonkarahisar
Uşak
Aydın
Denizli
Muğla
Burdur
Isparta
Antalya
Konya
Karaman
Mersin
Adana
Niğde
Aksaray
Nevşehir
Kırşehir
Kırıkkale
Ankara
Çankırı
Karabük
Bartın
Zonguldak
Kastamonu
Çorum
Amasya
Samsun
Sinop
Tokat
Yozgat
Sivas
Erzincan
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Ardahan
Kars
Gümüşhane
Bayburt
Erzurum
Ağrı
Iğdır
Tunceli
Bingöl
Muş
Bitlis
Van
Elâzığ
Malatya
Diyarbakır
Batman
Siirt
Şırnak
Hakkâri
Mardin
Şanlıurfa
Adıyaman
Gaziantep
Osmaniye
Kilis
Hatay
Kahramanmaraş
Van Gölü
Urumiye Gölü
Tuz Gölü
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
Erenköy
Lefkoşa
GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ
SURİYE
IRAK
LÜBNAN
Beyrut
Şam
Bağdat
AKDENİZ
LİBYA
MISIR
Tel Aviv
FİLİSTİN
Batı Şeria
Doğu Kudüs
FİLİSTİN
Gazze Şeridi
İSRAİL
Atina
Süveyş K.
Merik N.
Tuna N.
Kızılırmak N.
Yeşilırmak N.
Sakarya N.
Büyük Menderes N.
Küçük Menderes N.
Gediz N.
Ceyhan N.
Seyhan N.
Göksu N.
Fırat N.
Dicle N.
Kura N.
Aras N.
TÜRKİYE'NİN MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ İLE KARA VE DENİZ KOMŞULARI HARİTASI
BAŞKENT
Ankara
İL MERKEZİ
Elâzığ
GÖL
ÜLKE SINIRI
ÖZERK BÖLGE SINIRI
AKARSU
0 50 100 200 300 400
km
Harita Genel Müdürlüğü tarafından üretilmiştir.


TÜRK DÜNYASI HARİTASI
Bağımsız Türk Devletleri
Türk Cumhuriyetleri, Türk Bölgeleri
Türk Toplulukları
0 250 500 1.000 1.500 2.000 km
TÜRK CUMHURİYETLERİ, TÜRK BÖLGELERİ
1 GAGAVUZ YERİ
2 KARAÇAY-ÇERKESYA
3 KABARDİN-BALKARYA C.
4 DAĞISTAN C.
5 ÇUVAŞİSTAN C.
6 TATARİSTAN C.
7 BAŞKURT C.
8 KARAKALPAKİSTAN C.
9 ALTAY C.
10 HAKASYA C.
TÜRK TOPLULUKLARI
a Avrupa'daki Türkler
b Kosova Türkleri
c Yunanistan Türkleri
ç Bulgaristan Türkleri
d Romanya Türkleri
e Suriye Türkmenleri
f Irak Türkmenleri
g İran Türkleri
h Afganistan Türkmenleri
ı Pakistan Türkmenleri
i Hindistan Türkmenleri
j Çin H. C. Türkleri
k Moğolistan Türkleri
l Rusya Federasyonu Türkleri
ÜLKE KISALTMALARI
ARNAVUTLUK ARN
BELÇİKA BEL
BOSNA - HERSEK BH
GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ GKRY
HIRVATİSTAN HRV
İSVİÇRE İSV
KARADAĞ KRD
KOSOVA KSV
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KKTC
KUZEY MAKEDONYA KMKD
LİHTENŞTAYN LİH
SIRBİSTAN SRB
TÜRKİYE
KAZAKİSTAN
RUSYA FEDERASYONU
SAHA (YAKUT) C.
TUVA C.
MOĞOLİSTAN
ÇİN HALK CUMHURİYETİ
SİNCAN UYGUR ÖZERK BÖLGESİ
ÖZBEKİSTAN
TÜRKMENİSTAN
KIRGIZİSTAN
TACİKİSTAN
AFGANİSTAN
PAKİSTAN
İRAN
IRAK
SURİYE
HİNDİSTAN
BANGLADEŞ
Norveç Denizi
Barents Denizi
Kara Denizi
Bering Denizi
Ohotsk Denizi
Akdeniz
Karadeniz
Hazar Denizi
Umman Denizi
Yemen Denizi
Kızıldeniz
30°B 20°B 10°B 0° 10°D 20°D 30°D 40°D 50°D 60°D 80°D 100°D 120°D 130°D 140°D 150°D 160°D 170°D 180°
40°K 30°K 20°K 10°K
30°D 40°D 50°D 60°D 70°D 80°D 90°D 100°D 110°D 120°D